



## UNA POBLACION NOTABLE Y CONFIRMACION DEL VENCEJO NUCA BLANCA (*Streptoprocne b. biscutata*) EN LA ARGENTINA

Mark Pearman<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Matheu 1248, C1249AAB, Buenos Aires. Correo electrónico: markpearman@speedy.com.ar


<sup>2</sup> Grupo Falco, www.grupofalco.com.ar, La Plata, Buenos Aires, Argentina.

El Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne biscutata*) se conoce principalmente desde el centro sur al sudeste de Brasil (Minas Gerais hasta Rio Grande do Sul), con una población aparentemente disyunta conocida en Rio Grande do Norte, noreste de Brasil (subespecie *seridoensis*) (Chantler 1999). Además, existe un único registro visual para Paraguay, en el departamento Canindeyú, cerca de la frontera brasilera (Capper *et al.* 2001) y doce registros visuales en la provincia de Misiones, noreste Argentina, sin descripciones de plumaje o evidencia alguna (Nores e Yzurieta 1985, ver Mazar Barnett y Pearman 2001 y Pearman *et al.* 2010, Tabla 1). La especie está extremadamente ligada a cascadas y a veces cuevas para sus dormitorios, y parece nidificar exclusivamente en cuevas (Pichorim 2002).

Aquí presento el primer registro documentado de un dormitorio de Vencejo Nuca Blanca en la Argentina, siendo también la primera evidencia de su presencia en el país. Discuto los caracteres decisivos para la separación del Vencejo de Nuca Blanca del Vencejo de Collar (*S. zonaris*), y evalúo la potencial estacionalidad y nidificación.

### Primer dormitorio conocido en la Argentina

El 31 de noviembre de 2010, mientras guiaba un tour de observadores de aves en el Parque Provincial (PP) Salto Encantado (27°07'S, 54°55'O, 300 msnm), departamento Caingunás, centro de la provincia de Misiones, fotografiamos un dormitorio con 22 Vencejos Nuca Blanca un poco después del amanecer (Fig. 1). Estaban localizados a 5-8 m



**Figura 1.** Primer registro documentado de Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne biscutata*) en Argentina. En la fotografía se observan 18 Vencejos Nuca Blanca, 4 Vencejos de Collar (*S. zonaris*) y varios *Streptoprocne* que no es posible identificar a nivel de especie, Salto Encantado, Misiones, 31 de noviembre 2010. Ver detalles en sección Identificación. Foto: F Hummel.



debajo del labio de la cascada justo abajo de unos aproximadamente 60 Vencejos de Cascada (*Cypseloides senex*) y mezclados con algunos (menos de 10) Vencejos de Collar. Mucho más abajo había un Vencejo Negruzco (*Cypseloides fumigatus*) sentado sobre su nido (con un huevo o pichón); especie cuya nidificación ya fue documentada para la misma localidad (Pearman *et al.* 2010). Unos 10 Vencejos de Tormenta (*Chaetura meridionalis*) también frecuentaban la pared aquella mañana. Esta localidad es privilegiada y quizás única en Argentina, por tener dormitorios de cinco especies de vencejos.

Aunque los Vencejos Nuca Blanca estaban posados a la izquierda de la principal caída de agua, muchos estaban detrás de la cortina de agua. Posiblemente había otros individuos imposibles de ver por el ángulo de observación y/u ocultos detrás de la parte más densa de la cascada.

### Identificación

Los Vencejos Nuca Blanca fueron identificados utilizando un telescopio Swarovski 20-50 WA 65 mm por una combinación de rasgos diagnósticos (ver también Kirwan 2007) y ayudado por experiencia previa con la especie en Brasil. Consciente de la problemática distinción a campo de las dos especies de *Streptoprocne*, consideré la siguiente lista de características más importantes para diferenciarlos, ordenadas por utilidad en el campo:

1) ancho parche blanco en la porción superior del pecho, muy ancho en el medio y apuntando hacia el mentón, angostándose en los costados, recordando a un pañuelo doblado en el Vencejo Nuca Blanca (Fig. 1-a); muy distinto a la mucho más angosta y uniforme banda pectoral del Vencejo de Collar (Fig. 1-b).

2) frente de la cabeza lavado de gris pálido o blancuzco que a veces se extiende hasta la región loreal y mentón en el Vencejo Nuca Blanca (Fig. 1-c), ausente o extremadamente

reducido en el Vencejo de Collar (Fig 1-d).

3) cola más cuadrada con esquinas redondeadas en el Vencejo Nuca Blanca (Fig. 1-e) *versus* cola más furcada con esquinas puntiagudas en el Vencejo de Collar (Fig 1-f). Además, la forma de la cola cambia cuando se abre siendo cuadrada o apenas redondeada en el Vencejo Nuca Blanca y moderadamente furcada en el Vencejo de Collar.

4) parche nual blanco (normalmente ancho), terminando abruptamente en los costados, sugiriendo un rectángulo en el Vencejo Nuca Blanca (Fig. 1-g), comparado con un collar nual blanco que muchas veces parece ser interrumpido en el Vencejo de Collar (Fig 1-h).

En cuanto a la identificación del Vencejo Nuca Blanca, la literatura argentina generalmente se limita a mencionar un collar blanco quebrado en los costados (Narosky e Yzurieta 1987, de la Peña y Rumboll 1998), mientras que Olrog (1984) detallaba mejor “sin collar, solamente pecho y nuca blancos”. Justamente este collar discontinuo es un rasgo que puede prestarse a confusión fácilmente en el campo; un Vencejo de Collar posado en una posición encorvada o con el ala un poco hacia arriba frecuentemente aparenta tener un collar quebrado (Fig. 1). En algunos ejemplos de Vencejo de Collar incluso, el collar puede ser discontinuo. Por ejemplo, un espécimen (Museo de La Plata 11254) colectado en San Pedro de Colalao, Tucumán, en octubre 1960, tiene un patrón asimétrico de collar, discontinuo en un costado, mientras por debajo del negro el collar se continúa delgadamente. Además, Kirwan (2007) advirtió que la diferencia entre un collar incompleto o completo no se nota fácilmente en un ave volando. Dados estos datos y la información poco precisa en la literatura disponible en el momento, cabe la posibilidad de poner en duda las observaciones previas pobremente detalladas del Vencejo Nuca Blanca en Misiones (Tabla 1).

**Tabla 1.** Reportes previos del Vencejo Nuca Blanca (*Streptoprocne biscutata*) en Misiones, Argentina.

| LOCALIDAD   | DEPARTAMENTO | CANTIDAD | FECHA             | FUENTE / OBSERVADOR                          |
|---|--------------|----------|-------------------|--|
| Río Pepirí Guazú, Piñal Seco                              | San Pedro    | 5 ó 6    | 10 diciembre 1984 | Nores e Yzurieta 1985                        |
| Parque Nacional Iguazú                                    | Iguazú       | 1        | diciembre 1986    | M. Rumboll en Mazar Barnett y Pearman (2001) |
|   |              | 1        | 1987              | M. Rumboll en Mazar Barnett y Pearman (2001) |
|   |              | 1        | 1988              | M. Rumboll en Mazar Barnett y Pearman (2001) |
|   |              | 1        | 20 diciembre 1992 | J. Warne en Mazar Barnett y Pearman (2001)   |
|   |              | 1        | 25 noviembre 2005 | J.I. Areta <i>in litt.</i> , este trabajo    |
| Colonizadora Misionera, Establecimiento Alegría San Pedro | San Pedro    | 2        | 1 noviembre 2003  | A. Bodrati <i>in litt.</i> , este trabajo    |
|   | San Pedro    | 2        | 17 octubre 2008   | A. Bodrati en Pearman <i>et al.</i> 2010     |
|   |              | 1        | 20 octubre 2008   | A. Bodrati <i>in litt.</i> , este trabajo    |
|   |              | 2        | 5 noviembre 2009  | A. Bodrati <i>in litt.</i> , este trabajo    |
| Paraje Tambero, Parque Provincial Caá-Yarí                | San Pedro    | 2        | 19 octubre 2009   | A. Bodrati <i>in litt.</i> , este trabajo    |