

**BIBLIOGRAFÍA CITADA**

- BELTON W (1985) Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part 2. Formicariidae through Corvidae. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 180:1–242.
- CADENA CD, LONDOÑO GA & PARRA JL (2000) Nesting records of five antbird species from the Colombian Amazon. *Wilson Bulletin* 112:313–317.
- FRAGA R & NAROSKY S (1985) *Nidificación de las Aves Argentinas (Formicariidae a Cinclidae)*. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- KRABBE NK & SCHULENBERG TS (2003) Family Formicariidae (Ground-antbirds). Pp. 748–788 en DEL HOYO J, ELLIOT A & CHRISTE DA (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 8 Broadbills to Tapaculos*. Lynx Edicions, Barcelona.
- SICK H (1993) *Birds in Brazil*. Princeton University Press, Princeton, New Jersey.

Recibido: agosto 2010 / Aceptado: febrero 2011

Nuestras Aves 56: 11-12, 2011

PRESENCIA DEL MACÁ GRIS (*Tachybaptus dominicus*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Sebastián Preisz

Calle 3 N° 1876 Villa Elisa, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: sebastianpreis@ yahoo.com.ar

El Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*) es uno de los representantes más pequeños de la familia Podicipedidae y se distribuye desde el sur de Estados Unidos de Norteamérica hasta Argentina abarcando las islas del Caribe (Llimona y del Hoyo 1992).

El estatus de esta especie en la provincia de Buenos Aires es conflictivo. Storer (1975) considera que todas las citas para la provincia hasta ese momento son erróneas, incluyendo en la que se basa la descripción original de la subespecie *speciosus* (Lynch Arribáizaga 1877) que



Figura 1. Adulto de Macá Gris (*Tachybaptus dominicus*). Parque Provincial Pereyra Iraola, Buenos Aires, Argentina, 24 de octubre 2010. Foto: S Preisz.



considera como una confusión con el Macá Común (*Rollandia rolland*) y el reporte de una hembra colectada en Punta Lara el 23 de febrero de 1881 por White (1882:629) quién escribe: "Iris marrón. Estos pájaros son comunes en las lagunas de Buenos Aires". Posteriormente, Barrios y Moschione (1991) reportan la observación de un individuo en plumaje nupcial en abril de 1991 en Berisso.

El domingo 17 de octubre de 2010 a las 7:30 hs, en una de las canteras cercanas a la Estación Pereyra del Ferrocarril Roca (a unos 400 m de la autopista La Plata-Bs. As. y del límite de la Reserva Natural Punta Lara) creo escuchar vocalizar a un Burrito Común (*Laterallus melanophaius*) lo que me llama mucho la atención, dado que en años que frecuento el lugar, nunca lo escuché ni observé, siendo que además no hay juncales en los márgenes de la cantera. El domingo siguiente, 24 de octubre de 2010, a las 7:00 hs apareció a escasos 5 m de mí un adulto de Macá Gris (Fig. 1/Portada). Aún el domingo siguiente, 31 de octubre de 2010, el mismo individuo estaba allí cuando lo ví por última vez. Mi sorpresa inicial al oír la supuesta voz del Burrito Común encontró una plausible respuesta *a posteriori*, cuando me di cuenta que una de las vocalizaciones del Macá Gris es muy similar al canto del Burrito Común (ver www.xeno-canto.org), por lo que casi con certeza el día 17 de octubre de 2010 el Macá Gris ya estaba en el lugar.

Este es el primer reporte con evidencia sobre la presencia del Macá Gris en la provincia de Buenos Aires. Dada la escasez de observaciones y la facilidad con que la especie coloniza cuerpos de agua temporarios en otras regiones

(Llimona y del Hoyo 1992) debe ser considerada como accidental en Buenos Aires como fuera propuesto por Narosky y Di Giacomo (1993).

Agradezco a Eduardo Daneri (mi compañero infaltable de salidas) y al cuerpo de guardaparques del Parque Provincial Pereyra Iraola por su responsable labor de proteger al mismo. Nacho Areta y Mark Pearman ayudaron en la redacción y búsqueda bibliográfica para esta nota.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BARRIOS I & MOSCHIONE F (1991) Observacion del Macá Gris *Tachybaptus dominicus* en Berisso, provincia de Buenos Aires. *Garganchillo* 11:9.
- LLIMONA F & DEL HOYO J (1992) Family Podicipedidae (Grebes). Pp. 174-196 en: del Hoyo J, Elliott A & Sargatal J (eds) *Handbook of the Birds of the World. Volumen 1*. Lynx Edicions, Barcelona.
- LYNCH ARRIBÁZAGA E (1877) Descripción de una especie del género *Podiceps*. *Diario La Ley*, 2 de julio de 1877.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus*. LOLA y Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- STORER RW (1975) The status of the Least Grebe in Argentina. *Bulletin of the British Ornithologists' Club* 95:148-151.
- WHITE EW (1882) Notes on birds collected in the Argentine Republic. With notes by P. L. Sclater. *Proceedings of the Zoological Society of London* 1882:591-629.

Recibido: febrero 2011 / Aceptado: marzo 2011

Nuestras Aves 56: 12-13, 2011

NUEVO REGISTRO DEL PICAFLOR PECHO AZUL (*Amazilia lactea*) EN ARGENTINA

Roberto M. Güller¹ y Norberto Oste²

¹Blanco Encalada 5033 5ºB, (C1431CDM) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: rmguller@uolsinetis.com.ar

²Huergo 244, (1426) Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: noste@tbanet.com.ar

El Picaflor Pecho Azul (*Amazilia lactea*) fue mencionado por primera vez para Argentina por Chebez *et al.* (2004). Una foto publicada posteriormente (Anónimo 2005) sería de ese mismo individuo. Aquí presentamos la segunda cita de la especie para la provincia de Misiones, la cual también constituye la segunda para la Argentina (Chebez *et al.* 2004).

El 11 de agosto de 2004 un individuo de Picaflor Pecho Azul pudo ser filmado en el "Jardín de los Picaflores" en la zona urbana de Puerto Iguazú (25°35'56"S, 54°34'6"O),

departamento Iguazú, Misiones, Argentina. Obtuvimos una filmación en la cual pueden notarse algunas características importantes para la identificación de la especie (Fig. 1, Rodríguez Mata *et al.* 2007): pico negro con la mandíbula inferior de color "carne" típico del género, mancha postocular blanca, garganta y pecho azules brillantes a modo de babero y ventral verde con faja central blanca.

El individuo se encontraba alimentándose en los bebederos junto a otras especies de picaflores como el Picaflor Vientre Negro (*Anthracothorax nigricollis*), Picaflor