



PRIMER REGISTRO DE MOSQUETA CEJA BLANCA (*Cnemotriccus fuscatus*) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Natalia Villanova¹ y Juan Klavins²

¹Av. Urquiza 796 "A", (3280) Colón, Entre Ríos, Argentina.

²23277 Eagle Peak Rd., West Brookfield, VT 05060, EEUU. Correo electrónico: piprites@yahoo.com.ar

La Mosqueta Ceja Blanca (*Cnemotriccus fuscatus*) se distribuye desde el norte de Sudamérica hasta el norte argentino, en tierras bajas (principalmente por debajo de los 900 msnm) en sotobosques sombríos y enmarañados, y bordes de bosques, por lo general cerca del agua (Ridgely y Tudor 1994, Fitzpatrick 2004, Restall *et al.* 2006). En Argentina ha sido reportada para las provincias de Salta, Jujuy, Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones (Narosky e Yzurieta 2003), un registro dudoso en Córdoba (Miatello *et al.* 1999, Nores 1996), noreste de Santiago del Estero (Caziani 1996) y noreste de Santa Fe (de la Peña 2006, Ridgely y Tudor 2009).

El 20 de diciembre de 2009 NV observó 2 individuos de Mosqueta Ceja Blanca en un fragmento de bosque ribereño secundario a unos 500 m de la costa del río Uruguay, en las cercanías de San José, departamento de Colón (32°10'S, 58°10'O); uno de ellos pudo ser fotografiado (Fig. 1 y 2).

Entre las especies vegetales que caracterizan el hábitat donde fueron observados los individuos había espinillos (*Acacia caven*), molles (*Schinus fasciculatus*) y chilcas (*Bacharis* spp., *Eupatorium buniifolium*).

Presentamos de este modo las primeras observaciones de la Mosqueta Ceja Blanca en Entre Ríos. Su presencia en dicha provincia podría ser casual u ocasional, aunque llama la atención la época del año y que hayan sido dos individuos observados en el mismo momento y lugar. Esto podría sugerir que la Mosqueta Ceja Blanca nidifique en Entre Ríos, aunque se requiere de nuevos datos para corroborar esta hipótesis.

Por otro lado, al ser una especie altamente migratoria, particularmente en áreas australes de su distribución donde posiblemente sea enteramente migratoria (Hayes *et al.* 1994, Mazar Barnett y Pearman 2001, Guyra Paraguay 2004, Chesser 2005, Jahn *et al.* 2002), la presencia ocasional de



Figura 1. Individuo de Mosqueta Ceja Blanca (*Cnemotriccus fuscatus*) fotografiado en Colón, el 20 de diciembre de 2009. Foto: N Villanova.



Figura 2. Otra vista del mismo individuo de Mosqueta Ceja Blanca (*Cnemotriccus fuscatus*) fotografiado en Colón, el 20 de diciembre de 2009. Foto: N Villanova.



individuos errantes en Entre Ríos es esperable. Coincidimos además en su conducta generalista en los hábitat que utiliza (Ridgely y Tudor 1994, Sick 1997, Narosky e Yzurieta 2003, 2006, Fitzpatrick 2004), lo cual demuestra amplia plasticidad y adaptabilidad a distintos ecosistemas, incluyendo el ambiente del sitio donde estos individuos fueron observados.

Agradecemos la colaboración de Gustavo Bruno, Héctor Slongo, Sabrina Villalba, Juan Mazar Barnett, Paul Smith, Kristina Cockle, Nelson Pérez y a la bibliotecaria de Aves Argentinas quienes gentilmente aportaron comentarios e información bibliográfica. Finalmente, a Mark Pearman por alertarnos sobre la inexistencia de registros de la especie en Entre Ríos y motivarnos a que publicáramos estas observaciones.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CAZIANI SM (1996) *Interacción plantas-aves dispersoras de semillas en un Bosque Chaqueño semiárido*. Tesis doctoral, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.
- CHESSER RT (2005) Seasonal distribution and ecology of South American austral migrant flycatchers. Pp. 168–181 en: GREENBERG R & MARRA PP (eds) *Birds of Two Worlds*. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
- DE LA PEÑA M (2006) *Lista y Distribución Aves Santa Fe y Entre Ríos*. L.O.L.A., Buenos Aires.
- FITZPATRICK J (2004) Family Tyrannidae (*tyrant-flycatchers*). Pp. 170–461 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & CHRISTIE A (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 9. Cotingas to Pipits and Wagtails*. Lynx Edicions, Barcelona.
- GUYRA PARAGUAY (2004) *Lista comentada de las aves del Paraguay. Annotated checklist of the birds of Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción.
- HAYES FE, SCHARF PA & RIDGELY RS (1994) Austral bird migrants in Paraguay. *Condor* 96:83–97.
- JAHN AE, DAVIS SE & SAAVEDRA ZANKYS AM (2002) Patterns of austral bird migration in the Bolivian Chaco. *Journal of Field Ornithology* 73:258–267.
- MAZAR BARNETT J & PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona.
- MIATELLO R, BALDO J, ORDANO M, ROSACHER C & BIANCUCCI L (1999) *Avifauna del Parque Nacional Quebrada del Condorito y Reserva Hídrica Provincial de Achala, Córdoba*. Secretaría de Agricultura, Ganadería y recursos renovables, Córdoba.
- NAROSKY T & YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- NORES M (1996) Avifauna de la provincia de Córdoba. Pp. 255–337 en: DI TADA IE & BUCHER EH (eds) *Biodiversidad de Provincia Córdoba*. I. Fauna. Universidad Nacional de Río Cuarto, Río Cuarto.
- SICK H (1997) *Ornitología brasileira*. Editora Nova Fronteira, Rio de Janeiro.
- RESTALL R, RODNER C & LENTINO M (2006) *Birds of Northern South America: an identification guide*. Volume 1 y 2. Christopher Helm y Yale University Press, Londres y New Haven.
- RIDGELY RS & TUDOR G (1994) *The birds of South America: the Suboscine passerines*. Volume 1. University of Texas Press, Austin.
- RIDGELY RS & TUDOR G (2009) *Field Guide to de Songbirds of South America: the passerines*. University of Texas press, Austin.

Recibido: agosto de 2010/ Aceptado: abril de 2011