



NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA SANTA FE, ARGENTINA. PARTE III

Horacio Luna¹ y Martín Manassero²¹Las Heras 1.780 (2121) Pérez, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: horacioluna@hotmail.com²Montevideo 1.530, piso 1 B (2000) Rosario, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: martinmmssc@hotmail.com

Se comentan registros de aves obtenidos en el extremo norte de Santa Fe, donde hay bosques chaqueños bien conservados. La mayoría de los mismos se realizaron en la estancia La Isabel (28°10' S; 59°24' O), a 7 km al noroeste de El Rabón, departamento General Obligado. También hay observaciones en la estancia Santa María (28°01' S; 59°42' O), a 25 km al noroeste del Paraje San Juan (28°12' S; 59°36' O), departamento General Obligado, y en la estancia Ferrero, en el Paraje San Juan. En este informe, se dan a conocer una especie sin citas para Santa Fe, otra que se consideraba hipotética y otras aves con pocos registros.

Halcón negro chico (*Falco ruficularis*)

El 19 de agosto de 2006 se observó un ejemplar posado en un quebracho colorado chaqueño (*Schinopsis balansae*), al borde de un camino y al día siguiente, otro en vuelo en la estancia Santa María. En la estancia La Isabel, un ejemplar el 14 de octubre de 2006. Tenía una cita para Santa Fe (Olrog, 1979) y luego fue confirmado por un registro reciente en la estancia Ferrero (Manassero *et al.*, 2006).

Halcón montés grande (*Micrastur semitorquatus*)

El 16 de octubre de 2006 observamos en la estancia La Isabel un ejemplar en un bosque inundado y luego otro, volando desde una isleta de monte a otra. Para Santa Fe, tenía una cita en Las Claritas, cerca de Villa Ana, departamento General Obligado, en agosto de 1990 (De la Peña, 1996 y 1997).

Halcón montés chico (*Micrastur ruficollis*)

El 15 de octubre de 2006 en estancia La Isabel, encontramos un ejemplar posado en una rama a unos 5 metros de altura de un gran ombú (*Phytolacca dioica*), en una isleta de bosque, formada por guayaibí (*Pataganula americana*), espina de corona (*Gleditsia amorphoides*), lapacho rosado (*Tabebuia impetiginosa*), timbó colorado (*Enterolobium contortisiliquum*), ibirá pitá (*Peltophorum dubium*) y pindó (*Syagrus romanzoffiana*). Pudimos apreciar claramente las líneas blancas en la cola y el vientre barrado de negro. Al advertir nuestra presencia, voló y pudimos observar las rayas

de las alas, típicas de esta especie. Se distribuye por Jujuy, Salta, Tucumán, Misiones, Formosa, Corrientes y Chaco (De la Peña, 1999). En Chaco, tiene tres localidades conocidas, siendo la más austral el Parque Nacional Chaco (26° 48' LS 59° 36' LO) (Bodrati, 2005). Este sería el primer registro para la provincia de Santa Fe (De la Peña, 1997 y 1999).

Chiripepé cabeza verde (*Pyrrhura frontalis*)

La especie tenía una cita antigua de Martínez Achenbach (1957) y luego fue confirmada para Santa Fe, por registros más recientes en la estancia Ferrero (Manassero *et al.*, 2004). Obtuvimos nuevos registros de pequeños grupos en la misma estancia en enero y octubre de 2005. En la estancia Santa María, observamos grupos de más de 30 ejemplares, entre el 18 y 21 de agosto de 2006 y en la estancia La Isabel, detectamos grupos de menos de 10 ejemplares, entre el 14 y el 16 de octubre de 2006. Estas observaciones, permitirían considerar a la especie escasa y residente en la provincia.

Lechuzón orejudo (*Pseudoscops clamator*)

Observamos un ejemplar el 14 de octubre de 2006, en una isleta de bosque en la estancia La Isabel; una pareja nidificando en una arboleda el 21 de julio de 2002, en San Carlos Norte, departamento Las Colonias; y otro individuo en arboledas costeras del río Carcarañá, cerca de Timbúes, departamento San Lorenzo, el 16 de septiembre de 2002. Solo estaba citada para el centro-este y es considerada rara en Santa Fe (De la Peña, 1997).

Surucúa común (*Trogon surrucura*)

El 16 de octubre de 2006 observamos un ejemplar posado en un árbol a baja altura en la estancia La Isabel. Luego le efectuamos *playback* y se acercaron en pocos segundos tres ejemplares más. Pudimos fotografiar uno. Los observamos en un bosque inundado, con denso sotobosque y abundancia de caraguatales de *Aechmea polystachya*. En las cercanías vimos tucanes (*Ramphastos toco*), urracas moradas



► ARTICULOS

(*Cyanocorax cyanomelas*) y cerquero de collar (*Arremon flavirostris*). Había sido mencionado para la provincia por Olrog (1979), por lo cual se consideraba hipotética y necesitaba confirmarse con registros actuales (De la Peña, 1997).

Tucán grande (*Ramphastos toco*)

En la estancia Ferrero, donde la pindó es escasa en los montes, durante 25 días de trabajo de campo, sólo se observó un ejemplar el 9 de enero de 2005. En una corta visita a la estancia El Rabón (lindante con estancia La Isabel), se observaron dos individuos el 21 de agosto de 2006, en una isleta de bosque con pindó (*Syagrus romanzoffiana*). En la estancia La Isabel efectuamos numerosos registros, e incluso grupos de 4 a 6 ejemplares, entre el 14 y 16 de octubre de 2006. Aquí la especie es fácil de ver, quizás por la abundancia de dichas palmeras. Pobladores de la zona nos comentaron que también hay tucanes al oeste de Florencia, departamento General Obligado, y que no fueron vistos más hacia el oeste en la zona de la estancia Santa María, ni hacia el sur de las localidades que damos a conocer. Sólo tenía un registro actual para Santa Fe, de una pareja en noviembre de 1995, a 10 km al noreste de Villa Guillermina, departamento General Obligado (De la Peña, 1996).

Carpintero copete pajizo (*Celeus lugubris*)

El 15 de octubre de 2006, observamos en la estancia La Isabel, un ejemplar en vuelo, que luego se posó en un gran timbó colorado. Muy desconfiado, vocalizó y luego se internó en la espesura de una gran isleta de monte alto, donde había monos carayá (*Alouatta caraya*). Sería el segundo registro para la provincia de Santa Fe, pues había sido observado en noviembre de 1995, a 10 km al nordeste de Villa Guillermina (De la Peña, 1996).

Agradecemos a César Giarduz y Norberto Nerbutti, por acompañarnos en una campaña a la estancia Santa María. A Miguel Jara y Rubén Cardozo, encargados de las estancias Santa María y La Isabel, respectivamente. A Mariano Cracogna.

BIBLIOGRAFIA CITADA

BODRATI, A. 2005. Notas sobre la avifauna del Parque Nacional Chaco, el Parque Provincial Pampa del Indio y otros sectores de la provincia de Chaco, Argentina. *Nuestras Aves*, 49: 15-23.
DE LA PEÑA, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *El Hornero*, 14: 87-89.



Surucúa común macho observado en un bosque chaqueño inundado de la estancia La Isabel. Foto: Horacio Luna.

DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía LOLA N° 15. Buenos Aires, 128 páginas.
DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. Monografía LOLA N° 18. Buenos Aires, 244 páginas.
MANASSERO, M.; H. LUNA y L. ACQUAVIVA. 2004. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 47: 31-33.
MANASSERO, M.; H. LUNA y L. ACQUAVIVA. 2006. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. Parte II. *Nuestras Aves*, 51: 29-31.
MARTINEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, 1: 1-61.
OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

Recibida: octubre 2006