



## PRIMER REGISTRO DEL MILANO CHICO (*Gampsonyx swainsonii*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FÉ, ARGENTINA

Rodrigo Lorenzón

Reserva Ciudad Universitaria UNL "El Pozo", departamento La Capital, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: roy\_lorenzón@yahoo.com.ar

El Milano Chico (*Gampsonyx swainsonii*) se distribuye desde Nicaragua hasta el norte de Argentina (Brown y Amadon 1968), aunque su presencia actual al norte de Panamá requiere confirmación (Ferguson-Lees y Christie 2005). En Argentina es mapeada en Jujuy, Formosa, Salta, Tucumán, Chaco, norte de Santiago del Estero y Corrientes (Narosky e Yzurieta 2003). Localmente es considerada rara o escasa (Olrog 1979, Narosky e Yzurieta 2003, Di Giácomo y Krapovickas 2005). La especie no cuenta con registros en la Provincia de Santa Fé (de la Peña 1999, 2006), aunque existe una cita en Entre Ríos en el departamento Concordia (de la Peña 2006). En esta nota presento detalles del primer registro del Milano Chico para la provincia de Santa Fé.

El 5 de Agosto de 2007 en horas de la tarde observé un ejemplar de Milano Chico en un bosque ribereño dominado por sauces (*Salix humboldtiana*) en la Reserva Urbana



**Figura 1.** Fotografía que constituye el primer registro del Milano Chico (*Gampsonyx swainsonii*) en la Provincia de Santa Fé, Argentina.

de la Ciudad Universitaria UNL "El Pozo" (31°39'S, 60°43'O), en el departamento La Capital, provincia de Santa Fé. El individuo estaba posado expuesto en un ceibo (*Erythrina crista-galli*) a baja altura. Se mostraba confiado y se acicalaba las plumas. Observé detalladamente las características del plumaje que caracterizan a la especie como las mejillas, piernas y frente acaneladas, parte alta de la cabeza y dorso de las alas gris oscuros, zona prenucal de la cabeza y cuello dorsal blanco que se extienden, a modo de collar, hacia la parte ventral blanca, faja en cuello dorsal castaña con terminaciones negras que se extiende hasta los lados del cuello, las alas no superan en longitud la cola (aguda y gris oscuro en su parte dorsal) sino que alcanzan aproximadamente la mitad de ésta, iris rojo oscuro poco notable y patas anaranjadas. Luego voló hacia otro sauce posándose a mayor altura donde siguió acicalándose. En días subsiguientes observé varias veces al, presuntamente, mismo individuo posado en un sauce en horarios crepusculares. El ave fue fotografiada y filmada (Figura 1).

Varios autores consideran que el Milano Chico es una especie no migratoria, o al menos probable residente, en Paraguay y el norte de Argentina (Short 1975, Capurro y Bucher 1988, Hayes 1995, López Lanús 1997). Di Giácomo (2005) la considera un migrante austral en la Reserva "El Bagual" en Formosa. De la Peña (2006) reporta la especie en Entre Ríos el 10 de Junio de 2001. Este último dato y mi propia observación a principios de Agosto de 2007 sugieren que al menos parte de la población permanece en el área durante los meses de invierno.

Los ambientes ribereños, en particular las selvas en galería, son considerados hábitats potenciales para el Milano Chico (Olrog 1979, Chatellenaz 2005, Rodríguez Mata *et al.* 2006). Di Giácomo y Contreras (2002), consideran que la especie está presente en el eje fluvial Paraguay-Paraná y la proponen como un ejemplo de especies que se dispersan hacia el sur siguiendo estos ríos. Esta hipótesis es congruente con mi observación en una localidad cercana al río Paraná, aunque cabe destacar que en otras regiones la especie también usa frecuentemente áreas con vegetación xerófila (Short 1975, Guyrá Paraguay 2004).

Agradezco a Juan Carlos Almirón por el apoyo prestado, Alba Imhoff por las fotografías y filmaciones, Clara Berrón, Carolina Cerino, Ana Laura Ronchi y Rosendo Fraga por las sugerencias y el aporte de bibliografía.



## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BROWN L & AMADON D (1968) *Eagles, Hawks and Falcons of the World*. Country Life Books, Feltham, London, U.K.
- CAPURRO HA & BUCHER EH (1988) Lista comentada de las aves del bosque chaqueño de Joaquín V. González, Salta. Argentina. *Hornero* 13:39–46.
- CHATELLENAZ ML (2005) Aves del Valle del Río Paraná en la provincia del Chaco, Argentina: Riqueza, Historia Natural y Conservación, en ACEÑOLAZA FG (ed). *Temas de la Biodiversidad del Litoral Fluvial Argentino II*. Instituto Superior de Correlación Geológica, Tucumán, Argentina.
- DE LA PEÑA MR (1999) *Aves Argentinas, Lista y Distribución*. L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina.
- DE LA PEÑA MR (2006) *Lista y Distribución de las Aves de Santa Fe y Entre Ríos*. Editorial L.O.L.A., Buenos Aires, Argentina.
- DI GIÁCOMO AS & CONTRERAS JR (2002) Consideraciones acerca de la diversidad de las aves en relación con el eje fluvial Paraguay-Paraná, en Sudamérica. *Historia Natural* 1 (5):23–29.
- DI GIÁCOMO AG (2005) Aves de la Reserva El Bagual. Pp. 201–465 en DI GIÁCOMO AG & KRAPOVICKAS SF (eds). *Historia natural y paisaje de la Reserva El Bagual, Provincia de Formosa, Argentina. Inventario de la fauna de vertebrados y de la flora vascular de un área protegida del Chaco Húmedo*. Temas de Naturaleza y Conservación 4. Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- FERGUSON-LEES J & CHRISTIE DA (2005) *Raptors of the World*. Segunda edición. Princeton University Press, Princeton, EE.UU.
- GUYRÁ PARAGUAY (2004) *Lista Comentada de las Aves de Paraguay. Annotated checklist of the birds of Paraguay*. Guyra Paraguay, Asunción, Paraguay.
- HAYES FE (1995) *Status, Distribution and Biogeography of the Birds of Paraguay*. American Birding Association, Monographs in Field Ornithology N°1.
- LÓPEZ LANÚS B (1997) *Inventario de las Aves del Parque Nacional "Río Pilcomayo", Formosa, Argentina*. Monografía especial L.O.L.A. N° 4, Buenos Aires, Argentina.
- NAROSKY T & YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- OLROG CC (1979) *Nueva Lista de la Avifauna Argentina*. Opera Lilloana 27:1–324.
- RODRÍGUEZ MATA J, ERIZE F & RUMBOLL M (2006) *Aves de Sudamérica*. Guía de campo Collins. 1° Edición. Harper Collins Publishers y Letemendia, Buenos Aires, Argentina.
- SHORT LL (1975) A zoogeographic Analysis of the South American Chaco Avifauna. *Bulletin of the American Museum of Natural History* 154:163–352.

Recibido: Agosto de 2007 / Aceptado: Agosto 2009

Nuestras Aves 54: 23-25, 2009

## CONFIRMACIÓN Y NUEVOS REGISTROS DEL BENTEVEO DE BARBIJO (*Myiodynastes chrysocephalus*) EN ARGENTINA

José M. Segovia<sup>1,2</sup>, Fabricio Gorleri<sup>3</sup> y Patricio Ramírez Llorens<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Proyecto Selva de Pino Paraná, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, Universidad Maimónides. Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: josmse@yahoo.com.ar

<sup>2</sup>Grupo FALCO www.grupofalco.com.ar, La Plata, Buenos Aires, Argentina

<sup>3</sup>Barrio Incone Casa 369 (3600), Formosa, Argentina. Correo electrónico: fgorleri@yahoo.com.ar

<sup>4</sup>Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico (CeIBA). Yapeyú 23 (3370), Puerto Iguazú, Misiones, Argentina.

El Benteveo de Barbijo (*Myiodynastes chrysocephalus*) se distribuye desde el este de Panamá, norte de Venezuela, Colombia, Ecuador, este de Perú, y oeste de Bolivia hasta el extremo noroeste de Argentina (Ridgely y Tudor 1994, Hilty 2003). En gran parte de su distribución es considerado frecuente o común (Ridgely y Tudor 1994, Hilty 2003, Fitzpatrick 2004). En Bolivia, es considerada residente (Hennessey *et al.* 2003). En Argentina fue citado por vez primera por López Lanús (1992), en base a un avistaje realizado en Mesón del Condado, departamento de Santa Victoria, Salta, pero su presencia en el país era considerada hipotética por Mazar Barnett y Pearman (2001), ante la

falta de evidencia concreta. Aquí presentamos tres nuevos registros del Benteveo de Barbijo en la provincia de Jujuy; dos de ellos documentados mediante grabación de gritos y fotografías, y que constituyen la primera evidencia concreta de la especie en Argentina.

El 29 de Enero de 2004, en la Reserva Natural Provincial Las Lancitas, departamento Santa Bárbara (24°07'02"S, 64°24'49"O, 1160 msnm) JMS y F Moschione observaron un adulto y tres juveniles. Las aves recorrían a media altura un cochucho (*Fagara coco*), en selva secundaria.

El 21 de Marzo de 2007, JMS, PRL y M Camposano encontraron un adulto y un juvenil, unos 300 m al este del