



## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ACERBO P (2000) *Aves del Río Neuquén*. Autoridad Interjurisdiccional de las Cuenca de los ríos Limay, Neuquén y Negro, Neuquén, Argentina.
- AVES ARGENTINAS/AOP & SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE (2008) Categorización de las aves de la Argentina según su estado de conservación. Aves Argentinas/AOP y Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Buenos Aires, Argentina.
- BRUNO F, VEIGA J, GÜLLER R, ACEVEDO DA & DÖKE JD (2009) Primer registro del Celestino Común (*Thraupis sayaca*) para la provincia de La Pampa, Argentina. *Nuestras Aves* 54: 28–30.
- CABRERA AL (1971) *Fitogeografía de la República Argentina*. Boletín de la Sociedad Argentina de Botánica, Vol. XIV, nº1-2. Buenos Aires, Argentina.
- CANEVARI M, CANEVARI P, CARRIZO G, HARRIS G, RODRÍGUEZ MATA J & STRANECK R (1991) *Nueva guía de las Aves Argentinas. Tomos 1 y 2*. Fundación Acindar, Buenos Aires, Argentina.
- CHRISTIE MI, RAMILO EJ & BETTINELLI MD (2004) *Aves del noroeste patagónico*. LOLA y Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Buenos Aires, Argentina.
- FJELDSÅ J & KRABBE NK (1990) *Birds of the High Andes*. Zoological Museum, University of Copenhagen y Apollo Books, Copenhagen, Denmark.
- LIVEZEY BC & HUMPHREY PC (1992) *Taxonomy and identification of Steamer-Duks (Anatidae: Tachyeres)*. University Kansas. Museum of Natural History Monograph N° 8:1–125.
- NAROSKY T & YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- PÉREZ CHF (1997) Pato Vapor Volador, *Tachyeres patachonicus* (King, 1830), en la cuenca del río Negro. *Natura Neotropicalis* 28:61.
- PÉREZ CHF & PETRACCI P (1999) Nuevos aportes sobre el área de distribución del Pato vapor volador, *Tachyeres patachonicus* (King, 1830). *Nuestras Aves* 40:10–11.
- ROESLER I (2001) Nuevas citas de aves para el partido de General Villegas, Provincia de Bs As, Argentina. *Nuestras Aves* 41:32–33.
- SICK, H (1984) *Ornitología Brasileira, uma Introdução. Volumen 2*. 3° ed. Editora Universidade de Brasília, Brasília, Brasil.
- VEIGA OJ, FILIBERTO FC, BABARSKAS MP & SAVIGNY C (2005) *Aves de la Provincia de Neuquén, Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución*. Editora RyC, Banfield, Argentina.
- WETMORE A (1926) Observations on the birds of Argentina, Paraguay, Uruguay and Chile. *United States National Museum Bulletin* 133:1–448.

Recibido: Octubre de 2008 / Aceptado: Octubre 2009

Nuestras Aves 54: 27-28, 2009

## REGISTRO DE YABIRÚ (*Jabiru mycteria*) EN EL SUDOESTE DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

*Pedro Cristóbal Doiñy Cabré<sup>1</sup>, Reginaldo Lejarraga<sup>2</sup> y Roberto Güller<sup>3</sup>*

<sup>1</sup>La Falda 144 (8000), Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina. Correo Electrónico: pccristobal@fibertel.com.ar

<sup>2</sup>Fitz Roy 575, Bahía Blanca (8000), Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: lejarraga@speedy.com.ar

<sup>3</sup>Blanco Encalada 5033, 5° B Buenos Aires (C1431CDM), Argentina. Correo electrónico:rmguller@uolinsinetis.com.ar

El Yabirú (*Jabiru mycteria*), según Narosky e Yzurieta (2003), habita el norte de la Argentina por el centro y el este. Es ocasional en Misiones y en las provincias de Entre Ríos, Santa Fé, Córdoba y extremo norte de Buenos Aires y accidental en el norte de San Luis y en Mendoza. De la Peña y Rumboll (1998) restringen la distribución al norte de nuestro país por el centro y el este, indicando como límite austral el norte de las provincias de Entre Ríos y Santa Fé. Según Narosky y Di Giacomio (1993) en la provincia de Buenos Aires se lo considera hipotético, existiendo registros antiguos de Hudson y Lynch Arribálzaga. Asimismo estos autores citan un registro de B. López Lanús, quien observó una bandada en el arroyo Saladillo, partido de 25 de Mayo,

en Diciembre de 1980. Además, Liliana Oliveira (com. pers.), registró dos individuos adultos el 25 de Noviembre de 2007, en cercanías de la localidad de Mar Chiquita, Buenos Aires (37°43'50"S, 57°25'37"O).

El 26 de Noviembre 2008 Aníbal Carabajal halló un ejemplar juvenil en el establecimiento "El Monte Santa Elena" (38°27'21"S, 63°00'30"O), al sur del partido de Puán, Buenos Aires. Esta localidad se encuentra dentro la región biogeográfica del Espinal (Caldenal); el campo tiene algunas áreas de pastizal y es atravesado por el arroyo Sanquicó Grande. El individuo fue encontrado con algunos signos de debilidad, ya que se mostraba extremadamente confiado y pasivo. Lo encontró en una zona de arbustos



**Figura 1.** Individuo de Yabirú (*Jabiru mycteria*) en establecimiento “El Monte Santa Elena”, Buenos Aires. Foto: C. Doiny Cabré.

con pastizales, no demasiado cerca del arroyo, sobre cuya orilla lo ubicó y le suministró carne picada, de la que parecía alimentarse. De todas formas a los tres días el ave murió. Se tomaron varias fotos del ave muerta (Figura 1).

El ejemplar era un juvenil, ya que presentaba plumas grises y blancas en el dorso, plumón gris en la cabeza y cuello y collar con tonalidad rosada. Este sería el registro más austral conocido de la especie.

Agradecemos a Alec Earnshaw y a Liliana Oliveira por los aportes realizados y a Aníbal Carabajal por los datos aportados.

#### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA MR & RUMBOLL M (1998) *Birds of Southern South America and Antarctica*. Harper Collins Publishers, London, U.K.
- NAROSKY T & DI GIÁCOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, Argentina.
- NAROSKY T & YZURIETA D (2003) *Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay*. Vázquez Mazzini Editores y Aves Argentinas/ Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires, Argentina.

Recibido: Diciembre 2008 / Aceptado: Septiembre 2009

---

Nuestras Aves 54: 28-30, 2009

## PRIMER REGISTRO DEL CELESTINO COMÚN (*Thraupis sayaca*) PARA LA PROVINCIA DE LA PAMPA, ARGENTINA

*Federico Bruno<sup>1</sup>, Jorge Veiga<sup>2</sup>, Roberto Güller<sup>3</sup>, Daniela Acevedo<sup>4</sup> y Diego Döke<sup>5</sup>*

<sup>1</sup>Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Delegación La Pampa. Zorzal 5090 (6303), Toay, La Pampa.

Correo electrónico: lihue\_yaco@yahoo.com.ar.

<sup>2</sup>Aves Argentinas. Matheu 1246/8, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: diplomat@sinectis.com.ar

<sup>3</sup>Correo electrónico: rmguller@uolsinectis.com.ar

<sup>4</sup>Intendencia Reserva Provincial Parque Luro. Av. Luro y O'Higgins (6300), Santa Rosa, La Pampa, Argentina. daa\_gpque@yahoo.com.ar

<sup>5</sup>Correo electrónico: juandiegodoke@hotmail.com

El Celestino Común (*Thraupis sayaca*) se distribuye en bosques abiertos y bordes de selva, el Cerrado, el sur del Pantanal del Mato Grosso (Mato Grosso do Sul) y la Caatinga en Brasil (evitando la Amazonía), todo el este

de Bolivia, Paraguay, y las Yungas, el Chaco, Espinal y Región Pampeana en Argentina (Ridgely & Tudor 1989). Una especie muy similar, *Thraupis episcopus* ocupa la región Amazónica desde Bolivia y Brasil central hasta el