

## PRIMEROS REGISTROS DE PLAYERITO ENANO (*Calidris pusilla*) PARA LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA

### FIRST RECORDS OF SEMIPALMATED SANDPIPER (*Calidris pusilla*) FOR THE PROVINCE OF SANTA FE, ARGENTINA

MARÍA DEL CASTILLO<sup>1</sup>, DIEGO OSCAR<sup>2</sup>, JORGE LA GROTTIERIA<sup>3\*</sup>, MARCELO JUANI<sup>4</sup>, ULISES ORNSTEIN<sup>1</sup>,  
ADRIÁN GALIMBERTI<sup>5</sup>, ANDRÉS TERÁN<sup>6</sup> & RODRIGO LORENZÓN<sup>7</sup>

<sup>1</sup> Matheu 1246, CABA, Argentina.

<sup>2</sup> Ambrosio Cramer 7243, Del Viso, Buenos Aires, Argentina.

<sup>3</sup> Martín H. Falco 328, Garín (1619), Escobar, Buenos Aires, Argentina.

<sup>4</sup> Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral, Ciudad Universitaria (3000), Santa Fe, Argentina.

<sup>5</sup> Lisandro De la Torre 2446 (2132), Funes, Santa Fe, Argentina.

<sup>6</sup> Entre Ríos 190, piso 11<sup>a</sup>, Rosario (2000), Santa Fe, Argentina.

<sup>7</sup> Instituto Nacional de Limnología (CONICET-UNL), Ciudad Universitaria (3000), Santa Fe, Argentina.

\*jorgelg21@hotmail.com

**RESUMEN:** Presentamos los primeros registros de Playerito Enano (*Calidris pusilla*) para la provincia de Santa Fe, Argentina, ocurridos en la Laguna Añapiré de la localidad Campo Andino. Comentamos la importancia de dicho humedal, que no se encuentra protegido debidamente, y que alberga a especies migradoras raras para el país.

**PALABRAS CLAVE:** Playerito Enano (*Calidris pusilla*), aves playeras, Santa Fe, Argentina.

**ABSTRACT:** We present the first records of Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*) for the province of Santa Fe, Argentina. Occurred in the Añapiré Lagoon in Campo Andino. We commented on the importance of this wetland, which is not properly protected, and which harbors scarce migratory species for the country.

**KEYWORDS:** Semipalmated Sandpiper (*Calidris pusilla*), shorebirds, Santa Fe, Argentina.

## INTRODUCCIÓN

El Playerito Enano (*Calidris pusilla*) es una especie que nidifica en el hemisferio norte y migra en el invierno boreal a Centroamérica y norte de Sudamérica (Jaramillo 2005; Narosky & Yzurieta 2010; BirdLife International 2020). En Argentina es una especie muy escasa, donde la mayoría de las citas se concentran sobre la costa del océano Atlántico, con unos pocos registros en el interior del país. Fue mencionada para las provincias de Buenos Aires (Jaramillo 2000), Chubut (Rost 2018), Córdoba (Narosky et al. 1977), Jujuy (Rodríguez et al. 2010), La Pampa (Darrieu et al. 2011), Río Negro (Gelain & Tolosa 2011) e Islas Malvinas (Woods 2006). En la provincia de Santa Fe, hasta el momento, no fue mencionada (de la Peña 2006; Chebez 2009; Narosky

& Yzurieta 2010; de la Peña 2011; Azpiroz 2012; López-Lanús 2017; de la Peña 2019).

## MÉTODOS Y RESULTADOS

El 8 de marzo de 2020, MdC, DO, JLG, UO, AG y AT, identificaron un ejemplar de Playerito Enano entre una bandada de Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*), entre otras especies (eBird: Oscar 2020). La observación fue realizada en la Laguna Añapiré (31°14'S, 60°31'O), Campo Andino, Santa Fe, Argentina. El ejemplar de Playerito Enano era perseguido por estos otros, pero aún así intentaba mantenerse dentro del grupo forrajeando en la costa de la laguna (que al momento tenía una baja

considerable, producto de la extensa sequía en la región). Esta bajante, limitó los sitios donde los playeritos podían alimentarse, facilitando su observación. Durante varias horas lo observamos por la zona en distintos sectores, pero manteniéndose en una franja de unos 150 m de costa, siempre alimentándose junto a los Playeritos Rabadilla Blanca. Al observar el ejemplar, lo primero que captó nuestra atención fue su tamaño llamativamente inferior a los playeritos rabadilla blanca (Fig. 1), lo que permitió diferencias al Playerito Enano y al Playerito Menor (*Calidris minutilla*). Luego, notamos que sus patas eran negras y el pico corto, recto, robusto y negro, características que permiten diferenciarlo de casi todas las especies del género (López-Lanús 2017) presentes en el área, y así descartar al Playerito Menor. Su plumaje ventral blanco puro, con un semicollar incompleto (Fig. 2), y su rabadilla partida (Fig. 3) fueron los detalles decisivos para que en campo se asignara la identificación final.

El 10 de marzo, durante aproximadamente 25 min, RL y MJ observaron y fotografiaron, en el mismo lugar, un individuo de Playerito Enano alimentándose junto a un grupo pequeño de Playerito Rabadilla Blanca. Pudimos observar de este ejemplar: la línea loreal oscura que llega hasta el ojo, una mancha auricular con leve tonalidad castaña, una corona y espalda estriadas, la garganta amplia de color blanco, como el resto ventral, interrumpido por un semicollar estriado

(más pronunciado que lo que indican las guías) sobre fondo parduzco, y entre el cuello y el hombro, una zona más clara con leve estriado que se continuaba disminuyendo por los flancos blancos. En vuelo, observamos la rabadilla y cola partidas con plumas centrales negras y externas blancas. En reposo, y a comparación del Playerito Rabadilla Blanca, tenía las primarias y cola más cortas.

El 11 de marzo, durante 20 min aproximadamente, RL y MJ observaron nuevamente un individuo de Playerito Enano acompañado de unos pocos individuos de Playerito Rabadilla Blanca. El ejemplar mostró tolerancia a la presencia de los observadores, logrando acercamientos menores a 10 m. Durante todo ese tiempo estuvo buscando alimento activamente en una playa lodosa. Luego, emprendió vuelo junto a otros *Calidris* hasta un sitio distante a unos 100 m aproximadamente. Observamos, a su vez, agresiones de ejemplares de Playerito Rabadilla Blanca sobre el Playerito Enano, pero no parecería ser un comportamiento dirigido particularmente hacia la especie, como fue comentado por otros observadores, ya que el mismo comportamiento se registró intra-específicamente.

El 14 de marzo, por la misma zona que los registros anteriores, dentro de la Laguna Añapiré, Walter Liriel Gómez Umpierrez volvió a observar un ejemplar en las mismas condiciones anteriormente descriptas (EcoRegistros: Gómez Umpierrez 2020).



**Figura 1:** Comparativa de tamaños de Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*; por detrás) y Playerito Enano (*Calidris pusilla*; por delante) observados el 8 de marzo de 2020 en Laguna Añapiré, Santa Fe, Argentina. Fotografía: Oscar D.



**Figura 2:** Playerito Enano (*Calidris pusilla*) observado el 8 de marzo de 2020 en Laguna Añapiré, Santa Fe, Argentina. En la foto se observa el pico corto, grueso y negro, flancos sin estrías, y angosto semicollar. Fotografía: Galimberti A.



**Figura 3:** Playerito Enano (*Calidris pusilla*) observado el 8 de marzo de 2020 en Laguna Añapiré, Santa Fe, Argentina. En la foto se puede apreciar la rabadilla partida, blanca con una faja central negra, que lo diferencia del Playerito Rabadilla Blanca (*Calidris fuscicollis*). Fotografía: La Grotteria J.

## DISCUSIÓN

La Laguna Añapiré se encuentra dentro de una serie de lagunas encadenadas de similares características, ubicadas al Oeste del río Saladillo Dulce, incluidas dentro de una matriz de bosques propios de la ecorregión de El Espinal, con distintos grados de alteración, principalmente debido a la actividad ganadera. Este sitio claramente es un lugar

que amerita protección, ya que es utilizado por distintas especies de playeras para abastecerse en sus rutas migratorias, incluyendo especies escasas u ocasionales para nuestro país (Narosky & Yzurieta 2010; López-Lanús 2017; MAyDS & AA 2017), como es el caso del Playerito Menor (Enrique et al. 2020) y el Playerito Enano. Pese a que es una especie con escasos registros en territorio nacional, podría ser más común y estaría siendo sub-observada dada su apariencia similar a otras especies del género.

## REFERENCIAS

- AZPIROZ AB. (2012). Aves de las Pampas y campos de Argentina, Brasil y Uruguay. Una guía de identificación. PRESSUR, Nueva Helvecia, Uruguay.
- BIRDLIFE INTERNATIONAL. (2020). Species fact sheet: *Calidris pusilla*. Downloaded from <http://www.birdlife.org> on 07/10/2020.
- CHEBEZ JC. (2009). Otros que se van. Fauna Argentina Amenazada. Albatros. Buenos Aires.
- DARRIEU CA, CAMPERI AR, MACEDA JJ & BRUNO F. (2011). Avifauna de la provincia de La Pampa, Argentina: lista de especies (no passeriformes). Acta Zoologica Lilloana, 55: 64-108.
- DE LA PEÑA MR. (2006). Nueva Lista y Distribución de las Aves de Santa Fe y Entre Ríos. Con 425 mapas que indican la distribución de las aves. L.O.L.A.



- DE LA PEÑA MR. (2011). Atlas ornitogeográfico de la Provincia de Santa Fe. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad, 4.
- DE LA PEÑA MR. (2019). Aves Argentinas: Descripción, Comportamiento, Reproducción y Distribución (ACTUALIZACIÓN). TOMO 5. Charadriidae a Rynchopidae. Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino" (Nueva Serie), 5: 1-235.
- ENRIQUE MJ, CAPOVILLA PH, SCHMITHALTER M, SORIA M & CASADEI MC. (2020). Primeros Registros de Playerito Menor (*Calidris minutilla*) en la provincia de Santa Fe. Nuestras Aves, 65.
- GELAIN MA & TOLOSA J. (2011). Aves de la provincia de Río Negro. Lista sistemática. Xolmis CRO, 6: 1-37.
- GÓMEZ UMPIERREZ, WL. (2020). Playerito Enano (*Calidris pusilla*). EcoRegistros [URL: <https://www.ecoregistros.org/site/imagen.php?id=389831>].
- JARAMILLO AP. (2000). Punta Rasa, South America's first vagrant trap? Cotinga, 14: 33-38.
- JARAMILLO AP. (2005). Aves de Chile. Lynx Edicions.
- LÓPEZ-LANÚS B. (2017). Guía Audiornis de las aves de Argentina. Fotos y sonidos. Segunda edición. Audiornis producciones.
- MAYDS & AA (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y Aves Argentina). (2017). Categorización de las Aves de la Argentina (2015). Informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación y de Aves Argentinas, edición electrónica. C. A. Buenos Aires, Argentina.
- NAROSKY S, YZURIETA D & NORES M. (1977). Presencia del Chorlito Enano, *Calidris pusilla*, en la Argentina. Hornero, 11: 433-434.
- NAROSKY T & YZURIETA D. (2010). Aves de Argentina y Uruguay – Birds of Argentina & Uruguay: Guía de Identificación Edición Total – A Field Guide Total Edition. 16a ed. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires. Argentina.
- OSCAR, D. (2020). eBird Checklist: <https://ebird.org/ebird/view/checklist/S65614470>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (08/03/2020).
- RODRÍGUEZ CA, MOSCHIONE FN, SUREDA AL & SANDOVAL AJ. (2010). Monitoreo mensual de tres especies de flamencos en el Monumento Nacional Laguna de los Pozuelos, Jujuy, Argentina. Flamingo. Bulletin of the Flamingo Specialist Group, 18.
- ROST G. (2018). Primeras evidencias fotográficas del Playerito Enano (*Calidris pusilla*) para la provincia de Chubut, Argentina. EcoRegistros Revista, 8: 26-29.
- WOODS RW. (2006). Checklist of Falkland Islands Birds.