



**Figura 1.** Hembra de Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) fotografiada el 15 de Noviembre del 2008 en el Jardín de los Picaflores, Puerto Iguazú, Misiones. Foto: L Castillo.

individuo fotografiado en noviembre de 2008 (Fig. 1), y parecería ser también una hembra. Dado que, en promedio, la longevidad máxima de un picaflor sería de 5–8 años (Schuchmann, 1999), es posible suponer que todos los registros de Picaflor Tijereta en el Jardín de los Picaflores se tratan del mismo individuo.

Agradecemos a Mark Pearman por su ayuda con los registros anteriores en la Argentina y sus ideas sobre los registros, y a Juan Mazar Barnett por sus comentarios y ayuda.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHEBEZ JC, CASTILLO R, GÜLLER RM & FERRARI C (2006) Confirmación de la presencia del Picaflor Tijereta (*Eupetomena macroura*) en Argentina. *Hornero* 21:49–51.
- GUYRÁ PARAGUAY (2004) *Lista comentada de las aves de Paraguay*. Guyrá Paraguay, Asunción.
- MAZAR BARNETT J & PEARMAN M (2001) *Lista comentada de las aves argentinas*. Lynx Edicions, Barcelona.
- SAIBENE CA, CASTELLINO MA, REY NR, HERRERA J & CALO J (1996) *Inventario de las Aves del Parque Nacional Iguazú (Misiones, Argentina)*. LOLA, Buenos Aires.
- SCHUCHMANN KL (1999) Swallow-tailed Hummingbird *Campylopterus macrourus*. Pp. 554 en: DEL HOYO J, ELLIOTT A & SARGATAL J (eds) *Handbook of the birds of the world. Volume 5*. Lynx Edicions, Barcelona.

Recibido: julio 2009 / Aceptado: octubre 2009

Nuestras Aves 54: 69-71, 2009

## NUEVA INFORMACIÓN SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DEL CHORLITO CENICIENTO (*Pluvianellus socialis*) Y DEL DORADITO COPETÓN (*Pseudocolopteryx sclateri*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

James C. Lowen<sup>1</sup>, Juan Mazar Barnett<sup>2</sup> y Mark Pearman<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ríoja 3730, 1636 La Lucila, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: lowen.james@gmail.com

<sup>2</sup> Plaza 2407 2°A, 1430, Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: juanmbarg@gmail.com

<sup>3</sup> Del Ombú 1683, (1714) Ituzaingó, Prov. de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: markpearman@speedy.com.ar

La estancia Rincón de Cobo se ubica entre Mar de Ajó y Pinamar, en el centro-este de la provincia de Buenos Aires, Argentina (36°51'S, 56°40'O). La propiedad tiene una superficie de 5000 ha, sobre la costa del Océano Atlántico e incluye extensos pastizales. JCL y JMB realizaron estudios de campo en todas las estaciones durante el 2008; además, MP realizó algunas observaciones en diciembre de 2008 y JCL visitó la estancia nuevamente en abril de 2009.

De acuerdo a nuestros resultados, Rincón de Cobo es un sitio importante para la conservación de las aves pampeanas, y presentamos información más detallada

al respecto en otra publicación (Lowen y Mazar Barnett en prensa). Aquí presentamos nueva información sobre la distribución de dos especies: el Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) y el Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*).

### Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*)

El Chorlito Ceniciento está considerado Casi Amenazado a nivel mundial, con una población estimada en apenas 2,500-9,999 individuos (BirdLife International 2009). Aunque no hay evidencia de una disminución de la población, está amenazado por depredación y degrada-



ción de los hábitats donde nidifica e inverte (BirdLife International 2009).

La especie nidifica principalmente en las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego, Argentina. Una parte de la población inverna en la misma región, pero otra parte lo hace más al norte, llegando hasta la provincia de Chubut y Río Negro, y a veces, hasta el sur de Buenos Aires. En esta última provincia es ocasional, y se considera un visitante invernal con pocos registros (Narosky y Di Giacomo 1993), la mayoría de los cuales provienen de las Salinas Chicas, cerca de Bahía Blanca y del partido de Mar Chiquita (Narosky *et al.* 1993, Pagnoni 1995, Chiurla 1996, Delhey *et al.* 2001, BirdLife International 2009). Las Salinas Chicas son el único sitio con registros de bandadas grandes (Delhey *et al.* 2001). La localidad más septentrional de donde se conoce la especie es la Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita (37°48'S, 57°29'O), al nordeste de la ciudad de Mar de Plata, de donde se conoce un registro en la albúfera y tres en las cercanías (Savigny *et al.* 2005, S Imberti *in litt.* 2008). Esta reserva es el único Área Importante para la Conservación de las Aves (AICA) en Buenos Aires donde se encuentra la especie. Existe adicionalmente un registro no confirmado de Laguna Brava, provincia de La Rioja (Sosa y Asensio 2000).

El 6 de agosto 2008 JCL y JMB encontraron y fotografiaron dos adultos de Chorlito Ceniciento en la playa de Rincón de Cobo (Fig. 1). El sitio está c. 130 km al nordeste de la Reserva de Biósfera Albúfera de Mar Chiquita. Nuestro registro resulta entonces el más septentrional confirmado para el Chorlito Ceniciento. No podemos

comentar si este registro es excepcional o si esta especie rara pasa el invierno regular u ocasionalmente en las playas alrededor de Rincón de Cobo.

#### **Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*)**

En Argentina, el Doradito Copetón es principalmente conocido en el este de Formosa, este de Chaco, norte y centro-este de Santa Fe, y Corrientes (donde parecen existir poblaciones muy importantes), siendo mucho más escaso y local hacia al sur en el este de Entre Ríos, norte de Córdoba y norte de Buenos Aires (Pearman *in prep.*). En Buenos Aires es considerado como un probable residente raro, distribuido en el noreste de la provincia (Narosky y Di Giacomo 1993).

En Rincón de Cobo, en el área principal de pastizales entre las casas Miralejos y Lo de Matías, JCL y JMB fotografiaron un juvenil del Doradito Copetón el 22 de febrero de 2008 (Fig. 2). En ese momento, nos preguntamos si podría haber nacido en el área. Luego, MP encontró una pareja nidificando entre los días 7–9 de diciembre de 2008, en bañados cerca de la costa, unos 3 km al sudeste del registro previo. Aunque observó a la hembra transportando material de nidificación, fue imposible ubicar el nido a pesar de muchas horas de búsqueda. JCL observó y fotografió uno o dos adultos en el mismo lugar los días 29 y 30 de abril de 2009. No registramos a la especie en otras visitas (en abril, agosto y diciembre de 2008) y creemos que es un especie nidificante rara en Rincón de Cobo.

La localidad más meridional previamente conocida para la especie son dos especímenes de Rosas (35°58'S,



**Figura 1.** Dos adultos de Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*). Rincón de Cobo, Buenos Aires, 6 agosto 2008. Foto: JC Lowen.





**Figura 2.** Inmaduro de Doradito Copetón (*Pseudocolopteryx sclateri*). Rincón de Cobo, Buenos Aires, 22 febrero 2008. Foto: JC Lowen.

58°56'O), provincia de Buenos Aires (Daguerre 1922), por lo que Rincón de Cobo representa una considerable extensión de su distribución de unos 240 km hacia el sudeste.

Agradecemos a Matías Montoreano (Rincón de Cobo) para su ayuda y apoyo de nuestros estudios de campo.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BIRDLIFE INTERNATIONAL (2009) Species factsheet: *Pluvianellus socialis*. [URL: [www.birdlife.org](http://www.birdlife.org)]
- CHIURLA EH (1996) Nuevos registros del chorlito ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves* 25:35–36.
- DAGUERRE JB (1922) Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas, F.C.S. *Hornero* 2:259–271.
- DELHEY KJV, PETRACCI PF & PÉREZ CHF (2001) Observaciones de Charadriiformes en el sur de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves* 42:14–16.
- IMBERTI S (2003) Notes on the distribution and natural history of some birds in Santa Cruz and Tierra del Fuego provinces, Patagonia, Argentina. *Cotinga* 19:15–24.
- LOWEN JC & MAZAR BARNETT J (en prensa) Comentarios sobre aves pampeanas y otras especies de interés en un 'nuevo' sitio de interés en la provincia de Buenos Aires, la estancia Rincón de Cobo. *Nuestras Aves*.
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG (1993) *Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus*. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y LOLA, Buenos Aires.
- NAROSKY T, DI GIACOMO AG & BARBARSKAS M (1993) Presencia invernal de *Pluvianellus socialis* en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Hornero* 13:309–310.
- PAGNONI GO (1995) Censos de chorlos y playeros en Bahía Nueva (Puerto Madryn, Chubut). *Hornero* 1:60–63.
- SAVIGNY C, ISAACH JP & FAVERO M (2005) Reserva de Biosfera Albufera de Mar Chiquita. Pp. 49–50 en: DI GIACOMO A (ed) *Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación del biodiversidad*. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- SOSA H & ASENSIO H (2000) *Censo estival de flamencos, Reserva Laguna Brava: observaciones sobre la Situación de la Avifauna Acuática y Terrestre y colonia de nidificación de Flamenco Puna, La Rioja, Argentina*. Informe no publicado.

Recibido: septiembre 2009 / Aceptado: febrero 2010