

ACTUALIZANDO LA DISTRIBUCION DE NUESTRAS AVES

En la comprobación de la maravillosa dinámica de la naturaleza incluimos en la Sección una serie de registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas

CHINCHERO GRANDE EN NEUQUEN Y RIO NEGRO

De regreso de una excursión al Parque Nacional Lanín, junto a Axel Bos y Hernán Rodríguez Goñi, pasamos unos días en el establecimiento Don Julio, próximo a la ciudad de Villa Regina en la provincia de Río Negro, del 4 al 7 de abril de 1985.

Allí pudimos observar una pareja del Chinchero Grande (*Drymnornis bridgesii*), caracterizado por su extremadamente largo y curvo pico. Sus hábitos terrícolas fueron constatados mientras buscaba su alimento debajo de un gran Sauce Colorado, cercano a un afluente del río Negro.

La presencia de esta especie en el lugar, ya había sido apuntada para la misma época del año anterior y su habitualidad fue confirmada por el ingeniero Juan M. Betbeder, propietario del establecimiento, ornitófilo y socio de la AOP.

Asimismo este dendrocoláptido fue observado por el ornitoguíá Tomás Sheridan, a unos 15 kilómetros de la localidad de Senillosa, departamento Confluencia, provincia de Neuquén, en el verano del corriente año.

En su trabajo "Nuevos registros de aves para la Patagonia", el doctor Navas establece como localidad más

meridional en que se ha registrado esta especie, a Julián Romero, provincia de Río Negro, en base a un ejemplar del Museo Argentino de Ciencias Naturales capturado por el señor William Partridge el 29 de mayo de 1963.

El doctor Olrog, 1979, establece las provincias de Buenos Aires, Mendoza y La Pampa como límite austral para esta especie.



Chinchero Grande (*Drymnornis bridgesii*)
Dibujo: Guillermo Gil Cortés

Queda de esta forma el Chinchero Grande incorporado a la avifauna neuquina y rionegrina.

Bibliografía

Navas, J.R., 1970. Nuevos registros de aves para la Patagonia. *Netrópica*, 16 (49):

11-16.

Olrog Cl., 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Ins. Miguel Lillo. Tucumán.

——, 1984. Las aves argentinas - Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales.

Horacio Rodríguez Moulin

REGISTROS NUEVOS PARA EL CHACO

El Parque Nacional Chaco, de 15.000 hectáreas de superficie alberga muestras de todos los ambientes característicos del distrito chaqueño oriental. Creado en el año 1934, está ubicado a 130 kilómetros al oeste de Resistencia y a 6 kilómetros de la localidad de Capitán Solari.

La presente comunicación corresponde a observaciones efectuadas en los meses de enero y febrero de 1985, en el citado Parque Nacional y sus alrededores, con motivo de hallarme cumpliendo prácticas del XV Curso de Guardaparques.

Pitangá - *Megarhynchus pitangua* Tyrannidae

Esta especie fue observada en dos ocasiones, el 12 y el 14 de enero, asentado siempre en la parte superior de los árboles y fue fotografiado. Según Olrog (1979. Nueva lista de avifauna argentina, Op. Lill 27: 1-324. Tucumán, Argentina) la distribución

de esta especie comprende las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.

Corbatita de los Bañados - *Sporophila palustris* - Emberizidae

El género *Sporophila* con 14 especies representadas en la Argentina constituye un grupo de aves de distribución muy localizada.

La especie fue observada con frecuencia en un pequeño estero a la vera del camino de acceso al parque; en número variable de machos y hembras, generalmente asentados en los tallos de las gramíneas más altas. La distribución conocida para la especie comprende las provincias de Entre Ríos y Corrientes (Olrog, op. cit. y Narosky, 1984. Registros nuevos e infrecuentes de aves argentinas: El Hornero Vol. XII (2)).

Guardaparque
Carlos Saibene