

Queda de esta forma el Chinchero Grande incorporado a la avifauna neuquina y rionegrina.

Bibliografía

Navas, J.R., 1970. Nuevos registros de aves para la Patagonia. *Netrópica*, 16 (49):

11-16.

Olrog Cl., 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Ins. Miguel Lillo. Tucumán.

——, 1984. Las aves argentinas - Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales.

Horacio Rodríguez Moulin

REGISTROS NUEVOS PARA EL CHACO

El Parque Nacional Chaco, de 15.000 hectáreas de superficie alberga muestras de todos los ambientes característicos del distrito chaqueño oriental. Creado en el año 1934, está ubicado a 130 kilómetros al oeste de Resistencia y a 6 kilómetros de la localidad de Capitán Solari.

La presente comunicación corresponde a observaciones efectuadas en los meses de enero y febrero de 1985, en el citado Parque Nacional y sus alrededores, con motivo de hallarme cumpliendo prácticas del XV Curso de Guardaparques.

Pitangá - *Megarhynchus pitangua* Tyrannidae

Esta especie fue observada en dos ocasiones, el 12 y el 14 de enero, asentado siempre en la parte superior de los árboles y fue fotografiado. Según Olrog (1979. Nueva lista de avifauna argentina, Op. Lill 27: 1-324. Tucumán, Argentina) la distribución

de esta especie comprende las provincias de Misiones, Corrientes y Formosa.

Corbatita de los Bañados - *Sporophila palustris* - Emberizidae

El género *Sporophila* con 14 especies representadas en la Argentina constituye un grupo de aves de distribución muy localizada.

La especie fue observada con frecuencia en un pequeño estero a la vera del camino de acceso al parque; en número variable de machos y hembras, generalmente asentados en los tallos de las gramíneas más altas. La distribución conocida para la especie comprende las provincias de Entre Ríos y Corrientes (Olrog, op. cit. y Narosky, 1984. Registros nuevos e infrecuentes de aves argentinas: El Hornero Vol. XII (2)).

Guardaparque
Carlos Saibene