

Garcita Bueyera (*Bubulcus ibis*): Esta especie era la dominante de la colonia, se encontraron entre 130-150 nidos distribuidos en todos los sectores. En sólo tres nidos había pichones recién nacidos, los restantes contenían huevos. Los nidos estaban entre 1,1 y 2,9 metros de altura. En general son muy similares a los de *E. thula*; con un diámetro externo de 22-28 centímetros, una altura de 12-15 centímetros y una profundidad de unos 3-4 centímetros; hechos de tallos delgados de sa-

randí. Huevos: Los nidos contenían de dos a cuatro huevos, sobre todo tres o cuatro, en distintos estados de incubación. Las medidas promedio de seis fueron: 46,8 x 32,7 milímetros.

En la segunda visita a la colonia 10-1-85) se observaron pichones en distintos estados de desarrollo en la mayoría de los nidos. También se habían agregado unos 15-20 nidos, los que tenían posturas frescas.

Sergio Salvador
Tito Narosky - Lucio Salvador

SOBRE UN CONTENIDO ESTOMACAL DE MACACITO COMUN

El día 12 de septiembre de 1978, el señor Gabriel Piloni Tamayo me entregó, adjuntando una nota aclaratoria, tres estómagos de *Podiceps* que él mismo consideró como pertenecientes a la especie *Podiceps rolland* (Macacito común), conseguidos en ejemplares cazados en la laguna de Navarro (provincia de Buenos Aires) el día 3 del citado mes en horas del mediodía.

Al proceder al análisis del contenido estomacal del espécimen número 1, hembra, encontré solamente material vegetal, sin ningún vestigio de artropodofauna.

En el estómago del ejemplar número 2, hembra, además del mismo vegetal, hallé una apreciable cantidad de pequeños artrópodos, evidentemente crustáceos y un diminuto élitro de insecto (Coleoptera).

En la cavidad estomacal del ejemplar número 3, macho, apareció también el mismo material vegetal y los pequeños crustáceos citados para el número 2, si bien en menor cantidad.

La determinación específica de los pequeños crustáceos es la siguiente: *Hyaella curvispina* Shoemaker, F. Cavallieri det. 22-2-1979, pertenecientes a la

familia Hyaellidae del orden Amphypoda. El viejo amigo doctor Fiorello Cavallieri, investigador del Instituto Nacional de Microbiología Sanitaria, al cual mucho agradezco por su colaboración, estudió y determinó los especímenes de crustáceos nombrados.

No observé ningún vestigio de ictiofauna durante el análisis de las piezas estomacales nombradas.

Hugo Bregante



Macacito (*Podiceps rolland*)
Dibujo: Guillermo Gil Carbó