



## ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 52:20

## FALAROPO PICO GRUESO (*Phalaropus fulicarius*) Y GUAYATA (*Chloephaga melanoptera*) EN EL PARQUE PROVINCIAL ACONCAGUA, MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Güller<sup>1</sup>, Ricardo Calí<sup>2</sup> y Flavio Martínez<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Blanco Encalada 5033, 5° B, (1431) Buenos Aires, Argentina - rmguller@uolsinectis.com.ar

<sup>2</sup>Humboldt 2094, 3° C, (1414) Buenos Aires, Argentina - caliricardo@hotmail.com

<sup>3</sup>Dirección de Recursos Naturales de Mendoza, Parque General San Martín s/n (5500) Mendoza - martinezflavio@yahoo.com.ar

El 3 de noviembre de 2004 se observó y fotografió en la laguna de los Horcones (32° 48' 37" S, 69° 56' 56" O), dentro del Parque Provincial Aconcagua, dos especies con pocos antecedentes recientes para la zona.

### Falaropo pico grueso (*Phalaropus fulicarius*)

Un ejemplar confiado nadaba en círculos mientras se alimentaba cerca de la costa. Pudimos ver claramente el pico corto y grueso, negro, con base clara; su silueta robusta; la corona y la línea postocular, oscura; el dorso gris poco estriado; la frente, cuello y partes ventrales blancas, tratándose de un ejemplar en plumaje de reposo. La especie migra del Ártico, donde nidifica (Narosky e Yzurieta, 2003). Esta sería la primera cita para el Parque Provincial Aconcagua y la provincia de Mendoza (ver Roig, 1965; De la Peña, 1999).

Mazar Barnett y Pearman (2001) analizan los datos en la Argentina del falaropo pico fino (*P. lobatus*), registrado para el mismo lugar de nuestra observación, y consideran a la especie en el país como hipotética, por lo cual tal vez el registro previo corresponda en realidad a *P. fulicarius*.



Ejemplar de falaropo pico grueso encontrado en laguna de los Horcones, Mendoza.  
Foto: R. Güller.

### Guayata (*Chloephaga melanoptera*)

En los alrededores de la laguna de los Horcones, registramos dos ejemplares alimentándose en los mallines. Cuenta con citas antiguas para la provincia en la zona de Tunuyán (Reed, 1916; Sanzin, 1918); Roig (1965) agrega Llanquanelo, Laguna



Individuos de guayatas detectados en el norte de Mendoza.

Diamante, río Malargüe y Tupungato. Con este registro se confirmaría su presencia en el Parque Provincial Aconcagua y la provincia de Mendoza.

Agradecemos a José Leopoldo León (Director de Recursos Naturales Renovables de Mendoza) y Guillermo Romano (Jefe de Áreas Naturales Protegidas) por el apoyo logístico prestado. También a Juan Carlos Chebez por alentarnos a hacer la nota y la revisión del manuscrito.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas, Lista y Distribución. L.O.L.A. Buenos Aires, 244 páginas.
- MAZART BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Lynx Edicions. Barcelona, 164 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Manzini Editores. Buenos Aires, 346 páginas.
- REED, C. S. 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Museo Educacional de Mendoza, 47 páginas.
- ROIG, V. G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Boletín de Estudios Geográficos Mendoza 12 (49): 175 - 222.
- SANZIN, R. 1918. Lista de aves mendocinas. El Hornero 1 (3): 147 - 152.

Recibida: junio 2005