



➤ ARTÍCULOS

bablemente esta especie, con un canto metálico parecido al del zorzal plumizo (*Turdus nigriceps*) ha pasado desapercibida. El desplazamiento austral puede ir siguiendo áreas en mejor estado de conservación como las que se encuentran en el sur de Salta y Tucumán, donde las selvas sufren relativamente menor explotación que otros ambientes. Hemos iniciado acciones para monitorear las poblaciones de este zorzal en las Cumbres Calchaquies, Sierra de San Javier y de Metán.

Agradecemos a los integrantes del Curso de ornitología de campo y anillado de aves CENAA 2005 y a los Guardaparques del Parque Biológico Sierra de San Javier.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía Lola, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
- OLROG, C. C. 1973. Notas Ornitológicas. IX. Sobre la colección del Instituto Miguel Lillo de Tucumán. Acta Zoológica Lilloana, 30:1-11.
- RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1994. The birds of the South America. Volume I. The oscine passerines. Univ. of Texas Press, 516 páginas.

Recibida: noviembre 2005

Revista Nuestras Aves, 52:31

NUEVOS DATOS DE LA DISTRIBUCIÓN DEL GAVIOTÍN LAGUNERO (*Sterna trudeaui*) Y DEL ZORZAL CHIGUANCO (*Turdus chiguanco*) EN CHUBUT, ARGENTINA

Mariano A. Gelain¹ y Mariano Diez Peña²

¹Correo Central, Fuera de Radio (8400) San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro
²F. Fader 173 (8400) San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro - mdiezpena@arelauquen.com

El 17 de octubre del 2005 en la Reserva Provincial Laguna Carri-Laufquen Chica (41° 25' 73,5" S; 69° 43' 72,4" W), 15 km al norte de la localidad de Ingeniero Jacobacci (25 de Mayo), Río Negro, observamos un gaviotín lagunero (*Sterna trudeaui*), a pocos metros de la desembocadura del arroyo Huahuel Niyeu. Considerada de presencia accidental en el oeste de Río Negro (Gelain *et al.*, 2003; Christie *et al.*, 2004), la especie no es incluida para las lagunas Carri-Laufquen por Casas (1992), y cuenta con cinco localidades conocidas en la provincia (Paz, 1997).

El 20 de octubre de 2005 registramos un ejemplar de zorzal chiguanco (*Turdus chiguanco*) en una arboleda exótica que sirve como protección al casco principal de la Estancia El Pedral (42° 57' 51,0 S; 64° 23' 47,3' W), ubicada en Punta Ninfas (Biedma), Chubut. Los pobladores del área nos comunicaron que había llegado en agosto de ese año. En tres ocasiones lo vimos alimentar a un volantón. Su presencia en la provincia fue documentada recientemente, constituyendo su límite austral de distribución conocida (ver Pérez *et al.*, 2006).

BIBLIOGRAFÍA

- CASAS, A. E. 1992. La avifauna de las Lagunas Carri-Laufquen Chica y Cari-Laufquen Grande, Departamento 25 de Mayo, Río Negro. El Hornero, 13: 248-252.
- CHRISTIE, M. E., J. RAMILO y M. D. BETTINELLI. 2004. Aves del noroeste patagónico. Sociedad Naturalista Andino-Patagónica. San Carlos de Bariloche, 199 páginas.
- GELAIN, M. A., L. SYMPSON y F. F. VIDOZ. 2003. Aves de Bariloche. Lista comentada de aves del Departamento Bariloche, Río Negro, Argentina. Editorial Libros del Mediodía, 91 páginas.
- PAZ, D. 1997. Aves de la provincia de Río Negro. II Localidades confirmadas. Consejo de Ecología y Medio Ambiente, Del. Bariloche. Pp. 1-24.
- PÉREZ, C. H. F., K. DELHEY y P. F. PETRACCI. 2006. aves nuevas o poco frecuentes del norte de la Patagonia argentina. Nuestras Aves, 52: 25-29

Recibida: noviembre 2005