



► ARTICULOS

portamiento. Pude ver las siguientes características que determinaron que era un *Phalaropus fulicarius*: pico corto y algo grueso con la base media amarillenta, mancha ocular negra y zona de la nuca negruzca; en vuelo, ala gris oscura con una notoria banda alar blanca.

El falaropo pico grueso es un ave pelágica y se lo encuentra ocasionalmente en la costa, ríos, lagos y lagunas; es un visitante estival del hemisferio norte donde nidifica (Couve y Vidal, 2003; Narosky e Yzurieta, 2003). Ya existían datos de su presencia para Chubut (Camperi, 1998; Chebez *et al.*, 1998). Los registros en la Argentina son accidentales, aunque por la cantidad de observaciones existentes tal vez resulte un errante de llegada regular (M. Pearkman, *in litt.*).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CAMPERI, A. R. 1998. Avifauna andino patagónica: lista comentada de especies. Physis (Secc. C.), 56: 33-46.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía N° 12, L.O.L.A., Buenos Aires, 126 páginas.
- COUVE, E. y C. VIDAL. 2003. Aves de Patagonia, Tierra del Fuego y Península Antártica. Islas Malvinas y Georgia del Sur. Editorial Fantástico Sur Birding Ltda. 660 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. 15° edición. Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 348 páginas.

Recibido: diciembre 2005

Revista Nuestras Aves, 52:35-36

CITA DE CHOROY (*Enicognathus leptorhynchus*) EN LA PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

Horacio F. Matarasso¹ y Henry Webster²

¹Universidad Nacional del Comahue – AUSMA – Pasaje de la Paz 235 (8370) San Martín de los Andes, Argentina - aves@smandes.com.ar

² 25 W. Skippack Rike. Ambler, PA, USA - hcw@webco-controls.com

No existen registros previos fehacientes del choroy en la provincia del Neuquén (Del Valle *et al.*, 1989; Acerbo, 2000; Christie *et al.*, 2004), aunque si numerosos relatos de observadores locales y guardaparques, que creen haberlo visto en el área del paso Tromen, Parque Nacional Lanín, Neuquén. Veiga *et al.* (2005) no lo tratan en su listado principal de las aves de Neuquén, pero lo mencionan en un apartado de especies dudosas con un registro para Villa Pehuenia y señalan la existencia del paraje Ruca Choroy (que significaría «casa del choroy»). Veiga y Saibene (2005) indican que hay observaciones de ejemplares en Aluminé-Moquehue, que les fueron comunicadas por David Grosfield. Fjeldsa y Krabbe (1990) lo incluyen en la provincia, lo cual es corregido por Mazar Barnett y Pearman (2001) en la lista de especies erróneamente citadas, aunque indican que la presencia ocasional de esta especie en la Argentina no es imposible.

El 25 de febrero de 2006 a las 10 de la mañana observamos dos individuos en el bosque de pehuén

(*Araucaria araucana*) dentro de la estancia San Huberto, Paso Tromen (71° 25' W, 39° 35' S), próxima al Parque Nacional Lanín. Pudimos ver los choroy a unos 40 metros de distancia con binoculares (uno de 10 x 25). En la zona es común su congénere, la cachaña (*Enicognathus ferrugineus*), de la que se distingue en una primer aproximación por su mayor tamaño, y viéndola en detalle por su frente y loral más rojizos, sobre un pico cuya maxila es más larga y aguda. Los individuos estaban posados y alimentándose en un pehuén, en una zona donde esta especie crece junto a hayas australes del género *Nothofagus*.

La presencia del choroy en el área no es sorprendente. Además de los antecedentes comentados para el país, la especie también frecuente los bosques de pehuén en la temporada de maduración de sus semillas del otro lado del límite en la Republica de Chile (Jaramillo, 2004).

En la Argentina, consideramos que se trata de una especie que ocasionalmente puede ser encontrada



➤ ARTICULOS

en esta área. Difícilmente tenga poblaciones estables, pues la estancia es un sitio de atracción para los observadores de aves y no había sido detectada con anterioridad.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

ACERBO, P. E. 2000. Aves del Río Neuquén. Autoridad Interjurisdiccional de los ríos Limay, Neuquén y Negro. Neuquén.
 CHRISTIE, M. I; E. J. RAMILO y M.D. BETTINELLI. 2004. Aves del Noroeste Patagónico: Atlas y Guía. Sociedad Naturalista Andino-Patagónica. L.O.L.A (Literature of Latin America). Buenos Aires, 328 páginas.
 DEL VALLE, A. E.; R. GADER, M. C. FUNES y Cuerpo de Guardafaunas. 1989. Aves y mamíferos de la provincia del Neuquén. Listados actualizados. Dirección de Ecología. Neuquén, 130 páginas.

FJELDSA, J y N. KRABBE. 1990. Birds of the High Andes. Zoological Museum, Universidad of Copenhagen and Apollo Books. Denmark.
 JARAMILLO, A. 2004. Birds of Chile. Princeton Field Guides. Princeton y Oxford, 240 páginas.
 MAZAR BARNETT, J y M. PEARMAN. 2001. Lista comentada de las aves argentinas. Editorial Lynx. Barcelona, 164 páginas.
 VEIGA, J. O., F. FILIBERTO, M. BABARSKAS y C. SAVIGNY. 2005. Aves de la Provincia de Neuquén. Patagonia Argentina. Lista comentada y distribución. Buenos Aires. Edit. RyC. 184 páginas.
 VEIGA, J. O. y C. SAIBENE. 2005. Aluminé-Moquehue. En A. S. Di Giacomo (editor), Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 332-333. Temas de Naturaleza & Conservación, 5. Aves Argentinas / AOP. Buenos Aires, 514 páginas.

Recibida: mayo 2006

Fe de erratas - Nuestras Aves 51

En el artículo «**NUEVOS REGISTROS Y COMENTARIOS SOBRE AVES ACUÁTICAS ESCASAS O FUERA DE SU RANGO DE DISTRIBUCIÓN CONOCIDO EN EL CENTRO DE ARGENTINA**» de Pablo Michelutti y Ricardo Torres, publicado en la revista Nuestras Aves 51, de junio de 2006, se omitió la inclusión del texto que se transcribe a continuación. Pedimos disculpas por este error grave de edición.

(viene de página 33)

Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003); fuera de la Argentina ya fue observado a la altura del nivel del mar en la costa del Perú (Blake, 1977; Wiersma, 1996).

Playerito manchado (*Actitis macularia*)

La especie fue observada por primera vez en la provincia de Córdoba por J. Amat en diciembre de 1987, en Miramar, y posteriormente por uno de nosotros (P. Michelutti) en marzo de 1991,

en el mismo lugar, registrándose en ambas ocasiones solamente 1 ejemplar (Nores, 1996; Torres y Michelutti, 2001a). Otro individuo fue observado también en Miramar, el 16 de febrero de 1998.

Gaviota gris (*Larus scoresbii*)

(continúa en el inicio de la página 34)