



> ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 51:21

## REGISTRO DE PARDELA CHICA (*Puffinus assimilis*) EN EL GOLFO NUEVO, PROVINCIA DEL CHUBUT, ARGENTINA

Axel Bos

stercorarido@hotmail.com

El 11 de febrero de 1992, en Playa Paraná, sobre la costa sudoeste del Golfo Nuevo, a unos 6 km al sudeste de la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut, fue hallado un ejemplar muerto de pardela chica (*Puffinus assimilis*) sobre la línea de pleamar. El cuerpo, ya reseco, conservaba en muy buen estado su plumaje.

Olrog (1968) considera que la pardela chica hace desplazamientos desde Tristán da Cunha y Gough hacia las costas argentinas; y Harrison (1983) destaca un registro hecho en el Mar Argentino al sudeste de Mar del Plata (39° 20'S y 56° 25'O), posiblemente individuos nidificantes de las islas atlánticas mencionadas. Posiblemente, el individuo hallado en el Golfo Nuevo provenga de estas mismas islas por ser el área de reproducción más cercana a Patagonia (ver Carboneras, 1992).

Narosky e Yzurieta (1987) adjudican a esta especie la probabilidad de observación «I: de presencia hipotética» para la Argentina.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CARBONERAS, C. 1992. Family Procellariidae (Petrels and Shearwaters). En J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal, Handbook of the birds of the world, I: 253-257. Lynx Edicions. Barcelona, 696 páginas.
- HARRISON, P. 1983. Seabirds, an identification guide. Croom Helm Ltd.
- NAROSKY, T y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata. Vázquez Mazzini Editores, Buenos Aires, 343 páginas.
- OLROG, C. C. 1968. Las aves sudamericanas. Instituto Miguel Lillo, Universidad Nacional de Tucumán, 345 páginas.

Recibida: septiembre de 2004

Revista Nuestras Aves, 51:21-23

## PRIMER REGISTRO DE NIDIFICACIÓN DEL PICAFLOR ANDINO CASTAÑO (*Oreotrochilus adela*) EN LA ARGENTINA

Juan Ignacio Areta<sup>1</sup>, Solana Vila Moret<sup>1</sup>, Juan Mazar Barnett<sup>2</sup> y Hernán Casañas<sup>3</sup>

<sup>1</sup> CICyTTP-CONICET, Materi y España, (3.105) Diamante, Entre Ríos, Argentina

<sup>2</sup> Forest 1.531, 1º B (1.430) Buenos Aires, Argentina

<sup>3</sup> Relincho, Cruz Alta (5.178) La Cumbre, Córdoba, Argentina

El picaflor andino castaño (*Oreotrochilus adela*), anteriormente considerado un endemismo de Bolivia, fue recientemente registrado por primera vez en la Argentina en Yavi, Jujuy (Álvarez y Blendinger, 1995). Desde entonces se lo ha registrado regularmente en esa localidad, así como en Yavi Chico (Mazar Barnett *et al.*, 1998; Mazar Barnett y Pearman, 2001; obs. pers.). En líneas generales *O. adela* habita quebradas áridas o semiáridas entre los 2.500 m y los 4.000 m de altura, con vegetación correspondiente a las provincias biogeográficas de la Puna y la Prepuna (Cabrera y Willink, 1980). En los alrededores de Yavi los hábitats de Puna se mez-

clan con elementos de la provincia biogeográfica Prepuneña (Cabrera y Willink, 1980), encontrándose quebradas con bosquecillos de churqui (*Prosopis ferox*) y grupos del cactus cabeza de viejo (*Oreocereus celsianus*).

Durante visitas recientes a Yavi encontramos dos nidos de *O. adela*, una de las especies del género de las que menos se conoce sobre sus hábitos nidificatorios (Schuchmann, 1999). Presentamos aquí nueva información que confirma su presencia en el país, representa los primeros registros de nidificación en la Argentina, y aporta nuevos datos al conocimiento sobre los hábitos de cría de la especie.