



ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 51:29-31

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA SANTA FE, ARGENTINA. PARTE II.

Martín Manassero 1, Horacio Luna 2 y Luciano Acquaviva 3

1-Suchón 531 (3.013). San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: martinmmssc@hotmail.com

2-Las Heras 1.780 (2.121). Pérez, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: horacioluna@hotmail.com

3-San Sebastián 2.052 (2.121). Pérez, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: lucianoacquaviva@hotmail.com

Se dan a conocer registros de aves realizados en la provincia de Santa Fe, principalmente en el extremo norte de la cuña boscosa y en el sureste de la región pampeana. Los registros obtenidos en la estancia Ferrero, situada a 16 km al oeste de Villa Guillermina (28°15'S; 59°28'O), departamento General Obligado, figuran como «al oeste de Villa Guillermina». En este lugar, se realizaron observaciones de aves, que fueron publicadas anteriormente (Manassero *et al.*, 2004).

Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*)

En bosques altos al oeste de Villa Guillermina el 8 de enero de 2005 observamos y escuchamos la voz de una hembra y el 10 de octubre de 2005 fotografiamos otra vez una hembra. Esta rapaz contaba con una sola cita para Santa Fe (De la Peña, 2005).

Águila coronada (*Harpophalioetus coronatus*)

El 9 de enero de 2005, se registró un ejemplar, que emitía un piído agudo, posado en la copa de un espina corona (*Gleditsia amorphoides*), de una isleta de monte alto al oeste de Villa Guillermina; un ejemplar en bosques a 25 km al noroeste de Villa Minetti, 9 de Julio, el 2 de febrero de 2006. Si bien, la especie tiene una amplia distribución en Santa Fe, no contaba con registros recientes para el norte de la cuña boscosa, ni para el departamento General Obligado (Pautasso, *et al.*, 2003). Es considerada una especie vulnerable a nivel mundial (BirdLife, 2000) y nacional (Fraga, 1997).

Halcón negro chico (*Falco rufigularis*)

Se observó un ejemplar cazando en vuelo en una sabana, el 9 de enero de 2005, al oeste de Villa Guillermina. Estaba citado para Santa Fe, por Olrog (1979), sin embargo esta cita se consideraba antigua y requería ser confirmada con registros modernos (De la Peña, 1997).

Chorlito palmado (*Charadrius semipalmatus*)

Se observó un ejemplar el 13 de diciembre de 2002, que pudo fotografiarse, correteando en costas de una

laguna, en cercanías de Pérez, departamento Rosario, junto a otros chorlos (*Himantopus melanurus*, *Pluvialis dominica*, *Charadrius collaris*, *Calidris melanotos*, *Calidris bairdii* y *Calidris fuscicollis*). La especie, solo tenía una cita para Santa Fe, en la laguna El Bonete, departamento Vera (De la Peña, 1988).

Agachona chica (*Thinocorus rumicivorus*)

Se observó un ejemplar el 17 de julio de 2004 y otro el 22 de agosto del mismo año, en un ambiente de espartillares húmedos y aguadas al sur del arroyo Saladillo, cerca de Soldini, departamento Rosario, junto a varios ejemplares de aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) y un ejemplar de espartillero enano (*Spartonoica maluroides*). La especie tiene una cita anterior, en Santa Fe en el departamento Caseros en junio de 1991 (De la Peña, 1997 y com. pers.).

Atajacaminos colorado (*Caprimulgus rufus*)

El 10 de enero de 2005, registramos un ejemplar en un pajonal, cercano a un cañaveral de picanilla (*Guadua paraguayana*) y a un bosque de sangre de drago (*Croton urucurana*), en Puerto Piracuacito (28°11'S, 59°06'O), departamento General Obligado. La especie estaba citada para el norte de Santa Fe, por Olrog (1979) y luego fue avistada al este de Villa Ocampo, departamento General Obligado (Cracogna, en De la Peña, 1996).

Añapero boreal (*Chordeiles minor*)

Observamos varios ejemplares el 10 de enero de 2005, en Puerto Piracuacito. En Pérez, se registraron algunos ejemplares el 10 de diciembre de 2003. En Santa Fe, es considerado raro (De la Peña, 1997) y solo estaba citado para el centro de la provincia (De la Peña, 1988; Pautasso, 2002).

Picaflor garganta blanca (*Leucochloris albicollis*)

Observamos un ejemplar el 27 de mayo de 2004, en una zona con bosquecillos de aromitos (*Acacia caven*), talas (*Celtis* sp.) y algarrobos blancos (*Prosopis*



ARTICULOS

alba), entre otros árboles, situados en costas del arroyo Saladillo, a 1 km al oeste del río Paraná, a la altura de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario; un individuo el 16 de marzo de 2006, en costas de Rosario, departamento Rosario. Serían los primeros registros para Santa Fe (ver De la Peña, 1997).

Viudita común (*Knipolegus aterrimus*)

Se registró un macho el 5 de enero de 2002, en Villa Ocampo; un macho el 29 de marzo de 2002 en Villa Guillermina; una hembra el 28 de mayo de 2000 y dos machos el 26 de octubre de 2002, en el arroyo Monje, cerca de Monje, departamento San Jerónimo y un macho y una hembra, el 16 de junio de 2002 en bosquecillos costeros del río Carcarañá, en El Espinillo, a 20 km al norte de Casilda, departamento Caseros. La especie en Santa Fe es escasa y solo estaba citada para el centro provincial (De la Peña, 1997).

Viudita pico celeste (*Knipolegus cyanirostris*)

Se observó un macho en un área boscosa, el 8 y el 11 de enero de 2004, respectivamente, al oeste de Villa Guillermina, departamento General Obligado. Solo tenía una observación en Santa Fe, en Aguará Grande, departamento San Cristóbal (De la Peña, 1996).

Fío fío silbón (*Elaenia albiceps*)

Se observó y escuchó un ejemplar el 21 julio de 2001, en un bosque de Algarrobos blancos, chañares (*Geoffroea decorticans*) y talas, entre otros árboles, al norte de Matilde, departamento Las Colonias. Es considerada una especie que nidifica en Patagonia y que migra hacia el norte en otoño e invierno (Narosky y Yzurieta, 2003). Estaba citada en Santa Fe, para el departamento 9 de Julio (Giai, 1950), aunque requería ser confirmada con registros modernos (De la Peña, 1997).

Fío fío oliváceo (*Elaenia mesoleuca*)

Observamos y escuchamos las voces, de uno y dos ejemplares respectivamente el 7 y el 8 de enero de 2004, en una isleta de monte alto al oeste de Villa Guillermina. Fue identificado en base a De la Peña y Rumboll (1998). Fue citada para el norte de Santa Fe por Hartert y Venturi (1909). Este dato se consideraba antiguo y requería ser confirmado por registros modernos (De la Peña, 1997).

Urraca morada (*Cyanocorax cyanomelas*)

Registramos dos ejemplares el 10 de enero de 2005, que se desplazaban por las copas de una isleta de monte alto, al oeste de Villa Guillermina; y nuevamente dos individuos el 11 de octubre de 2005 en el

mismo lugar. La especie estaba citada para Santa Fe, por Martínez Achenbach (1957) y luego por Baldo *et al.* (1995), en El Sombrerito, departamento General Obligado.

Cachirla pálida (*Anthus hellmayri*)

Observamos cuatro y un ejemplar, el 21 y 22 de agosto de 2003, respectivamente, en espartillares (*Spartina densiflora*), próximos a la laguna La Salada, a 12 km al sureste de Rufino, departamento General López. En estos espartillares, también observamos ejemplares de canastero coludo (*Asthenes pyrrholeuca*), espartillero pampeano (*Asthenes hudsoni*) y ratona aperdizada (*Cistothorus platensis*). Además registramos un ejemplar el 5 de julio de 2005, en Pérez, departamento Rosario. La cachirla pálida, tiene dos citas en Santa Fe, una de Giai (1950) en el departamento 9 de Julio y otra en la Reserva Federico Wildermuth, cerca de Wildermuth, departamento San Martín (Straneck y Viñas, en De la Peña, 1997). La laguna La Salada, fue declarada Reserva Municipal y forma parte de la cuenca de la Laguna La Picaza, que está considerada un área valiosa de pastizal, en la ecoregión de las pampas (Bilenca y Miñarro, 2004).

Capuchino castaño (*Sporophila hypochroma*)

Registramos varios ejemplares los días 11 y 12 de enero de 2005, en pastizales húmedos a 12 km al oeste de Puerto Piracuacito, junto a algunos ejemplares de corbatita dominó (*Sporophila collaris*) y de capuchino canela (*Sporophila minuta*). Pudieron fotografiarse dos machos. Sería el primer registro para Santa Fe (ver De la Peña, 1997). Es considerada una especie casi amenazada a nivel mundial (BirdLife, 2000) y vulnerable en Argentina (Fraga, 1997).

Agradecemos a Francisco Broggi de la estancia Ferrero de Villa Guillermina, Norberto Mollo, Alejandro Gutiérrez Márquez, Mariano Cracogna, Martín De la Peña, Rodolfo Luna y a Marcela Di Salvo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BALDO, J. L., M. ORDANO, Y. ARZAMENDIA y A. R. GIRAUDO. 1995. Nuevos registros de aves para las provincias de Santa Fe y Corrientes. República Argentina. Revista Asociación Ciencias Naturales Litoral, 26 (2): 55-59.
 BILENCA, D. N. y F. O. MIÑARRO. 2004. Identificación de áreas valiosas de pastizal (AVPs) en las pampas y campos de Argentina, Uruguay y sur de Brasil. Fundación Vida Silvestre Argentina. Buenos Aires, 352 páginas.
 BIRDLIFE INTERNATIONAL. 2000. Threatened birds of the World. Lynx Edicions and Birdlife. Barcelona and Cambridge.



ARTICULOS

- DE LA PEÑA, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, Argentina. *El Hornero*, 14: 87-89.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. Monografía LOLA 15. Buenos Aires, 128 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. *Nuestras Aves* 16: 17-18.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves Argentinas. Lista y distribución. LOLA. Buenos Aires, 195 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 2005. Milano pico garfio (*Chondrohierax uncinatus*) en Esperanza, Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 50: 36.
- DE LA PEÑA, M. R. y M. RUMBOLL. 1998. Birds of southern South America and Antarctica. Harper Collins Publishers, Londres.
- FRAGA, R. M. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y aves amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.
- GIAI, A. 1950. Notas de viajes. *El Hornero*, 9 (2): 121-164.
- HARTERT, E y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentina. *Nov. Zool.* XVI.

- MANASSERO, M., H. LUNA y L. ACQUAVIVA. 2004. Nuevos registros de aves para Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 47: 31-33.
- MARTÍNEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. *Anales Museo Provincial de Ciencias Naturales «Florentino Ameghino»*, 1: 1-61.
- MAZAR BARNETT, J. y M. PEARMAN. 2001. Lista Comentada de las Aves Argentinas. Lynx Ed. Barcelona. 164 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Editores. B. Aires.
- ORLOG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 43: 19-21.
- PAUTASSO, A. A., M. R. DE LA PEÑA y J. M. MASTROPAOLO. 2003. Nuevos registros del águila coronada (*Harpyhaliaetus coronatus*) para la provincia de Santa Fe, Argentina. *Nuestras Aves*, 46: 29-32.

Recibida: enero 2005

Revista Nuestras Aves, 51:31-32

NUEVO REGISTRO DOCUMENTADO DEL LECHUZÓN NEGRUZCO (*Asio stygius*) EN LA PROVINCIA DEL CHACO, ARGENTINA

Alejandro Bodrati¹, Patricio Cowper Coles² y Natalia Meyer³

¹Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, Universidad Maimónides, Valentín Virasoro 732, Buenos Aires, Argentina. Correo Electrónico: alebodrati@yahoo.com.ar ²Av. Sarmiento 171, C (3500), Resistencia, Chaco. ³Ayacucho 940 (3503), Barranqueras, Chaco.

El lechuzón negruzco (*Asio stygius*) es poco conocido a lo largo de toda su distribución, desde el oeste de México hasta Paraguay, el sudeste de Brasil y el norte Argentino (Marks *et al.*, 1999), donde cuenta con registros para las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Santiago del Estero, Misiones y Corrientes (Olrog, 1979; Contreras, 1981; Contreras *et al.*, 1990; De la Peña, 1999) y Chaco, donde tiene recientes registros (Chebez *et al.*, 1999; Bodrati, 2004).

El 4 de agosto de 2004, encontramos y fotografiamos un ejemplar muerto en el Parque Nacional Chaco, departamentos Sargento Cabral y Presidencia de la Plaza, provincia de Chaco. El sitio del hallazgo (26°45'35"S 59°36'41"W) está dentro de un ambiente de transición, con abras de pastizal y parches de bosque bajo, que alternan alrededor de la selva de ribera del Río Negro. Tenía un golpe en uno de los flancos, por lo que se interpreta que pudo haber sido

golpeado utilizando una gomera (elemento de uso habitual entre los pobladores locales). Por el estado del ejemplar se presume que habría sido muerto recientemente.

Es de destacar que se había buscado al lechuzón negruzco en el Parque Nacional Chaco utilizando *playback* con grabaciones de sus voces, pero nunca se lo había encontrado. La búsqueda se realizó en ambientes similares al del hallazgo, en distintos meses entre 1998 y 2003. En una situación similar, en el Parque Provincial Pampa del Indio, provincia de Chaco, la especie fue detectada cuando vocalizó espontáneamente, aunque ensayos anteriores con *playback* no habían producido ninguna respuesta (Bodrati, 2004).

Este registro provee nueva evidencia de la presencia del lechuzón negruzco en la región chaqueña, y permite sumar el Parque Nacional Chaco a las dos áreas protegidas federales que cuentan con re-