



Ejemplar de Lechuzón negruzco hallado en el Parque Nacional Chaco.

gistros de la especie: el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa, y a la Reserva Natural Estricta San Antonio, Misiones (López Lanús, 1997; Chebez *et al.*, 1998).

Queremos agradecer a Oscar Braslavsky por la información suministrada.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BODRATI, A. 2004. Nuevos aportes a la distribución del lechuzón negruzco (*Asio stygius*) en el noreste argentino. *Nuestras Aves*, 47: 26-28.
- CONTRERAS, J. R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina I. No passeriformes. *Historia Natural*, 2 (3): 21-28.
- CONTRERAS, J. R., L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitogeográfico de la provincia de Chaco-República Argentina. I. No passeriformes. Cuaderno Técnico Félix de Azara N°1. Corrientes, 164 páginas.
- CHEBEZ, J. C., O. BRASLAVSKY, T. DERWIDUEÉ y A. SORIA. 1999. Novedades ornitogeográficas argentinas V. *Nuestras Aves*, 40: 5-6.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves del los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial LOLA N°12. Buenos Aires, 127 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. Monografía Especial LOLA N°18. Buenos Aires, 244 páginas.
- LÓPEZ LANÚS, B. 1997. Inventario de las aves del Parque Nacional «Río Pilcomayo», Formosa, Argentina. Monografía Especial LOLA N°4. Buenos Aires, 78 páginas.
- MARKS, J. S., R. J. CANNING, y H. MIKKOLA. 1999. Family Strigidae (typical owls). En J. del Hoyo, A. Elliott y J. Sargatal (editores) «Handbook of the birds of the world», 5: 76-242. Lynx Edicions. Barcelona, 759 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

Recibida febrero 2005

Revista Nuestras Aves, 51:32-34

NUEVOS REGISTROS Y COMENTARIOS SOBRE AVES ACUÁTICAS ESCASAS O FUERA DE SU RANGO DE DISTRIBUCIÓN CONOCIDO EN EL CENTRO DE ARGENTINA

Pablo Michelutti¹ y Ricardo Torres²

¹ Tucumán 296 (5.143) Miramar, Córdoba, Argentina.

² Cátedra de Diversidad Animal II, Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299 (5.000) Córdoba, Argentina. Correo electrónico: rtorres444@yahoo.com.ar

En base a observaciones realizadas en el sistema Laguna Mar Chiquita - Bañados del Río Dulce, y complementando el listado proporcionado por Torres y Michelutti (2001a), en el presente trabajo se dan a conocer nuevas citas para seis especies escasas en las provincias de Córdoba y Santiago del Estero, y se citan por primera vez cuatro especies y

una subespecie para la provincia de Córdoba y centro del país.

Macá chico (*Tachybaptus dominicus*)

Se observaron 10 individuos en bañados a lo largo de la Ruta Nacional N° 34 (tramo Palo Negro – La Argentina, provincia de Santiago del Estero: 29°



ARTICULOS

33° S, 62° 16' W), el 11 de mayo de 2003. En Santiago del Estero, anteriormente solo había sido observado un individuo en 1983 en los Bañados de Figueroa (Nores *et al.*, 1991).

Macá plateado (*Podiceps occipitalis*)

De la raza *juninensis*, se censaron 25 individuos en las cercanías de la localidad de Paso de la Cina, provincia de Santiago del Estero (29° 49' S 62° 48' W) el 10 de agosto de 1999, 13 individuos en la localidad de Miramar, provincia de Córdoba (30° 55' S, 62° 41' W) el 5 de julio de 2000, 20 ejemplares cerca de La Rinconada, provincia de Santiago del Estero (30° 11' S, 62° 57' W) el 9 de septiembre de 2001, y 25 individuos el 28 de agosto de 2003 nuevamente en Miramar. Esta subespecie pudo ser distinguida claramente de la nominal debido a su garganta y plumas auriculares completamente blancas. No se conocen citas de esta forma fuera de las lagunas de la puna altoandina (Blake, 1977; Olrog, 1979; De la Peña, 1999).

Aninga (*Anhinga anhinga*)

De esta especie, observada anteriormente una vez en los Bañados del Río Dulce (Torres y Michelutti, 2001a y b), se obtuvieron nuevos registros: 3 individuos adultos (dos hembras y un macho) en una colonia mixta de biguá (*Phalacrocorax brasilianus*) y varias especies de garzas en las cercanías del Puente sobre el río Utis, provincia de Santiago del Estero (29° 15' S, 63° 11' W), el 3 de febrero de 2002, y un individuo volando sobre el río Dulce a 10 km al sur de Paso de la Cina, en la misma provincia, el 4 de mayo de 2003. Es muy probable, por lo tanto, la presencia de la especie en la provincia de Córdoba, donde nunca fue citada (Nores, 1996), dado que el último registro mencionado se encuentra en una zona limítrofe, con un ambiente similar a ambos lados de la frontera.

Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*)

De esta especie, ya observada anteriormente en la zona de Mar Chiquita y Bañados del río Dulce (Torres y Michelutti, 2001a y b), se cuentan con nuevos registros: un individuo en Miramar el 12 de julio de 2000, y una bandada de unos 70 ejemplares a 10 km al norte del puente sobre el río Utis, el 4 de noviembre de 2001.

Guayata (*Chloephaga melanoptera*)

Se observó un individuo en la desembocadura del río Xanaes, Laguna Mar Chiquita (30° 57' S, 62° 44' W) el 30 de marzo de 2002. Se trata del primer regis-

tro de la especie para la provincia de Córdoba (Nores, 1996), y al parecer el único para la misma por debajo de los 2.000 m (Blake, 1977; Olrog, 1979; Carboneras 1992; De la Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003).

Pato castaño (*Netta erythrophthalma*)

Se registró 1 individuo macho el 28 de marzo de 1998 y otro el 11 de noviembre de 1999 en las cercanías de Miramar, 1 individuo macho el 11 de febrero de 1998 en la localidad de Jerónimo Cortéz, provincia de Córdoba y 3 ejemplares (dos hembras y un macho) en la Laguna de Pusseto, cerca de la localidad de Altos de Chipión (costa sur de Mar Chiquita: 30° 57' S, 62° 20' W) el 25 de julio de 2002. La especie no había sido observada anteriormente en la provincia de Córdoba. En la Argentina este pato fue observado casi exclusivamente en humedales andinos de Jujuy, Catamarca y San Juan (Chebez, 1994), aunque existe una cita a 900 msnm en el Parque Nacional El Rey en la provincia de Salta (Serra *et al.*, 1999). En el resto de su distribución sudamericana la especie es frecuente en las tierras bajas, incluso zonas costeras (Blake, 1977; Carboneras 1992).

Pato fierro (*Nomonyx dominicus*)

Se observaron 38 ejemplares en el terraplén sobre los Bañados del Río Dulce, provincia de Santiago del Estero (29° 54' S, 62° 18' W) el 15 de agosto de 1998. Anteriormente, en Santiago del Estero la especie fue registrada una sola vez en mayo de 1963 (una hembra con tres pichones) en el Bañado de Figueroa (Olrog, 1965). En la provincia de Córdoba fue citada para las lagunas Santo Domingo y Ludueña (Nores, 1996), en donde es ocasional (*obs. pers.*), y señalada como escasa para las desembocaduras de los ríos Suquía y Xanaes en la Laguna Mar Chiquita por Torres y Michelutti (2001a). Un individuo, además, fue observado en el lago del Dique San Roque en septiembre de 1996 por Volkmann y Cargnelutti (2001).

Tero serrano (*Vanellus resplendens*)

Se registró un ejemplar en la desembocadura del río Xanaes el 20 de octubre de 2001. La especie pudo reconocerse claramente por comparación con varios individuos de *Vanellus chilensis* presentes en el momento de la observación. Se pudo constatar la ausencia de copete nual y de diseños negros en cara y pecho, característicos de *V. chilensis*. Se trata del primer registro de esta especie en la provincia de Córdoba (Nores, 1996), y al parecer el único registro extracordillerano en el país (Olrog, 1979; De la



ARTICULOS

Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003); fuera de la Argentina ya fue observado a la altura del nivel del mar en la costa del Perú (Blake, 1977; Wiersma, 1996).

Playerito manchado (*Actitis macularia*)

La especie fue observada por primera vez en la provincia de Córdoba por J. Amat en diciembre de 1987, en Miramar, y posteriormente por uno de nosotros (P. Michelutti) en marzo de 1991, en el mismo lugar, registrándose en ambas ocasiones solamente 1 ejemplar (Nores, 1996; Torres y Michelutti, 2001a). Otro individuo fue observado también en Miramar, el 16 de febrero de 1998.

Gaviota gris (*Larus scoresbii*)

Se observó un individuo en las cercanías de la localidad de Miramar, el 17 de noviembre de 1998. La presente observación constituye la primera cita para la provincia de Córdoba (Nores, 1996), y al parecer la única fuera de las costas marinas que esta especie frecuente.

Salteador chico (*Stercorarius parasiticus*)

Fue observado un ejemplar el 20 de octubre de 2001 en la Laguna del Plata (costa sur de Mar Chiquita: 30° 58' S, 62° 49' W). La especie solo había sido observada una vez, en la desembocadura del río Xanaes (Nores e Yzurieta, 1980), y en base a esa cita considerada rara en la zona por Torres y Michelutti (2001a).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLAKE, E. R. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1. Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and Allies). The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 674 páginas.

CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Ed. Albatros, Buenos Aires, 604 páginas.

CARBONERAS, C. 1992. Family Anatidae. En J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (editores) «Handbook of the birds of the world», 1: 536-628. Lynx Edicions, Barcelona.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. L.O.L.A., Buenos Aires, 244 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires, 346 páginas.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. Bucher (editores) «Biodiversidad de la provincia de Córdoba», 1: 255-337. Universidad Nacional Río Cuarto, Córdoba.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de Córdoba y centro de Argentina. Sec. Est. Agr. Gan. Córdoba.

NORES, M.; YZURIETA, D. y SALVADOR, S. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín Academia Nacional Ciencias (Córdoba), 59: 158-196.

OLROG, C. C. 1965. Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. Hornero, 10: 269-272.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SERRA, D., C. URCELAY y A. SORIA. 1999. El Pato Castaño (*Netta erythrophthalma*) en el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Nuestras Aves, 40: 20.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001a. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita - Bañados del Río Dulce (provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina). Boletín Academia Nacional Ciencias (Córdoba), 66: 61-73.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001b. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. Nótulas Faunísticas (Segunda Serie), 1: 1-5.

VOLKMANN, L. y R. CARGNELUTTI. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves, 41: 23-26.

WIERSMA, P. 1996. Species account (Family Charadriidae). En J. Del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (editores) «Handbook of the birds of the world», 3: 411-420. Lynx Edicions, Barcelona.

Recibida: febrero 2005

Revista Nuestras Aves, 51:34-35

LA MONTERITA CANELA (*Poospiza ornata*) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Ignacio Roesler¹, Hernán Povedano², Adrián S. Di Giacomo³ y Oscar Spitznagel³

¹Grupo FALCO. Calle 64 N° 674, (1.900) La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ignacioriesler@ciudad.com.ar

² Calle 57 N° 426, (1900) La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: hpovedano@hotmail.com.ar

³ Aves Argentinas/AOP, 25 de Mayo 749 2° 6, (C 1.002 ABO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Durante una recorrida el 7 de noviembre de 2003 en la zona de Perdices (33° 18' 18" S; 58° 42' 49" O), departamento de Gualaguaychú, provincia de Entre Ríos, se observó un individuo de monterita ca-

nela (*Poospiza ornata*) mientras recorría arbustos aislados en un pastizal de unos 50 cm a 1 metro de altura. Del plumaje se pudo observar la ceja y una mancha subocular canela bien notable; la región ven-