



ARTICULOS

Peña, 1999; Narosky e Yzurieta, 2003); fuera de la Argentina ya fue observado a la altura del nivel del mar en la costa del Perú (Blake, 1977; Wiersma, 1996).

Playerito manchado (*Actitis macularia*)

La especie fue observada por primera vez en la provincia de Córdoba por J. Amat en diciembre de 1987, en Miramar, y posteriormente por uno de nosotros (P. Michelutti) en marzo de 1991, en el mismo lugar, registrándose en ambas ocasiones solamente 1 ejemplar (Nores, 1996; Torres y Michelutti, 2001a). Otro individuo fue observado también en Miramar, el 16 de febrero de 1998.

Gaviota gris (*Larus scoresbii*)

Se observó un individuo en las cercanías de la localidad de Miramar, el 17 de noviembre de 1998. La presente observación constituye la primera cita para la provincia de Córdoba (Nores, 1996), y al parecer la única fuera de las costas marinas que esta especie frecuente.

Salteador chico (*Stercorarius parasiticus*)

Fue observado un ejemplar el 20 de octubre de 2001 en la Laguna del Plata (costa sur de Mar Chiquita: 30° 58' S, 62° 49' W). La especie solo había sido observada una vez, en la desembocadura del río Xanaes (Nores e Yzurieta, 1980), y en base a esa cita considerada rara en la zona por Torres y Michelutti (2001a).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLAKE, E. R. 1977. Manual of neotropical birds. Vol. 1. Spheniscidae (Penguins) to Laridae (Gulls and Allies). The University of Chicago Press, Chicago y Londres, 674 páginas.

CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Ed. Albatros, Buenos Aires, 604 páginas.

CARBONERAS, C. 1992. Family Anatidae. En J. del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (editores) «Handbook of the birds of the world», 1: 536-628. Lynx Edicions, Barcelona.

DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. L.O.L.A., Buenos Aires, 244 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Edición de Oro. Vázquez Mazzini Eds., Buenos Aires, 346 páginas.

NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. Bucher (editores) «Biodiversidad de la provincia de Córdoba», 1: 255-337. Universidad Nacional Río Cuarto, Córdoba.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de la provincia de Córdoba y centro de Argentina. Sec. Est. Agr. Gan. Córdoba.

NORES, M.; YZURIETA, D. y SALVADOR, S. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Boletín Academia Nacional Ciencias (Córdoba), 59: 158-196.

OLROG, C. C. 1965. Diferencias en el ciclo sexual de algunas aves. Hornero, 10: 269-272.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

SERRA, D., C. URCELAY y A. SORIA. 1999. El Pato Castaño (*Netta erythrophthalma*) en el Parque Nacional El Rey, Salta, Argentina. Nuestras Aves, 40: 20.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001a. Las aves de ambientes acuáticos del sistema Laguna Mar Chiquita - Bañados del Río Dulce (provincias de Córdoba y Santiago del Estero, Argentina). Boletín Academia Nacional Ciencias (Córdoba), 66: 61-73.

TORRES, R. y P. MICHELUTTI. 2001b. Nuevos registros de aves escasas en la región central de Argentina. Nótulas Faunísticas (Segunda Serie), 1: 1-5.

VOLKMANN, L. y R. CARGNELUTTI. 2001. Nuevas localidades para aves de Córdoba, Argentina. Nuestras Aves, 41: 23-26.

WIERSMA, P. 1996. Species account (Family Charadriidae). En J. Del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (editores) «Handbook of the birds of the world», 3: 411-420. Lynx Edicions, Barcelona.

Recibida: febrero 2005

Revista Nuestras Aves, 51:34-35

LA MONTERITA CANELA (*Poospiza ornata*) EN LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Ignacio Roesler¹, Hernán Povedano², Adrián S. Di Giacomo³ y Oscar Spitznagel³

¹Grupo FALCO. Calle 64 N° 674, (1.900) La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: ignacioroesler@ciudad.com.ar

² Calle 57 N° 426, (1900) La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Correo electrónico: hpovedano@hotmail.com.ar

³ Aves Argentinas/AOP, 25 de Mayo 749 2° 6, (C 1.002 ABO) Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Durante una recorrida el 7 de noviembre de 2003 en la zona de Perdices (33° 18' 18" S; 58° 42' 49" O), departamento de Gualaguaychú, provincia de Entre Ríos, se observó un individuo de monterita ca-

nela (*Poospiza ornata*) mientras recorría arbustos aislados en un pastizal de unos 50 cm a 1 metro de altura. Del plumaje se pudo observar la ceja y una mancha subocular canela bien notable; la región ven-



> ARTICULOS

tral con el pecho de un color canela rojizo fuerte que se aclara hacia la garganta y hacia la zona media e inferior; la cabeza y gran parte del dorso eran de un color gris plumoso fuerte y bastante brillante, con la parte central de la espalda con un tono rojizo canela. También pudieron observarse claramente las líneas alares claras. Por las características mencionadas creemos que se trató de un macho adulto, ya que las hembras y subadultos tienen tonos más claros y son mucho menos «brillantes» (Ridgely y Tudor, 1989).

La especie no es mencionada en listados provinciales (De la Peña 1997; Gobierno de la provincia de Entre Ríos y APN, 1995) y solo fue mencionada para Entre Ríos en el listado de los departamentos Colon y Uruguay (Zelich, 1977). Aparentemente esta mención se basa en un ejemplar colectado por el autor el 8 de junio de 1968 en la localidad 1º de Mayo, provincia de Entre Ríos. Este ejemplar se encuentra depositado en la colección privada Juan Klimaitis, siendo la única piel de la especie con procedencia de Entre Ríos (H. Povedano, obs. pers.). Por lo tanto este representaría un nuevo registro de la especie en la provincia después de cerca de tres décadas sin información.

Teniendo en cuenta que es frecuente encontrar a ésta y otras especies del género como aves de jaula, que el individuo estaba solo y en un área altamente modificada, podríamos sugerir que se trataba de un individuo escapado de cautiverio. Sin embargo, el comportamiento era el que se observa en esta especie en las áreas de invernada, y aunque es frecuente ver a esta monerita durante la temporada invernal en bandadas mixtas, por ejemplo junto a *Poospiza torquata* o *Zonotrichia capensis* entre otras, no es raro encontrarla solitaria (I. Roesler, obs. pers.) o en grupos de dos o tres individuos (Ridgely y Tudor, 1989).

Dada su presencia como visitante invernal en la Republica Oriental del Uruguay (Azpiroz, 2003), en la provincia de Santa Fe (De la Peña, 1997) y el norte de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993), esperaríamos que también esté presente en Entre Ríos durante el invierno. Además, teniendo en cuenta que la monerita canela se reproduce durante diciembre y enero en el centro y oeste del país (Ridgely y Tudor, 1989), nuestro registro podría corresponder a un individuo desplazándose hacia áreas de cría.

Agradecemos a Pablo Grilli y Emilio A. Jordán por la lectura crítica del manuscrito. A Gerard Bertrand por la compañía en el campo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- AZPIROZ, A. B. 2003. Aves del Uruguay. Lista e introducción a su biología y conservación. Ed. Graphis. Montevideo, 104 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y Distribución de la Aves de Santa Fe y Entre Ríos. L.O.L.A. Buenos Aires, 126 páginas.
- GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS y ADMINISTRACIÓN DE PARQUES NACIONALES. 1995. Sistema de Áreas naturales protegidas de la Provincia de Entre Ríos, República Argentina. Paraná - Buenos Aires, 120 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires: Lista y Distribución. Asociación Ornitológica del Plata, Vásquez Mazzini Editores y LOLA. Buenos Aires, 128 páginas.
- RIDGELY, R. S. y G. TUDOR. 1989. The Birds of South America: The Oscine Passerines. Volumen I. University of Texas. Austin, 516 páginas.
- ZELICH, M. R. 1977. Fauna de la provincia de Entre Ríos. Aves Rev. «Ser», Escuela Nacional Normal Superior «Mariano Moreno», Concepción del Uruguay, Nº 19: 85-95.