



NUEVOS REGISTROS Y OBSERVACIONES DE AVES PARA LAS PROVINCIAS DE TUCUMÁN Y SANTIAGO DEL ESTERO

Patricia Capllonch, Diego Ortiz, Claudio Ruiz y Rebeca Lobo Allende

Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e
Instituto Miguel Lillo, Miguel Lillo 205, (4.000) Tucumán, Argentina. Correo electrónico: cenaarg@yahoo.com.ar

Dentro del marco de las campañas de anillado de aves que efectúa el Centro Nacional de Anillado de Aves del Instituto Miguel Lillo, se obtuvieron registros novedosos para las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. Los registros de Tucumán se compararon con las listas de aves de Lucero (1983) y Brandán y Antelo (2001). Para la provincia de Santiago del Estero se consultó Narosky e Yzurieta (2003) y Nores *et al.* (1991). También se revisó la colección ornitológica del Instituto Miguel Lillo.

Milano tijereta (*Elanoides forficatus*)

Observado regularmente durante los últimos cinco años en vuelo sobre las quebradas cubiertas de selva de montaña del río los Sosa, a lo largo de la ruta 307. En diciembre de 2002 encontrado un grupo de cinco individuos que volaba sobre El Indio (27°03'S 65°40'W). A finales de noviembre 2001 una pareja registrada en Playa Larga, en la ruta 307, a una altitud de 1.600 m sobre el nivel del mar. El 3 de enero de 2004 hallados tres individuos en Piedra Colorada a 800 m. También varios registros en el Parque Biológico Sierra de San Javier (26°47'S 65°23'W). Queda confirmada la presencia regular de esta especie en la provincia de Tucumán.

Curutié colorado (*Certiaxis cinnamomeus*)

Anillado un individuo el 19 de diciembre de 2003 en la Arrollo Mixta (27°12'S 65°10'W), departamento Leales. Fue recapturado el 6 de marzo de 2004. Un segundo ejemplar fue colectado y depositado en la colección ornitológica del Instituto Miguel Lillo. Se trata de los primeros registros para la provincia de Tucumán, ya que no ha sido citada ni por Lucero (1983) ni por Brandán y Antelo (2001).

Leñatero (*Anumbius anumbi*)

Anillado un individuo el 4 de noviembre de 2001 en la finca Abra Rica (27°10'S 64°45'W), entre la estación Araoz y Tacanas, departamento de Leales, este de la provincia de Tucumán. Es la primera cita

para la provincia de Tucumán, no es citada por Lucero (1983) y Brandán y Antelo (2001).

Choca corona rojiza (*Thamnophilus ruficapillus*)

Anillado un macho el 12 de noviembre de 2002 en un quebrachal de Pozo Hondo (27°10'S 64°30'W), departamento Jiménez, extremo oeste de la provincia de Santiago del Estero, cerca del límite con la provincia de Tucumán. El lugar tiene lomadas, se encuentra a 280 m de altura y esta a unos 50 Km de las Sierras de Burruyacu con yungas. Es el primer registro de la especie para Santiago del Estero (ver foto), no ha sido citada por Nores *et al.* (1991).



Macho de choca corona rojiza (*Thamnophilus ruficapillus*), de Pozo Hondo, Santiago del Estero.

Fíofo silbón (*Elaenia albiceps*)

El 2 de noviembre de 2000 anillados tres ejemplares en Copo, en una localidad próxima al límite sur del Parque Nacional Copo (26°00'S 62°15'W), provincia de Santiago del Estero. Era un grupo en migración primaveral de regreso a sus áreas de anidación en los bosques húmedos de altura desde el sur de Brasil donde inverna (Marini y Cavalcanti, 1990).

Monjita salinera (*Neoxolmis salinarum*)

Observada una pareja el 12 de enero de 2003 en



ARTICULOS

Pozo Hondo (27°10'S 64°30'W), provincia de Santiago del Estero, perchada en un algarrobo. Si bien esta especie ya es conocida para los ambientes salobres de la provincia (Narosky y Yzurieta, 2003), es un dato interesante por lo puntual de su distribución en Salinas Grandes en la unión de las provincias de Catamarca, Córdoba y Santiago del Estero, y en las Salinas de Ambargasta (Nores *et al.*, 1991). Esta localidad contiene bosques y salitrales, y se encuentra a unos 100 km del límite norte de su distribución conocida y próxima a las pequeñas salinas de la localidad de Ardiles.

Corbatita blanco (*Sporophila leucoptera*)

Esta especie llega ocasionalmente a Tucumán en migración (Lougheed, 1991) y ha sido observada en la Reserva Provincial La Florida, en los márgenes de la ruta 38.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- BRANDÁN, Z. y C. ANTELO (2001) Colección Ornitológica de la Fundación Miguel Lillo: catálogo de especies de Tucumán. Fundación Miguel Lillo, Misceláneas, 116.
- LOUGHEED, S. 1991. Nueva localidad para la Corbatita blanca *Sporophila leucoptera* (Vieillot). *Nuestras Aves*, 24: 25.
- LUCERO, M. M. 1983. Lista y distribución de aves y mamíferos de la provincia de Tucumán. Miscelánea N° 75, Fundación Miguel Lillo, Tucumán, 55 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Aves Argentinas*. Editorial Vázquez Mazzini, 346 páginas.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. A. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín Academia Nacional Ciencias Córdoba*, 59: 157-196.
- MARINI, M. A. y R. B. CAVALCANTI. 1990. Migraciones de *Elaenia albiceps chilensis* e *Elaenia chiriquensis albivertex* (Aves: Tyrannidae). *Boletín Museo Paranense Emilio Goeldi, Serie Zoología*, 6 (1).

Recibida: marzo 2004.

Revista Nuestras Aves, 50:21-24

SOBRE EL ANILLADO DE AVES EN LA ARGENTINA: RECUPERACIONES Y RECAPTURAS

Mauricio Rumboll¹, Patricia Capllonch², Rebeca Lobo² y Gabriel Punta³

¹ Administración de Parques Nacionales.

² Centro Nacional de Anillado de Aves, Facultad de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, UNT. Miguel Lillo 205 (4000) Tucumán, Argentina. cenaarg@yahoo.com.ar.

³ Dirección de Fauna de la Provincia de Chubut, 9 de Julio 280 (9103), Rawson, Chubut, Argentina. gpunta@infovia.com.ar.

Se presentan resultados de campañas de anillado de avutardas realizadas en la provincia de Santa Cruz hace más de dos décadas y de las cuales se obtuvieron numerosas recuperaciones y avistajes. También de campañas de marcado de cormoranes en la costa atlántica de la provincia de Chubut y del anillado de aves en el noroeste argentino.

Recuperaciones

Cormorán antártico (*Phalacrocorax bransfieldensis*)

Fue anillado por investigadores de la Universidad de Mar del Plata, el 19 de diciembre de 1989 como pichón en Punta Armonía, Isla Nelson, Shetland del Sur, Antártida y hallado muerto en la costa de San Salvador de Bahía en abril de 1997 por Pedro Lima. Otro ejemplar, marcado en la misma campaña, fue recuperado en septiembre de 1994 en Barra Do Itariri, Municipio Do Conde, litoral norte de Bahía (ver mapa).

