



## ARTICULOS

Revista Nuestras Aves, 50:24-28

## PRESENCIA Y OCUPACIÓN DE HABITAT DEL ÁGUILA SOLITARIA (*Harpyhaliaetus solitarius*) EN LA PROVINCIA DE CATAMARCA, REPUBLICA ARGENTINA

Enrique Alejandro Fra<sup>1,2</sup>, Roberto Saúl Salinas<sup>1,2</sup>, Carlos Barrionuevo<sup>2</sup>, Julio Fikdamir<sup>2</sup>  
y Pablo Román Rodríguez

<sup>1</sup> Subsecretaría del Ambiente de Catamarca, Centro Administrativo del Poder Ejecutivo, Avenida Venezuela s/n (4.700) San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, Argentina. Correo electrónico: enriquefra2001@yahoo.com.ar

<sup>2</sup> Asociación para el Estudio y Conservación de la Naturaleza «Llastay», Barrio Los Ceibos, Casa N° 21 (4.700) San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca, Argentina

Se realizaron observaciones para constatar la presencia del águila solitaria en diferentes cordones montañosos del nordeste de la provincia de Catamarca, utilizando las guías de campo de Narosky e Yzurieta (1987) y De la Peña (1992). Para asignar hábitats seguimos a Cabrera (1976) con ajustes propios de los autores.

El área donde se obtuvieron cinco registros, han sido el sector sur de las sierras de Narváez, sector norte de las Cumbres de Balcozna, sierra de las Higuierillas, Cumbre de los Pinos, y sector norte de la sierra de Los Potrerillos; todas ellas ubicadas mayoritariamente en el departamento Paclín, y en menor medida en el departamento Ambato.

Estos cordones conforman el sector medio de la cuenca del río Singuil, y sector alto de la cuenca del río Balcozna, entre los 27° 45' S y 27° 52' S, y los 65° 46' O y 65° 55' O. Se hallan cubiertos por vegetación de Yungas, con selva montana, bosque montano y

pastizales de altura, entre los 900 y los 2000 m sobre el nivel del mar.

Existe otra área donde se realizó un avistamiento ocasional de la especie en la zona de la sierra de La Viña, (28° 02' S; 65° 35' O) cuenca del río del mismo nombre, en el departamento Paclín, también con vegetación de Yungas, pero de selva de transición, a 640 m sobre el nivel del mar. Este lugar está situado a unos 50 km en línea recta, hacia el sudeste de la zona donde se hicieron las otras observaciones.

Además se cuenta con el primer registro de la especie en la provincia, un ejemplar en cautiverio, secuestrado por el Servicio Fauna Silvestre de la Provincia de Catamarca, el cual posteriormente fue enviado al Centro de Recuperación de las aves amenazadas de la selva paranaense «Guira-oga» (Puerto Iguazú, Misiones).

Las seis citas del águila solitaria en la provincia de Catamarca (todos ejemplares adultos), ubicadas en dos sistemas serranos, se sintetizan en el Cuadro 1.

Del ejemplar que proviene del secuestro del Servicio Fauna Silvestre, se obtuvieron los siguientes registros:

**Fecha:** el ejemplar fue decomisado el 5 de junio de 1998, probablemente estuvo en cautiverio más de cuatro años antes del secuestro.

**Lugar probable de captura:** Las Juntas o Las Cuchillas (departamento Ambato).

**Descripción del ejemplar:** juvenil (el secuestro fue de un adulto, pero el tenedor relató que lo obtuvo de juvenil, ya que antes presentaba plumaje color marrón)

**Descripción del hábitat:** en la zona, en poca distancia se encuentran diversos ambientes: bosque montano de pino del cerro (*Podocarpus parlatorei*), chaco serrano y pastizales de altura.



Ejemplar de águila solitaria decomisado

Estos nuevos registros amplían considerablemente (en mas de 400 km) el área de



## &gt; ARTICULOS

distribución de la especie hacia el sur, ya que los datos anteriores más cercanos corresponden a las provincias de Salta y Jujuy (Hoy, 1969; Olrog, 1979 Y 1985; Schaab, 1990; De Lucca, 1991; Chebez, 1994). Reafirman su distribución en las Yungas, pero con intromisión en áreas de pastizales de altura que están sobre las selvas y bosques montanos, probablemente en sus vuelos diarios en búsqueda de alimento.

En el área de relevamiento de la Cuesta de Singuil y Las Higuierillas, los pastizales y las selvas están ubicados en las mismas laderas, en diferentes pisos altitudinales, por lo cual el acceso a uno y otro ambiente no representa dificultad a la especie para su desplazamiento continuo, lo que le permite explorar ambos tipos de ambientes.

El área de avistamiento de un ejemplar en La Viña, es una zona con fisonomía de selva de transición, pero donde los diferentes pisos de las Yungas no están tan bien representados, por ser sierras más bajas, aunque no lejos de allí (2 a 3 km), en las sierras de Guayamba, ya hay sectores de mayor altitud, donde existen selva de transición y selva montana, e incluso pastizales de altura.

A pesar de la cercanía con otros tipos de ambientes, tales como los bosques chaqueños (La Viña está a poca distancia de este tipo de hábitat), nunca se observaron ejemplares allí, y siempre las observaciones fueron ligadas a las Yungas. Por otra parte, la mayoría de los otros reportes en la República Argentina también son de Yungas, por lo

Cuadro 1

Fecha y Hora	Lugar	Posición geográfica	Altitud	Actividad	Tipo de hábitat
25 de junio de 2002 (a la mañana)	Sobre el río Singuil, en el límite entre Catamarca (departamento Paclín) y Tucumán	27° 46' 05,3" S; 65° 47' 59,6" O	915 m	Volando en círculos sobre el río y sobre los pedemontes de las sierras de Narváez y de Las Higuierillas	Selva montana
25 de junio de 2002 (a la tarde)	Sobre el pedemonte occidental de la Cumbres de los Pinos, próximo al Caserío de Las Higuierillas (departamento Paclín)	Sin datos	Sin datos	Halconeando sobre áreas desmontadas o de cultivo	Ecotono de selva montana con pastizal de altura
5 de octubre de 2002 (a la mañana)	Sobre la Cuesta de Singuil, en el extremo norte de las Cumbres de Balcozna (límite entre los departamentos Ambato y Paclín)	27° 49' 29,1" S; 65° 48' 03,3" O	1470 m	Volando en círculos, muy próximo a las laderas	Pastizales de altura
5 de octubre de 2002 (a la siesta)	Sobre Cuesta de Singuil y Valle del río Singuil. (límite entre los departamentos Ambato y Paclín)	27° 49' 29,1" S; 65° 48' 03,3" O	1500 m	Volando en círculo, aprovechando una corriente térmica ascendente, en el precipicio de la Cuesta de Singuil, sobre el valle del río, y próximo a la ladera extremo norte de la Cumbre de Balcozna	Sobre selva montana, pero a la altura de pastizales de altura
10 de noviembre de 2002 (a la tarde)	Sobre la Cuesta de Singuil, y bajo de ella, en el extremo norte de la Cumbre de Balcozna, y sobre la sierra de las Higuierillas (departamento Paclín)	Posición cercana a la del anterior avistamiento, pero con un desplazamiento de al menos dos km	1600, hasta 1400 m aproximadamente	Vuelo bajando de la zona alta de pastizales de altura, hacia la zona de selva montana. El ejemplar al llegar a la zona de ecotono entre pastizales y selva bajó para posarse en un árbol, y luego emprendió otro vuelo, para dirigirse aún más abajo, hasta la zona de selva montana pura	Pastizales de altura, selva montana y ecotono entre ambos ambientes
29 de mayo de 2003 (a las 15)	Sobre la localidad de La Viña, vieja Cuesta de La Viña y del río La Viña (departamento Paclín)	28° 02' S; 65° 35' O	640 m	Volando en círculo sobre el pedemonte occidental de la sierra de La Viña, y posteriormente tomando mayor altura en una térmica ascendente, para luego irse en vuelo hacia el sur, por el valle del río La Viña	Selva de transición



## ARTICULOS

que los registros de Contreras *et al.* (1990), para las provincias de Chaco y Formosa, se pueden considerar muy alejados de su área de distribución normal, y podrían ser una presencia ocasional en estos ambientes, que requieren confirmación (Chebez *et al.*, 1998).

Los ambientes donde fueron observados los ejemplares de águila solitaria en la provincia de Catamarca presentan un buen estado de conservación, lo que sería quizás una importante condición para la subsistencia de estas aves. También podría tratarse la especie como un indicador de calidad ambiental en las Yungas, especialmente de los sectores de selva montana, como los de la cuenca media del río Singuil, donde se observa uno de los sitios de este ambiente con mejor estado de conservación en la provincia.

Por esta condición ambiental, ambos sectores de avistamientos han sido reiteradas veces propuestos como áreas naturales protegidas, tanto por organismos oficiales, como por organismos no gubernamentales. Particularmente en una de ellas, como es la zona de La Viña, ya hay iniciadas gestiones para su concreción como tal. Al confirmarse la presencia de esta especie amenazada en las dos zonas relevadas, este hecho puede aportar justificaciones para agilizar la efectiva creación de ambas áreas naturales protegidas. La zona de Cuesta de las Higuierillas ha sido reconocida como «área de importancia para la conservación de las aves» a nivel mundial (Moschione, 2005).

No obstante su preferencia por ambientes bien conservados, los ejemplares observados pasan volando por sitios con poblaciones humanas, como el caserío de Las Higuierillas, donde se lo vio halconeando sobre un área de cultivo, y como la localidad de La Viña, que ya es un pueblo mayor, por donde incluso pasa la ruta nacional N° 38, de gran tránsito, lo que implica que esta especie, si bien nunca se la vio posada en estos ambientes antropizados, pasan volando sobre ellos, representando un riesgo para los ejemplares, al poder ser cazados por los pobladores rurales, que pueden suponer que predan sobre sus animales domésticos.

Respecto al área de la posible captura del ejemplar decomisado, al provenir la información de la persona que la tenía en su domicilio, que no fue la misma persona que la capturó, no se puede asegurar que el dato sea preciso. De ser cierto el comentario de esta persona, respecto a que fue capturada en el sitio de Las Cuchillas, o Las Juntas, en el departamento Ambato, este queda bastante



Cuesta de Singuil, provincia de Catamarca

más al oeste que las otras dos zonas, a unos 50-60 km al oeste de La Viña, (entre los 28° 03' S y 28° 08' S y los 65° 54' O y 65° 57' O), en las sierras de Ambato, de Las Cuchillas o de Las Juntas, con ambientes preferentemente de pastizales de altura, con parches de bosques de tipo chaco serrano en las partes más bajas de la sierra de Las Juntas, y de bosque montano de pino del cerro, en las partes más bajas de la sierra de Ambato.

Agradecemos al Juez de Instrucción N° 1 de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Marcelo Soria, que permitió realizar el allanamiento al domicilio en el que se secuestró el ejemplar de águila solitaria en el año 1998. A partir de allí, tomamos conciencia de que la especie existía, o al menos existió en la provincia de Catamarca, y nos impulsó a la búsqueda de ejemplares en el medio silvestre, que afortunadamente encontramos.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería. Segunda Edición. Tomo II – Fascículo I. Editorial ACME S.A.C.I. Buenos Aires.
- CONTRERAS, J. L. M. BERRY, A. O. CONTRERAS, C. C. BERTONATTI y E. E. UTGES. 1990. Atlas ornitológico de la Provincia del Chaco. I. No Passeriformes. Cuadernos Técnicos Félix de Azara I. Corrientes, 164 páginas.
- CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los Parques Nacionales de la Argentina. Administración de Parques Nacionales y Asociación Ornitológica del Plata. Monografía Especial LOLA, 12. Buenos Aires, 127 páginas.





## &gt; ARTICULOS

DE LA PEÑA, M. 1992. Guía de aves argentinas. Tomo II: Falconiformes, Galliformes, Gruiformes, Charadriiformes. Editorial L.O.L.A. – Segunda Edición. Buenos Aires.

DE LUCCA, E. R. 1991. El águila poma y el águila solitaria. Estado de conocimiento actual. *Nuestras Aves*, 25: 14-15.

FRAGA, R. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.) «Libro Rojo de Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina»: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.

HOY, G. 1969. *Harpyhaliaetus solitarius* (Tschudi) un águila nueva para Argentina. *Neotrópica*, 15 (48): 147-148.

MEYBURG, B. V. 1986. Threatened and NearThreatened. Diurnal Bird of Prey of the World. *Birds of Prey Bull* N° 3 WWGBP.

MOSCHIONE, F. 2005. Cuesta de las Higuierillas. En A. S. Di Giacomo (editor), «Áreas importantes para la conservación de las aves en la Argentina / Sitios prioritarios para la conservación

de la biodiversidad»: 76-77. Temas de Naturaleza & Conservación de Aves Argentinas, 5. Buenos Aires, 514 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.

OLROG, C. 1985. Status of Wet Forest Raptors in Northern Argentina. En: Conservation Studies on Raptors. ICBP Technical Publication N° 5.

SCHAAB, E. 1990. Águila solitaria en Jujuy. *Nuestras Aves*, 23: 32.

Recibida: agosto 2004

Revista Nuestras Aves, 50:28-30

## NUEVA INFORMACIÓN SOBRE EL IPEQUÍ (*Heliornis fulica*) EN LA PROVINCIA DE CHACO, ARGENTINA

Oscar Braslavsky<sup>1</sup>, Alejandro Bodrati<sup>2</sup>, Kristina Cockle<sup>2</sup> y Mirko Avedano Schaller<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Manzana «F», Tira 15, casa 303, Barrio San Cayetano, Resistencia, provincia de Chaco, Argentina.

Correo electrónico: guaycuru@arnet.com

<sup>2</sup>Departamento de Ciencias Naturales y Antropología, Proyecto Selva de Pino Paraná, Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Universidad Maimónides, Valentín Virasoro 732 (C1405BDB), Buenos Aires, Argentina.

Correo electrónico: alebodrati@hotmail.com

<sup>3</sup>Avenida MacLean, Resistencia, provincia de Chaco, Argentina. Correo electrónico: ipequi@hotmail.com

El ipequí (*Heliornis fulica*), se distribuye desde México hasta la Argentina (Bertram, 1996). Su presencia en la provincia de Chaco es poco clara. Contreras *et al.* (1990) dan un registro, sin detalles, para el mes de julio, indicando en su mapa la cuadrícula que coincidiría con el Parque Nacional Chaco. Chebez *et al.* (1998) señalan con dudas a la especie para el mismo parque, seguramente basándose en un listado efectuado por la XIV promoción de guardaparques nacionales, dirigida por M. Rumboll y F. Biolé, donde la especie es mencionada sin detalles para octubre de 1982. Nosotros presentamos registros recientes del Parque Nacional Chaco y el campo «Las Marinas», dos localidades de la provincia de Chaco, que cuentan con importantes cursos de agua. Estas observaciones aportan nuevas localidades para el ipequí, actualizan y confirman su presencia en la provincia de Chaco, y dejan en claro que la especie es residente y se reproduce en el extremo sur de su distribución.

### Arroyo Guaycurú

En el campo «Las Marinas» (departamento 1° de Mayo; 27° 01'S 58° 59'W), en un tramo del arroyo Guaycurú que abarca desde el puente de la ruta provincial 90 hasta 8 km al oeste como máximo, O. Braslavsky y M. Avedano registraron al ipequí en 21 oportunidades durante relevamientos en canoa y a pie, a lo largo de cuatro años, entre agosto de 1998 y septiembre de 2001 (Tabla 1). El total de los registros involucra a 22 adultos, un juvenil, y un pichón dependiente. Aunque varios de estos registros probablemente correspondan a los mismos individuos, demuestran su presencia y evidencian que se reproduce en la zona.

Tanto el ipequí como el lobito de río desaparecieron de este tramo del arroyo entre diciembre del 2000 y junio del 2001, luego de una limpieza o «saneamiento» del curso de agua. A fines del 2000, se sacó la vegetación y los troncos que naturalmente se hallaban dentro del arroyo, para facilitar el