



ARTICULOS

cho colectado en la localidad de Taí Viejo el 29 de enero de 1994 (MACN 33.926) y una hembra de Tucumán sin otras especificaciones (IML 00954).

BIBLIOGRAFIA CITADA

KÖNIG, V. C. y R. STRANECK. 1989. Una nueva lechuza (*Aves: Strigidae*) del norte argentino. *Stuttgarter Beitr. Naturk. A*, 428: 1-20.

KRABBE, N., A. L. SUREDA, A. LACCI Y J. MAZAR BARNETT. 2001. Sonidos de las aves de Calilegua. L.O.L.A. Buenos Aires, 35 páginas y 1 cassette.

MARKS, J. S., R. J. CANNINGS y M. MIKKOLA. 1999. Family Strigidae (typical owls). En J. Del Hoyo, A. Elliot y J. Sargatal (eds.), «Handbook of the birds of the world», 5: 76-242. Lynx Edicions. Barcelona, 759 páginas.

Recibida: enero 2004

Revista Nuestras Aves, 49:27

CAPUCHINO PECHO BLANCO (*Sporophila palustris*) EN SANTA FE, ARGENTINA

Horacio Luna¹, Martín Manassero² y Luciano Acquaviva³

¹Las Heras 1.780 (2120) Pérez, Santa Fe horacioluna@hotmail.com

²Suchón 531 (3013) San Carlos Centro, Santa Fe martinmmsc@hotmail.com

³San Sebastián 2.052 (2120). Pérez. Santa Fe lucianoacquaviva@hotmail.com

El 9 de enero de 2004, observamos un macho de capuchino pecho blanco (*Sporophila palustris*), en pastizales inundados, de la estancia Ferrero, situados a 2 km al noreste del obraje San Juan, 16 km al oeste de Villa Guillermina (59° 28' O, 28° 15' S), departamento General Obligado, Santa Fe. El pastizal se encontraba inundado con unos 20 cm de agua y junto a la especie anterior, registramos varios ejemplares de capuchino canela (*Sporophila hypoxantha*). En esta zona, existen bosques y pastizales en buen estado de conservación.

El capuchino pecho blanco está considerado vulnerable en la Argentina (Fraga, 1997) y amenazado a nivel mundial (Stattersfield y Capper, 2000). No contaba con registros para Santa Fe (De la Peña, 1997).

Agradecemos a Martín R. de la Peña, que realizó la revisión de texto y nos facilitó bibliografía, a Francisco del campo de Ferrero, a Miguel Arizaga y a Mariano Cracogna.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

STATTERSFIELD, D. J. y D. R. CAPPER (eds.). 2000. Threatened birds of the world. Lynx Edicions y BirdLife International. Barcelona y Cambridge, 852 páginas.

FRAGA, R. M. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y aves amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.

DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. L.O.L.A. Buenos Aires, 126 páginas.

Recibida: febrero 2004

Revista Nuestras Aves, 49:27-28

PRIMER REGISTRO DEL AGUILUCHO NEGRO (*Buteo albonotatus*) EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO DEL ESTERO, ARGENTINA

Walter E. Cejas

Museo de Zoología de la Universidad Nacional de Córdoba. Av. Vélez Sarsfield 299. 2 ° Piso (5.000) Córdoba.

Correo electrónico: wecejas@yahoo.com.ar

El aguilucho negro o aguilucho jote (*Buteo albonotatus*) cuenta en la Argentina con escasos y recientes registros (ver Bodrati *et al.*, 2004; Di Giacomo, 2005).

El 23 de enero de 2003, en la Estancia El Estribo (26°45' S 62°05' O), 40 kilómetros al sudoeste de Sachayoj, provincia de Santiago del Estero, se observaron tres individuos adultos de la especie, en