



> ARTICULOS

1989). El único registro para la provincia de Neuquén es en el tramo inferior del río Neuquén, en Plottier (Acerbo, 2000).

Además, según Veiga *et al.* (en prensa), la especie se encuentra en plena expansión en la provincia de Neuquén, donde cuenta con registros recientes para Añelo, San Patricio del Chañar y Tratayen (departamento Añelo) y dique Loma de la Lata y Vista Alegre Norte (departamento Confluencia).

BIBLIOGRAFÍA

- ACERBO, P. 2000. Aves del río Neuquén. Avifauna de la subcuenca del río Neuquén. A.I.C. 178 páginas.
 DE LA PEÑA, M. R. 1989. Guía de aves argentinas. Tomo VI. LOLA. Buenos Aires, 125 páginas.
 NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de aves de Argentina y Uruguay Edición de oro. Vázquez Mazzini editores. Buenos Aires, 346 páginas.
 VEIGA, J, M. BABARSKAS, F. FILIBERTO y C. SAVIGNY. En prensa. Aves de la provincia de Neuquén, lista comentada y distribución. Editorial R y C.

Recibida: julio 2004

Revista Nuestras Aves, 49:33-34

COMENTARIOS SOBRE AVES DE SANTO TOME, CORRIENTES, ARGENTINA

P. Capllonch, R. Lobo Allende, L. Guardia Claps, y P. Albornoz

Centro Nacional de Anillado de Aves (CENAA), Heller 187, (4.000) Yerba Buena, Tucumán, Argentina. Correo electrónico: cenaar@yahoo.com.ar

Entre el 14 y 18 de septiembre de 2003 se realizó un muestreo de aves dentro del marco de estudios de biodiversidad del litoral argentino. El estudio se realizó en la estancia La Blanca, en Santo Tomé a orillas del río Uruguay (28°29'S 55°57'W), provincia de Corrientes. La zona corresponde a la selva Paranaense (Cabrera, 1976). Las aves fueron capturadas con redes de neblina de 12 metros de largo que operaron día y noche durante cinco días. También se realizaron censos de recorrido por senderos, a primera hora de la mañana y al atardecer. Se capturaron 37 especies de aves que junto a las observaciones sumaron 122.

Milano chico (*Gampsonix swainsonii*)

Observada una pareja a diario en los árboles que rodean al casco de la estancia. Esta especie rara fue citada para el parque nacional Mburucuyá, (Chebez *et al.*, 1998). También tenemos avistajes recientes en los parques nacionales El Rey (provincia de Salta) y Copo (provincia de Santiago del Estero) donde fue capturada. En Corrientes ya había sido citada por Contreras (1981, 1986a y b).

Gallito overo (*Psilorhamphus guttatus*)

Observada una pareja por Capllonch al anochecer en el suelo de un tacuaral denso al lado de un hilo de agua, con un comportamiento en el que levantan la cola. En la Argentina, la especie solo es conocida para la provincia de Misiones (De la Peña, 1997); esta es la primer cita para Corrientes. Hemos

escuchado las vocalizaciones descriptas por Canevari *et al.* (1991) y tenemos certeza, a pesar de los pobres datos con que contamos, que se trata de esta especie.

Batará goteado (*Hypodaleus guttatus*)

Era común en la selva en galería sobre el río Uruguay. Las parejas recorrían la vegetación alimentándose en los estratos medio y alto y vocalizaban juntas cada amanecer. Son confiados y conspicuos, un individuo emitió su potente canto durante diez minutos sobre nuestro campamento a cuatro metros de altura. El dimorfismo sexual es marcado: los machos con vientre blanco y un semicollar negro bien notable, dorsal con goteado blanco y negro; hembra con ventral amarillo acanelado y collar poco notable, dorsal goteado de canela claro y negro. En ambos sexos la cabeza presenta una cresta con plumas retráctiles que levantan cuando están alarmados. Timoneras de contorno acanelado visibles cuando abren y cierran la cola. Existen pocos datos para la provincia de Corrientes (Giraudó, 1996).

Monjita dominicana (*Heteroxolmis dominicana*)

Observada en una zona de pantanos con pajonales. Especie rara considerada amenazada a nivel global (Narosky e Yzurieta, 2003). Su distribución actual en la Argentina ha sido tratada exhaustivamente por Fraga (2003), quien la da para las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires. En censos de verano del 2002 y 2003 fue re-



ARTICULOS

gistrada en el sur de Entre Ríos por Canavelli *et al.* (2004). Con este registro se aporta un sitio más para su distribución actual.

Cachirla dorada (*Anthus nattereri*)

Es común en los pajonales. Esta especie es endémica de los pastizales húmedos del noreste (Narosky e Yzurieta 2003), es considerada en peligro de extinción en la Argentina (Fraga, 1997) y cuenta con varios registros para Corrientes (ver Chebez, 1994; y Chebez *et al.*, 1998).

Pioró (*Pyrhocomma ruficeps*)

Fueron observados muchos ejemplares machos y hembras en pequeños grupos muy movidosos. Son comunes en las márgenes del río Uruguay y hay registros de Corrientes (Contreras, 1988; Darrieu y Camperi, 1988). Es probable que realicen desplazamientos migratorios a nivel local.

Reinamora enana (*Amaurospiza moesta*)

Una hembra (figura 1) capturada en el sotobosque de la selva de galería. Es el segundo registro de la especie en Corrientes; previamente una pareja fue colectada por W. H. Partridge en la Estancia Rincón de las Mercedes en abril 1962 (Darrieu y Camperi, 1996) y había sido citada para la provincia por Contreras (1988).



Figura 1.
Hembra de Reinamora
enana (*Amaurospiza
moesta*)

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CABRERA, A. L. 1976. Regiones fitogeográficas Argentinas. Enciclopedia Argentina de Agricultura y Jardinería, 2:1-85.
- CANAVELLI, S., M. E. ZACCAGNINI, J. TORRESIN, N. CALAMRI, M. P. DUCOMMUN y P. CAPLLONCH. 2004. Monitoreo extensivo de aves en el centro-sur de Entre Ríos. En: Biodiversidad del litoral fluvial argentino. INSUGEO Miscelánea, 12: 350-361, Tucumán.
- CHEBEZ, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas que se extinguen. Editorial Albatros. Buenos Aires, 604 páginas.
- CHEBEZ, J. C., N. R. REY, M. BABARSKAS y A. G. DI GIACOMO. 1998. Las aves de los parques nacionales de la Argentina. Monografía LOLA, 12. Buenos Aires, 126 páginas.
- CONTRERAS, J. R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Historia Natural, 2 (3): 21-28.
- CONTRERAS, J. R. 1986a. 1986. Acerca del milanito blanco, *Gampsonyx swainsoni swainsoni* VIGORS, 1835, en la Argentina (Aves: Accipitridae). Historia Natural, 6 (9): 83-84.
- CONTRERAS, J. R. 1986b. Notas sobre el peso de aves argentinas V. Historia Natural, 6 (11): 100.
- CONTRERAS, J. R., 1988. Datos reproductivos de 45 especies de Passeriformes que anidan en el valle aluvial del Riachuelo, Noroeste de Corrientes, Argentina. En J. R. Contreras (ed.): Ornitología Argentina-Paraguay, 27-29. Corrientes.
- DE LA PEÑA, M. R. 1999. Aves argentinas, lista y distribución. LOLA, Monografía 18. Buenos Aires, 244 páginas.
- DARRIEU, C. A. y A. R. CAMPERI. 1988. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. V. Passeriformes poco citados (Parulidae, Thraupidae). Neotrópica, 34 (92): 133-137.
- DARRIEU, C. A. y A. R. CAMPERI. 1996. Estudio de una colección de aves de Corrientes (Emberizidae y Fringillidae). Neotrópica, 42 (107-108): 69-75.
- FRAGA, R. 1997. Aves. En J. J. García Fernández (coord. gral.), Mamíferos y Aves Amenazados de la Argentina: 155-219. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.
- FRAGA, R. M. 2003. Distribution, Natural History and Conservation of the Black-and-White Monjita (*Heteroxolmis dominicana*) in Argentina, a species vulnerable to extinction. Ornitología Neotropical, 14: 145-156.
- GIRAUDO, A. R. 1996. Adiciones de la avifauna de la Provincia de Corrientes, Argentina y zonas limítrofes de Paraguay. Facena, 12:25-30.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 2003. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 346 páginas.

Recibida: diciembre 2003