



NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA LAS PROVINCIAS DE SANTA FE Y ENTRE RÍOS, ARGENTINA

Martín R. de la Peña¹, Martín Manassero², José L. López³ y Horacio Luna⁴

¹Tres de Febrero 1.870 (3.080), Esperanza, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: martin@fca.unl.edu.ar ²Suchon 531 (3.013), San Carlos Centro, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: martinmmse@hotmail.com ³Uspallata 195 (2.000) Rosario, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: joseluiggi@hotmail.com ⁴Las Heras 1.780 (2.121) Pérez, Santa Fe, Argentina. Correo electrónico: horacioluna@hotmail.com

La intensificación de las observaciones de campo en estos últimos años, ha permitido recopilar nuevos registros para Santa Fe y Entre Ríos, que complementan o actualizan la información disponible sobre distribución en estas provincias, que cuentan con un listado reciente (De la Peña, 1997). Luego de cada registro, se indican entre paréntesis las iniciales del observador correspondiente.

Macá gris (*Tachybaptus dominicus*). El 18 de diciembre de 2001, en El Remanso, ruta 4 y río Salado, departamento La Capital, Santa Fe, un ejemplar estaba en las cavas que existen en las orillas del río Salado (MDLP). Estaba mencionado para la provincia (Giai, 1950), pero se carecía de citas concretas.

Macá plateado (*Podiceps occipitalis*). El 25 de enero, el 28 de junio y el 9 de julio de 2002, se vieron uno, dos y un ejemplar respectivamente, en una laguna a 4 km al noreste de San Carlos Centro, departamento Las Colonias, Santa Fe (MM). Es común en el sur provincial, pero el nuevo registro está 240 km hacia el norte de la laguna de Melincué, departamento General López, la localidad más noroeste para la provincia, donde se lo observó el 9 de marzo de 1988 (MDLP); además, es citado para el departamento 9 de Julio (Giai, 1950).

Mirasol grande (*Botaurus pinnatus*). El 27 de noviembre de 1999, en los juncuales del arroyo Malaquía, 12 km al este de San Carlos Centro, un ejemplar (MM) y el 10 de octubre de 2000 en las afueras de la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, apareció uno con las patas fracturadas (MDLP). Es raro, y la cita más cercana corresponde a San Javier, departamento homónimo, con un individuo observado el 26 de octubre de 1980 (MDLP).

Bandurria mora (*Theristicus caerulescens*). Un ejem-

plar fue observado por Norberto Mollo (com. pers.), el 9 de noviembre de 1999, en Rufino, departamento General López, Santa Fe. Esta cita está a unos 400 km al sur de la observación de un ejemplar en Cayastá, departamento Garay, el 13 de junio de 1989 (MDLP) y unos 350 km al sur del ejemplar observado en San Francisco, departamento San Justo, Córdoba (Di Giacomo *et al.*, 2001).

Parina grande (*Phoenicopterus andinus*). Un grupo de 12 ejemplares fue observado por Leandro Benz (com. pers.), en la laguna Setúbal, 10 km al norte de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, el 20 de febrero de 2000. Fue citada para la provincia (De la Peña, 1988) y para la laguna Melincué (Romano *et al.*, 2002).

Sirirí vientre negro (*Dendrocygna autumnalis*). Entre el 16 y el 18 de diciembre de 2001, en El Remanso, ruta 4 y río Salado, dos ejemplares se desplazaban entre los bañados del río Salado, en el departamento Las Colonias, Santa Fe (MDLP). Tenía un registro de cinco ejemplares en la estancia Las Aves, departamento Vera, 200 km más al norte, el 14 de noviembre de 1997 (MDLP).

Gavilán ceniciento (*Circus cinereus*). El 28 de agosto de 1998, un ejemplar en Matilde, departamento Las Colonias, Santa Fe (MM). Especie con una observación previa para la provincia: el 8 de mayo de 1974 en Roldán, departamento San Lorenzo (MDLP).

Esparvero común (*Accipiter erythronemius*). El 28 de agosto de 2000, a 8 km al este de San Carlos Centro, un ejemplar posado en un paraíso (*Melia azedarach*), comiendo un jilguero dorado (*Sicalis flaveola*) (MDLP y MM) y el 4 de marzo de 2002, en Esperanza, uno posado en un ombú (*Phytolacca dioica*) (MDLP). Cuenta con escasos



► COMUNICACIONES

registros en la provincia (De la Peña, 1997).

Guaicurú (*Herpetotheres cachinnans*). Un ejemplar fue observado en un área de esteros y palmares, cerca de Villa Guillermina, departamento General Obligado, Santa Fe, el 29 de marzo de 2002 (MM, JL y HL). Había sido citada para la región, nidificando (De la Peña, 1983).

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*). En San Carlos Centro, el 26 de marzo de 1999 y en Rosario, departamento Rosario, el 27 de noviembre y el 1 de diciembre de 2000, en cada caso un ejemplar (MM) y en Santa Fe, departamento La Capital, uno el 29 de junio de 2001 (MDLP). Existen pocas citas para la provincia (De la Peña, 1997), sumándose éstas a una del 2 de diciembre de 1972, en la ciudad de Santa Fe (MDLP).

Burrito común (*Laterallus melanophaius*). Observación de un ejemplar el 6 y el 8 de agosto de 2002, en Pérez, departamento Rosario (HL y Luciano Acquaviva). Tiene registros en Puerto Piracuacito, departamento General Obligado, el 7 de mayo de 1988 (MDLP) y en Santa Fe, departamento La Capital, el 15 de enero de 2000 (Pautasso, com. pers.).

Playerito canela (*Tryngites subruficollis*). El 10 de febrero de 2000, Leandro Benz (com. pers.) observó varios ejemplares en la laguna Setubal. La especie tiene pocas citas en la provincia (De la Peña, 1988).

Torcacita colorada (*Columbina talpacoti*). El 22 de febrero de 2002, seis ejemplares fueron vistos en bosques ribereños del río Coronda, en cercanías de Monje, departamento San Gerónimo, Santa Fe (MM, JL y HL). El 5 de mayo de 2001, en una isla frente a Rosario, en el departamento Victoria, Entre Ríos, un ejemplar (JL y César Giarduz). En Colastiné Norte, departamento La Capital, Santa Fe, se localizó un nido el 7 de noviembre de 1999 (A. Pautasso, com. pers.). Se desplaza por los bosques que rodean el río Paraná.

Loro hablador (*Amazona aestiva*). El 19 de julio de 2002, en Santa Felicia, departamento Vera, Santa

Fe, dos ejemplares (MDLP). Esta cita está 140 km al suroeste de la observación más cercana: dos ejemplares en Las Claritas, departamento General Obligado, el 27 de septiembre de 1989 (MDLP). Se desplaza por los bosques de la cuña boscosa.

Cuculillo pico amarillo (*Coccyzus americanus*). El 7 de enero de 2002, se observó un ejemplar a 10 km al este de Villa Ocampo, departamento General Obligado, Santa Fe. Tiene un registro del 10 de diciembre de 1976 y otro del 31 de diciembre de 1977, en Esperanza (MDLP).

Tingazú (*Piaya cayana*). El 3 de mayo de 2002, en los montes de la Reserva de la Escuela Granja, 7 km al norte de Esperanza, un ejemplar (MDLP). El lugar más cercano donde fue vista, está a 230 km más al norte, en la estancia Las Aves, 50 km al oeste de Calchaquí, departamento Vera, donde fue observado un ejemplar el 12 de enero de 1989 (MDLP). Posiblemente se produce un desplazamiento hacia el sur por los montes que bordean el río Salado, los que actúan como corredores.

Bandurrita común (*Upucerthia dumetaria*). El 11 de agosto de 2002, se observó un ejemplar en El Espinillo, 20 km al norte de Casilda, departamento Caseros, Santa Fe (MM y HL); se carecía de citas concretas para la provincia (De la Peña, 1997).

Fioflo copetón (*Elaenia flavogaster*). Del 28 al 31 de marzo de 2002, varios ejemplares fueron vistos en Villa Guillermina, Santa Fe (MM, JL y HL). Es citada para la región por Hartert y Venturi (1909).

Monjita gris (*Xolmis cinerea*). Tiene una distribución dispersa en la provincia de Santa Fe, siendo más común en el norte. El 18 de julio y el 12 de septiembre de 2001 y el 6 y 27 de julio del 2002, fueron vistos un ejemplar en cada oportunidad en Pérez (HL). El lugar está a unos 220 km más al sur que los registros de Rafaela, departamento Castellanos, del 1 de septiembre de 1998 y Llambi Campbel, departamento La Capital, del 28 de enero de 1987 (MDLP).

Gaucha chico (*Agriornis murina*). Observado el 30



COMUNICACIONES

de julio de 2001 en islas del río Paraná, departamento Victoria, Entre Ríos (MM, JL y César Giarduz). No tenía registros concretos para la provincia (De la Peña, 1997).

Anambé verdoso (*Pachyrhamphus viridis*). El 14 de febrero y el 18 de marzo del 2000, en islas del río Paraná, departamento Victoria, Entre Ríos, fueron vistos dos ejemplares (JL); en la provincia contaba con registros para el este y el oeste (De la Peña, 1997).

Golondrina ribereña (*Stelgidopteryx ruficollis*). Se observó una pareja nidificando en una isla del río Paraná, departamento Victoria, Entre Ríos, el 12 de noviembre del 2000 (MM, JL y César Giarduz). No estaba registrada en el suroeste de Entre Ríos y se confirma su nidificación en la provincia.

Arañero silbón (*Basileuterus leucoblepharus*). Dos ejemplares fueron observados en la isla Boca de los Chivos, departamento Victoria, Entre Ríos, el 24 de octubre de 1999 y uno el 21 de enero y el 21 de febrero del 2001 (HL). Cuenta con registros para los bosques sobre el río Uruguay (De la Peña, 1997).

Saí común (*Conirostrum speciosum*). El 5 de enero de 2002, en El Talar, 11 km al sureste de Villa Ocampo, departamento General Obligado, un macho (MM y Mariano Cracogna). Fue citada por primera vez para la provincia en esa zona (De la Peña, 1996).

Fueguero común (*Piranga flava*). Una pareja el 15 de septiembre de 1997 y el 5 de enero de 1998, en el cruce de la ruta 11 y el río Carcarañá, en La Ribera, departamento San Lorenzo, Santa Fe (JL). Tiene observaciones en la provincia más al norte (De la Peña, 1997), desplazándose hacia el sur por las arboledas del río Paraná.

Frutero negro (*Tachyphonus rufus*). El 21 de febrero de 2001 fue vista una pareja en la isla Pozo de los Armados, departamento Victoria, Entre Ríos, frente al puerto General San Martín, Santa Fe (HL). No habría registros para Entre Ríos (De la Peña, 1997), y el lugar está a unos 200 km al sureste de la cita

más al sur en la provincia de Santa Fe, donde fue registrada una pareja en Esperanza, el 9 de julio de 1972 (MDLP).

Tangará gris (*Thlypopsis sordida*). El 11 de agosto del 2000, tres ejemplares en islas del río Paraná, departamento Victoria, Entre Ríos (JL). Se trataría del primer registro para Entre Ríos (De la Peña, 1997), a 170 km al sur de la observación del 16 de octubre de 1999, en Colastiné Norte (MDLP).

Corbatita blanco (*Sporophila leucoptera*). El 15 de julio de 1999 se observa una pareja en Cayastá, departamento Garay, Santa Fe (MLDP) y el 30 de julio de 1999 en Colastiné Norte, un macho (MM). Tiene pocas y dispersas citas en la provincia (De la Peña, 1997), siendo éstas las más sureñas.

Diuca común (*Diuca diuca*). Un ejemplar observado el 29 de mayo de 2002, en Espinillo, cerca de Casilda, departamento Caseros, Santa Fe (HL). Cuenta con escasos registros en la provincia, algunos en el departamento Las Colonias y San Martín, en primavera y verano (MLDP) y otro en La Capital (Pautasso, 2002). Posiblemente nidifica localmente.

Agradecemos a Mariano Cracogna, Leandro Benz, César Giarduz, Rodolfo Luna, Luciano Acquaviva, Oscar Croatto, Andrés Pautasso y Norberto Mollo por acompañarnos en las tareas de campo y por brindarnos información inédita.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- DI GIACOMO, A. G. , A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. *Nuestras Aves*, 42: 18-20.
- GIAI, A. 1950. Notas de viajes. *Hornero*, 9 (2): 121-164.
- DE LA PEÑA, M. R. 1983. Notas nidológicas sobre aves argentinas. *Hornero*, número extraordinario: 170-173.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Nuevos registros o aves poco citadas para Santa Fe. *Nuestras Aves*, 16: 17-18.
- DE LA PEÑA, M. R. 1996. Nuevos registros o aves poco citadas para las provincias de Santa Fe y Entre



► COMUNICACIONES

Ríos, Argentina. Hornero 14 : 87-89.

DE LA PEÑA, M. R. 1997. Lista y distribución de las aves de Santa Fe y Entre Ríos. L.O.L.A. Buenos Aires, 126 páginas.

HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.

PAUTASSO, A. 2002. Nuevos registros para aves poco citadas en Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves, 43: 19-21.

ROMANO, M., F. PAGANO y M. LUPPI. 2002. Registros de parina grande (*Phoenicoparrus andinus*) en la laguna Melincué, Santa Fe, Argentina. Nuestras Aves, 43: 15-17.

NOTAS SOBRE EL HALCÓN PEREGRINO (*Falco peregrinus*) Y EL PICABUEY (*Machetornis rixosus*) EN MENDOZA, ARGENTINA

Roberto Pereyra Lobos

Dirección de Recursos Naturales Renovables. Boulogne Sur Mer s/n Parque General San Martín. Provincia de Mendoza, Argentina. Correo electrónico: robertopereyra@topmail.com.ar

Halcón peregrino (*Falco peregrinus*). En diciembre de 1999 observé un nido de halcón peregrino en Confluencia (32° 45' 45" S; 69° 58' 45" O), donde convergen los ríos Horcones Superior y Horcones Inferior, a 3.300 m de altura, en el Parque Provincial Aconcagua. El ambiente es típicamente altoandino con presencia de vegas (mallines), arroyitos y cascadas. El lugar tiene unas salientes rocosas orientadas hacia el río Horcones Superior, unos 400 metros antes de la confluencia de los ríos. El nido, que tenía dos pichones, sólo pudo ser observado con binoculares, dado que el sitio era inaccesible. Si bien el halcón peregrino tiene una amplia distribución por la Argentina (Olrog, 1979), no era mencionado para Mendoza por los listados provinciales (por ejemplo, Reed, 1916, y Roig, 1965), aunque ya es mapeado por Olrog y Pescetti (1991). En la Dirección de Recursos Naturales Renovables no se contaba con antecedentes de la nidificación de la especie para el Parque Provincial Aconcagua.

Picabuey (*Machetornis rixosus*). Se realizaron dos observaciones del picabuey en El Puerto (26° 12' 62" S; 54° 34' 65" O), departamento Lavalle, noreste de Mendoza, sobre el límite con la provincia de San Juan: dos ejemplares en una construcción el 16 de octubre de 2001; un individuo el 15 de diciembre de 2001. El picabuey cuenta con pocos y recientes registros para la provincia de Mendoza (Chebez *et al.*, 1993; Haene *et al.*, 1995; Militello, 1999; Di Giacomo *et al.*, 2001), donde fue señalado para el nordeste por Olrog y Pescetti (1991); también se lo observó en la Reserva Natural

Divisadero Largo (Pereyra Lobos, obs. pers.) y la Reserva de la Biosfera Ñacuñán (E. A. Pescetti, com. pers.).

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CHEBEZ, J. C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas. IV. Nótulas Faunísticas, 38: 1-11.
- DI GIACOMO, A. G., A. S. DI GIACOMO y C. A. MARCHISIO. 2001. Nuevos registros de aves para el centro de la Argentina. Nuestras Aves, 42: 18-20.
- HAENE, E. H., S. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. El Hornero, 14: 48-52.
- MILITELLO, A. 1999. Guía de aves de la Refinería Luján de Cuyo. YPF. Mendoza, 90 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de avifauna argentina, Opera Lilloana, 27:1-324.
- OLROG, C. C. y E. A. PES CETTI. 1991. Las aves del Gran Cuyo: Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de campo. CRICYT. Mendoza, 160 páginas.
- REED, C. 1916. Las aves de la provincia de Mendoza. Museo Educacional de Mendoza. Mendoza, 47 páginas.
- ROIG, V. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Boletín de Estudios Geográficos, 49 (12): 175-227.