

Actualizando la distribución de nuestras aves

ALGUNAS ADICIONES A LA AVIFAUNA PUNTANA

En ocasión de un viaje que efectuáramos en el mes de abril de 1984 (desde el 18 al 21), a la provincia de San Luis, en compañía de Silvina Pérez Fornells y Santiago Gaddi, nos fue posible constatar la presencia de cinco especies que hasta el presente no habían sido señaladas en el territorio puntano según la bibliografía consultada: *Bubulcus ibis*, *Geositta rufipennis*, *Agriornis montana*, *Todi-rostrum margaritaceiventer* y *Catamenia inornata*.

La provincia de San Luis es una de las menos estudiadas desde el punto de vista ornitológico y no debe sorprendernos en consecuencia, que a pesar de nuestra tan corta estadía hayamos podido efectuar observaciones de interés. Hasta el presente se han ocupado de la provincia, con cierto detalle: Partridge (1953), Contreras (1979), Ochoa de Masramón (1983), Nores e Yzurieta (1983) y en trabajos más generales de ornitogeografía: Olrog (1963 y 1978) y Nores y otros (1983).

Tres de las especies registradas: *Geositta rufipennis*, *Agriornis montana* y *Catamenia inornata* fueron observadas en el mismo tipo de ambiente: las últimas estribaciones de la sie-

rra de San Luis. Tal como nos fuera adelantado personalmente por Nores (com. pers.) dichas elevaciones constituyen una prolongación de los ambientes serranos de altura típicos de la Pampa de Achala en la vecina provincia de Córdoba, de allí la semejanza de los elementos característicos de ambas serranías.

Entre las aves también nos fue posible observar, además de las que constituyen el objeto de esta comunicación: *Asthenes modesta*, *Cinclodes (oustaleti) olrogi* y *Phrygilus plebejus*, todas ellas ya conocidas para esta región de la provincia (Nores y otros, op. cit.).

Geositta rufipennis (Caminera de Ala Colorada): Fue vista recorriendo las orillas de uno de los afluentes del Arroyo Peñón, en la estancia Peñón Colorado (en las inmediaciones de La Carolina, departamento Coronel Pringles) siempre en forma aislada. Podría tratarse de *Geositta rufipennis ottowi*, subespecie hasta ahora considerada endémica de las sierras de Córdoba.

Agriornis montana (Gaucho de Cola Blanca): Fue visto en forma aislada posado sobre las rocas que afloraban entre los pajonales en las inmediaciones del Peñón Colorado. La espe-

cie ya era conocida para las sierras de San Luis, donde se habían colectado ejemplares (Nores, com. pers.), sin contarse hasta el presente con comunicaciones bibliográficas sobre su presencia en la provincia. Podrían asignarse estos ejemplares provisoriamente, por proximidad, a la subespecie endémica de las sierras de Córdoba: *Agriornis montana fumosus*.

Catamenia inornata (Piquito de Oro Grande): Fue visto en dos oportunidades tratándose en ambos casos de parejas. Una de ellas en los pastizales que bordeaban uno de los afluentes del Arroyo Peñón en la estancia Peñón Colorado y la otra en el desvío a Intihuasi de la ruta provincial N° 10. Se podrían asignar provisoriamente estos ejemplares a la subespecie recientemente descripta por Nores e Izurieta (1983) para la Pampa de Achala, provincia de Córdoba: *Catamenia inornata cordobensis*.

Las otras dos especies fueron registradas una en un ambiente de espinales peri-serranos, en el caso de *Todirostrum margaritaceiventer*, y la otra *Bubulcus ibis* en un ambiente pampeano con isletas de espinal muy aisladas dedicado a la ganadería.

Todirostrum margaritaceiventer (Papasebo Común): Fue visto solitario entre la vegetación espinosa en los alrededores de La Toma. Ya era conocida para la vecina provincia de Córdoba (Nores y otros, 1983).

Bubulcus ibis (la Garcita Bueyera): Fue vista en numerosas concentraciones acompañando al ganado bovino en las inmediaciones de la ruta nacional N° 148 al NO de San José del Morro (El Morro).

Beltzer (1981) resume las provincias argentinas para las que se conocían registros y avistajes de esta garza de varios autores: Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas Malvinas. A las que habría que sumar La Rioja (Nores y otros op. cit.), Chaco (observación de Juan Carlos Chebez, en julio de 1979, de una pareja junto a unos caballos en Fuerte Esperanza, en el "Impenetrable" chaqueño), Mendoza (Darrieu y otros), 1984 y ahora San Luis.

Bibliografía

Beltzer, A.H. 1981. *Bubulcus ibis* (L. 1758) "Garcita Bueyera". Una nueva cita para la provincia de Entre Ríos (Argentina) Mem. del Museo Paraná. Ser. nueva, Zool. N° 3: 1-3, Paraná.

Contreras, J.R. 1979. Avifauna puntana. I. Algunas especies nuevas o poco conocidas para la provincia de San Luis. Hist. Nat. I (3): 9-12, Mendoza.

Darrieu, C., M. Martínez y G.E. Soave. 1984. Sobre la nidificación de *Bubulcus ibis* y otros ardeidos en la provincia de Mendoza. (Argentina) (Aves: Ardeidae). Hist. Nat. V. 4 (15): 141-144, Corrientes.

Nores, M. y D. Yzurieta. 1983. Especiación en las sierras pampeanas de Córdoba y San Luis (Argentina), con descripción de siete nuevas subes-

pecies de aves. El Hornero, núm. extr. 88-102, Bs. As.

Nores, M. y D. Yzurieta y R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba. T. 56: 1-114, Córdoba.

Ochoa de Masramón, D. 1983. Lista de aves del nordeste de San Luis. El Hornero núm. extr.: 77-87, Bs. As.

Olrog, C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana 9: 1-377, Tucumán.

Olrog, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324, Tucumán.

Partridge, W.H. 1953. Observaciones sobre aves de las provincias de Córdoba y San Luis. El Hornero X (1): 23-73, Bs. As.

Nota:

Durante el lapso transcurrido entre la presentación de esta nota, que por razones de espacio no pudo ser incluida en el número anterior de Nuestras Aves (Nº 7), y la aparición de este número los autores se notificaron a través de una atenta carta del Lic. Manuel Nores que en una publicación del mismo (Nuevas localidades para aves argentinas - Parte VI - Historia Natural, en prensa) comunica para las sierras de San Luis a tres de las especies aquí señaladas: *Asthenes modesta*, *Agriornis montana* y *Phrygilus plebejus* que había observado y coleccionado allí desde hace varios años.

En cuanto a *Geositta rufipennis* es mencionada como especie nidificante para las "Sierras altas de Córdoba y San Luis" en el primer tomo de Nidificación de las Aves Argentinas de Narosky, Fraga y De la Peña (1984) pero sin señalar las localidades ni fechas concretas de observación de las especies ni del hallazgo de nidos en la mencionada región puntana.

Juan C. Chebez - Daniel Gómez
Claudio Bertomatti



C.I.P.A. Informa:

Macá Tobiano: Nuevas esperanzas

En marzo del corriente año culminó la "Campaña 84/85 del Proyecto Macá Tobiano que la Fundación Vida Silvestre Argentina viene encarando desde 1978.

Esta última temporada que se desarrolló entre diciembre de 1984 y marzo

de 1985 tuvo como objetivos principales investigar la distribución y número poblacional de este zambullidor. Después de haber sobrevolado cerca de 10.000 Km² donde se localizaron nuevas áreas habitadas por esta especie, se iniciaron los conteos mediante recorridas terrestres por la Laguna de los Escarchados, prosiguiendo con las lagunas de las mesetas del Lago Viedma, El Moro, San Adolfo, La Siberia, Cardiel Chico, Lago Strobel, Asador, Pampa del Asador y Lago Buenos Aires. El censo final resultó en cerca de 3.000 macáes tobianos, quienes se encontraron nidificando en las mesetas ya mencionadas, dudando que una cifra representativa de la población se extienda más allá de la meseta del Lago Buenos Aires (alcanzando la Provincia de Chubut) principalmente debido a la falta de condicio-