



## AVES DE LA RIBERA DEL RÍO COLORADO EN LA PAMPA, UNA NUEVA CITA PARA LA PROVINCIA Y DOS ESPECIES POCO COMUNES

Fabián Tittarelli

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de La Pampa. Uruguay 151 (6300), Santa Rosa, La Pampa, Argentina. Correo electrónico: fita@ciudad.com.ar

En este artículo se detallan las observaciones sobre tres especies en la zona ribereña del río Colorado cuya presencia en La Pampa está pobremente documentada, o como en el caso del chorlito palmado (*Charadrius semipalmatus*), el registro constituye el primero en detalle para la provincia. Las observaciones fueron realizadas en el establecimiento Los Valles (39° 11' 30" S, 63° 42' 20" O), departamento Caleu Caleu, lugar donde la Cátedra de Biología de la Conservación de la Universidad de La Pampa realiza una serie de proyectos con el fin de evaluar la importancia del sistema ripario para la ornitofauna de la región.

### Chorlito palmado (*Charadrius semipalmatus*)

El 17 de setiembre de 2000, fueron observados dos ejemplares en un banco de arena en la costa del río. Esta especie se reproduce en Alaska y Canadá y en otoño emprende su viaje migratorio hacia Sudamérica (Hayman *et al.*, 1986; Olog, 1979). Aunque su recorrido varía de acuerdo con las condiciones climáticas (Hayman *et al.*, 1986), su zona de invernada comprende las costas marinas y continentales de Sudamérica, llegando hasta Tierra del Fuego (Hayman *et al.*, 1986; Olog, 1979). Si bien la amplitud del área ocupada en su estadía invernal lo hace muy probable, esta constituye la primera cita formal de su presencia en La Pampa; previamente solo contaba con una mención para la provincia (Aravena, 1970).

### Curutié ocráceo (*Cranioleuca sulphurifera*)

El 20 de mayo de 2001 fueron observados tres ejemplares en un sector de la costa dominado por cortaderas (*Cortaderia selloana*) y chilcas (*Baccharis salicifolia*). Estos ejemplares se desplazaban por las ramas de las chilcas, alimentándose de pequeños insectos.

Su distribución comprende Brasil, Uruguay y la Argentina, donde se extiende hasta Río Negro (Narosky e Yzurieta, 1987), sin embargo el curutié ocráceo es una especie poco conocida en su área de distribución

(Ridgely y Tudor, 1994). Este registro es uno de los pocos conocidos para La Pampa y aporta nuevos datos sobre la presencia de la especie en la provincia.

### Piojito gris (*Serpophaga nigricans*)

El 18 de setiembre de 2000 se observaron dos ejemplares en un ambiente de cortaderas sobre el borde del río Colorado.

El piojito gris frecuenta distintos ambientes aunque siempre cercanos al agua (Ridgely y Tudor, 1996). Su área de distribución comprende parte de Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y en la Argentina desde el norte hasta Río Negro (Narosky e Yzurieta, 1987; De la Peña, 1988). Esta observación es una de las pocas registradas para nuestra provincia, además la especie es poco conocida en La Pampa.

### BIBLIOGRAFÍA CITADA

- ARAVENA, R. O. 1970. Vertebrados de La Pampa. Biblioteca Pampeana. Serie folletos, 13, 31 páginas.
- DE LA PEÑA, M. R. 1988. Guía de aves argentinas. Tomo V. LOLA. Buenos Aires, 117 páginas.
- HAYMAN P., J. MARCHANT y T. PRATER. 1986. Shorebirds. An identification guide. Houghton Mifflin Company. Boston, 412 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27. Buenos Aires, 324 páginas.
- RIDGELY, R. y G. TUDOR. 1994. The birds of South America. Volume 1. The Suboscine Passerines. In association with the Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Oxford University Press. Oxford y Tokio, 814 páginas.

Recibida: julio de 2001