

PRIMERA CITA DEL PICAFLOR SERRANO VENTRINEGRO PARA LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

En enero de 1985 durante una incursión por la margen sur del Lago San Martín (Departamento Lago Argentino) se observaron en tres oportunidades *Oreotrochilus leucopleurus* (Picaflor Serrano Ventrinegro), entre la Estancia El Cóndor y el río San Martín de Rosas, ubicado en la frontera con Chile. Tanto los machos como las hembras eran ejemplares adultos. Los machos mostraban un comportamiento súmamente territorial y al igual que las hembras eran confia-

dos y libaban cardos, notros y espinos negros. Según la bibliografía existente es la primera cita para la provincia de Santa Cruz. Olrog (1979, Nueva lista de la ornitofauna argentina. op. LIII. XXVII) la menciona desde Jujuy y Salta hasta Chubut.

Alejandro Serret
Andrés Johnson
Santa Cruz

PRESENCIA DEL PICAFLOR GIGANTE EN NECÓCHEA, BUENOS AIRES

El 13 de marzo de 1986 estaba próximo el mediodía cuando dirigí mi vista hacia el jardín de casa sorprendiéndome ver un ave grande que libaba de las flores de las aljabas (*Fuchsia gracilis* y *F. magellanica*) que deliberadamente planté para deleitarme con la presencia de los picaflores.

Las mismas son visitadas cotidianamente por las dos especies comunes en la zona, es decir, *Chlorostilbon aureoventris* y *Leucochloris albigolis*, que se disputan agresivamente el territorio.

Pero mi sorpresa fue mayúscula al observar que quien libaba en ese momento difería notablemente de los conocidos pues se trataba de un picaflor de tamaño notablemente mayor que los citados y de características distintas.

Lo primero que hice fue buscar la cámara fotografica y adicionarle un teleobjetivo de 300mm. para documentar la observación.

Por suerte no se mostraba desconfiada ya que después de libar se posaba en el alambre del tendedero de modo que logré acercarme a unos 6 metros.

Así pude tomarle algunas fotografías posada y en vuelo, aunque ésta lamentablemente falló.

Observé que tenía el pico recto, de color negro, mucho más grande que la cabeza que era parda; dorso verde azulado; rabadilla blanca; cola verde oscuro; parte ventral: garganta, pecho y vientre acanelados con algunas manchitas blancas entre la garganta y el pecho; cobertoras caudales inferiores blancas.

Al consultar la bibliografía de que dispongo y con las fotografías reveladas no tuve duda que se trataba de *Patagona gigas*, Picaflor Gigante o Gigante Andino.

Otra de las características que más llamaron mi atención fue el aleteo muchísimo más lento que el de los otros picaflores.

Como de las características que más llamaron mi atención fue el aleteo muchísimo más lento que el de los otros picaflores.

Como su área de distribución comprende Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja San Juan y Mendoza, (Olrog, 1979), además del norte de Chile, Bolivia y Perú, entre los 1000 y los 3000 m sobre el nivel del mar, cabe