


NOTAS NIDOBIOLOGICAS SOBRE AVES ARGENTINAS

(Descripción de nidos)

PITAJO NEGRUZCO (*Sayornis nigricans*)

El 29 de noviembre de 1978, en la Quebrada de Escoipe (Salta), se encontró un nido en una gruta y asentado sobre la piedra, a 3,50 metros del suelo. Tenía forma de

taza, construido con pajitas externamente, barro en la base y pelos en la parte interna. Diámetro de 7 cm y 2 cm de profundidad. Contenía 2 pichones.



DESCRIPCION DE UN NIDO DE LA MONTERITA CASTAÑA

No existen muchos datos bibliográficos referentes a la nidificación de la Monterita Castaña o Siete Vestidos, (*Poospiza nigrorufa*) que según Olrog (1979) se distribuye en nuestro país con dos subespecies: *Poospiza nigrorufa nigrorufa*; desde Misiones, este de Formosa y Chaco hasta Río Negro, y *Poospiza nigrorufa whitii*; desde Jujuy y Salta hasta Tucumán, este de Catamarca y oeste de Córdoba.

En esta nota se describe un nido hallado el 27 de noviembre de 1983, en la localidad de G.E. Hudson, partido de Berazategui, provincia de Buenos Aires.

Estaba ubicado entre las ramas de un espeso matorral compuesto de diversas especies vegetales, bien oculto por el follaje y a 1 m. del suelo. Dinalli (1924), refiriéndose a la forma del NO, halló huevos en abril y pichones en noviembre. Según Pereyra

(1938) nidifica de octubre a diciembre, entre matorrales y enredaderas o en pajonales. Hudson (1974) señala que anida en el suelo o en arbustos cerca del suelo.

El nido tenía forma de semiesfera abierta, prolija y construida con elementos vegetales diversos. Externamente estaba elaborado con tallitos y ramitas secas (entre 1,5 y 3 mm. de espesor), zarcillos y algunas hojas secas. A esta estructura seguía una capa de hojas y trozos de hojas marchitas o secas. Internamente se hallaba tapizado con tallitos y pajitas muy finas, bien entrelazadas, y algunos trocitos de líquenes. Dinelli (1924) dice que puede agregar crines a la construcción y que el borde circular superior queda relativamente muy alto del fondo.

Las medidas eran: diámetro externo 11-13 cm.; diámetro interno 5,5-6 cm.; altura 9 cm.; profundidad 4 cm.

Contenía 3 huevos, poco incubados, de color celeste pálido muy manchados de gris liláceo, pardo y castaño oscuro. Las manchas eran más abundantes hacia el polo obtuso. En dos de ellos aparecían además manchitas y rayitas negras sobre dicho polo. Medían 19,55 x 15,10; 20,10 x 15,00 y 20,75 x 14,85 mm. (promedio 20,13 x 14,96 mm.).

Los huevos se parecen a los de *Sporophila*

caerulescens (corbatita común), observación también hecha por Pereyra (1938). La coloración y las dimensiones de los mismos no difieren de las citadas por diversos autores, como Hartert y Venturi (1909) y Pereyra (1938).

Bibliografía

- Dinelli, L., 1924. Notas biológicas sobre aves del noroeste de la Argentina, Hornero 3 (3).
- Hartert, E. y S. Venturi, 1909. Notes sur les oiseaux de la Republique Argentine. Novit. Zool. 16.
- Hudson, G.E., 1974. Aves del Plata. Libros de Hispanoamérica. Buenos Aires.
- Olrog, C.C., 1979. Nueva Lista de la Avifauna Argentina. Op. Lilloana XXVII. Tucumán.
- Pereyra, J., 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. La Plata, parte 2.

Alejandro G. Di Giacomo
Horacio A. Aguilar



Nido de la Monterita Castaña (*Pospiza nigrorufa*) Dibujo: Adrián S. Di Giacomo.