

Nuevos registros para la avifauna sanjuanina

En noviembre de 1987 participé de un viaje* por los departamentos de Caucete y Valle Fértil, provincia de San Juan. La región visitada posee una mezcla de elementos de las provincias fitogeográficas chaqueña y del monte, habiendo tanto bosques abiertos de quebracho blanco (*Aspidosperma*) y algarrobos (*Prosopis*), o bosques de quebrachos colorados (*Schinopsis*) en las quebradas serranas, como también extensos jarrillales (*Larrea*). Sobre las sierras se encuentran estepas arbustivas con chaguares (*Deuterocohnia*), y en el dep. Valle Fértil son muy comunes los cardones (*Trichocereus*).

Esta variedad de ambientes contienen una interesante avifauna. Entre las especies más típicas observadas se podrían mencionar: *Vultur gryphus*, *Spizapteryx circumcinctus*, *Chunga burmeisteri*, *Colunba maculosa*, *Phytotoma rutila*, *Teledromas fuscus*, *Turdus chiguanco*, *Thraupis bonariensis*, *Diuca diuca*, etc.

Algunas de las aves observadas serían nuevas para la provincia. Ellas son:

Sarcoramphus papa - 16/11/86: Un ejemplar en una quebrada serrana al oeste de Astica. Diversos autores (Olrog 1979, Blake 1979; Contino 1980; De la Peña 1985) consideran que su distribución austral alcanza a lo sumo hasta La Rioja por el oeste del país.

Crotophaga ani - 18/11/86: Un individuo en el borde de la laguna artificial en las afueras de San Agustín de Valle Fértil. Está citado desde el norte hasta La Rioja y San Luis (Olrog 1979; Nores, Yzurieta y Miatello 1983).

Machetornis rixosus - 17-20/11/86: Al menos una pareja en el parque del campamento del A.C.A. de San Agustín Valle Fértil. Estaba registrado desde el norte del país hasta La Rioja y San Luis por el oeste (Narosky 1978; Olrog 1979; Nores, Yzurieta y Miatello 1983).

Parula pityayumi - 116/11/86: Al menos dos individuos en las afueras de Astica. Se la con-

sidera distribuida desde el norte hasta La Rioja y San Luis por el oeste (Olrog 1979, Nores, Yzurieta y Miatello 1983).

Lophospingus pusillus - 10/11/86: Un ejemplar en los Baldes de Chucuma. También estaba citada hasta La Rioja y San Luis (Olrog 1979; Nores, Yzurieta y Miatello 1983).

También pude observar cinco especies recientemente halladas para San Juan (Nores e Yzurieta 1982). Ellas son:

Leptotila verreauxi: varios ejemplares en los bosques serranos cercanos a Astica y San Agustín de Valle Fértil, así como también dentro de dichos centros urbanos.

Aratinga acuticaudata: varios individuos en Astica y en los bosques serranos vecinos a ella, y también en la ciudad de San Agustín de Valle Fértil, donde llegaban en bandadas a comer frutos, tales como moras en la plaza central.

Myiodynastes maculatus: un ejemplar en Marayes y otro en Astica.

Myiarchus tyrannulus: uno o dos individuos en Marayes.

Poospiza melanoleuca: una pareja en el campamento del A.C.A. de San Agustín de Valle Fértil.

Las observaciones en Astica fueron realizadas con M.V. Paredes, M.A. Berón y G.D. Berón; y en el campamento del A.C.A. de San Agustín de Valle Fértil con G. Marambio y M. Michelli.

Sería muy oportuna la efectivización de la reserva provincial Valle Fértil, que permitiera conservar esta rica avifauna, de características únicas para la provincia de San Juan, albergando también especies en franco retroceso numérico, como ejemplo el cardenal amarillo (*Gubernatrix cristata*).

*Este viaje fué posible gracias a la invitación de la Dir. de Rec. Nat. de San Juan; a los medios cedidos por el Dep. de Flora y Fauna y a la compañía de su jefe, el Sr. Fernando Cordeje.

Bibliografía

Blake, E. 1979. Manual of neotropical birds.

Chicago, Press Edition.

Contino, F. 1980. Aves del Noroeste argentino. Univ. Nac. de Salta.

De la Peña, M.R. 1985. Aves argentinas, tomo II. Univ. Nac. del Litoral.

Narosky, T. 1978. Aves argentinas, guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As..

Nores, M. y D. Yzurieta 1982. Nuevas localidades para aves argentinas - Parte III. Historia Natural, vol. 2 nº 17. Corrientes.

Nores, M.; D. Yzurieta y R. Miatello 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba. Tomo 56: 11-114. Córdoba.

Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana. 27: 1-324. Tucumán.

Olrog, C.C. 1984. Las aves argentinas, una nueva guía de campo. Adm. de Parques Nacionales.

Agradecería mucho al Sr. Samuel Narosky, quien amablemente ha corregido esta nota

Eduardo H. Haene

Grupo Estrategia Nac. de Áreas Naturales
Fund. Vida Silvestre Argentina

la Argentina y el comportamiento estático que no le conocíamos de nuestras observaciones en la costa de Brasil.

Tito Narosky

Nidificación otoño-invernal del lechuzón orejudo

El 25 de Mayo de 1986, se halló el nido de este estrígado, en la localidad de Bernal (Bs. As.) en una zona de sauzales (*Salix sp.*) y lirios (*Iris pseudacorus*) en la ribera platense. Estaba ubicado en la trifurcación del tronco de un sauce a 43 cm. del agua. Sobre un lecho de detritos colocaron ramas de sauce y hojas de lirio. Medía 21 cm. de diámetro externo, 18 cm. de diámetro interno y 1 cm. de profundidad.

Contenía un huevo casi esférico, blanco, sin incubar, de 46.9 x 40.6 mm.

En la Reserva de Costanera S (Cap. Fed.) Diego Gallegos Luque (com. pers.) halló el 29 de mayo un nido con 3 pichones; el mismo se encontraba ubicado en el suelo en un monte con predominio de aliso de río (*Tessaria intergrifolia*). Esta información fue luego corroborada por nosotros.

Finalmente, el 17 de agosto observamos en Bernal dos parejas con pichones de diversas edades.

Son escasos los datos bibliográficos sobre nidificación otoñal e invernal de esta especie en nuestro país. Fraga (1984) halló pichones en los meses de julio y octubre y hace referencia a Pereyra, quien observó pichones nacidos a fines de junio, y otro visto en agosto.

Bibliografía

Fraga, RM, 119844. Nidificación otoño-invierno de rapaces, El Hornero XII (3) 193-195.

Pereyra J.A., 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. jardín Zool. La Plata, 7: 197-326.

1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la Prov. Bs. As. Mem. jardín Zool. la Plata, 9: 1-304

Pedro Bledinger - Eduardo De Lucca
Miguel Saggese

Fregata Magnificens en Punta Rasa

El día 14 de diciembre de 1986 en compañía de Haydée Teggi visitamos el área del Cabo San Antonio. Allí junto al guarda fauna de la FVSA, Esteban Bremmer y su esposa Patricia, observamos desde alrededor de las 10 hs. hasta el anochecer, un grupo de 7 Fregatas, *Fregata magnificens*, jóvenes, con la cabeza y pecho blancos. Se mantuvieron prácticamente inmóviles, con las alas extendidas en continuo planeo y sin variar la distancia entre los individuos ni de éstos a la tierra. Al atardecer se incorporó uno más, sumando entonces ocho. Al día siguiente ya no estaban en el área. Según Bremmer, es ocasional la presencia de ejemplares aislados, al parecer siempre juveniles de Fregatas, llamando la atención en este caso el número inusual sin antecedentes para