

## PRESENCIA DEL PICAFLOR NEGRO COLA BLANCA EN CONCORDIA — ENTRE RIOS

Desde el 21-9-86 hasta el 2-10-86 inclusive, observé diariamente (12 días) un ejemplar solitario de Picaflor Negro Cola Blanca (*Melanotrochilus fuscus*) que frecuentó el jardín de mi casa, en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos. La observación se realizó visualizando directamente el ave o, según la distancia, con la ayuda de prismáticos. Para las tomas fotográficas conté con la valiosa y desinterada colaboración del Sr. Antonio Fornillo.

Concordia, Entre Ríos, está ubicada en las coordenadas 31° 23' Sur y 58° 20' O. El lugar se halla en un barrio Norte del casco urbano, distante 15 km. al sur de la Represa Salto Grande. Hay espacios amplios de terreno con abundante vegetación, la edificación es baja. Mi casa tiene un jardín de 9 x 25 m. profusamente cubierto de arbustos, plantas de flores, helechos, césped, palmeras y laurel de jardín. Se destaca un arbolito de calistemun de flores rojas y un gran árbol de olivo con copa de 12 m. de diámetro y 8 m de altura, con claveles del aire, orquídeas silvestres y otras especies.

### Características del ave

Largo, estimado - 105 a 110 mm. Pico color pizarra, de 22 a 25 mm. curvo hacia abajo. Ojos oscuros, confundiéndose con el resto de la cabeza, negra. Color general: Negro intenso, opaco, excepto lateral de cuello con algo de brillo al sol. Partes blancas y amarillentas según descripción.

Descripción de los colores: (se observó a distancias de 2,50 a 5 m) estando posado, de frente (fig. 1) se ve negro, con manchitas blancas en ambos laterales del cuerpo, que se prolongan hacia abajo. A la altura del abdomen se observa una bandita transversal blanca amarillenta. Subcaudales, negras. Cauda-

les blancas. Siempre posado, visto dorsalmente se ve todo negro, excepto una fina línea blanca transversal en ápice caudal. Posado, visto lateralmente (fig. 2) notable mancha blanca. Visto más próximo se observa la mancha blanca inferior.

Volando, en cualquier posición, es notable el contraste negro / blanco que se ve así: Flanco inferior del cuerpo, blanco. Cuando en algunas evoluciones abre la cola en ancho abanico se observa, desde arriba, blanco con timoneras centrales negras, y posiblemente, pintitas negras hacia el extremo de timoneras laterales. El abanico de la cola, observado desde abajo se ve blanco. Siempre en vuelo, es visible mancha blanca abdominal.

### Comportamiento

- Confiado. Normalmente permite que el observador se aproxime hasta 4 m. En una ocasión fue posible observarlo, a través de una ventana, a distancia de 2,50 m, posado, por término de 15 minutos.

- El árbol de olivo fue su posadero habitual.




figura 1

- Se alimentaba libando flores del caliste-mun rojo. También de otro vecino.

- Mientras permanece posado, especialmente de mañana, emite su voz que es un chirrido metálico, agudo, potente, que después de una pausa repite nuevamente.

- Por la tarde permanece más silencioso y dedica tiempo al arreglo del plumaje.

- A veces, desde la perchta, levanta vuelo casi verticalmente; se eleva 1,50 m. describiendo una trayectoria elíptica vuelve a posarse al mismo sitio. Después de breve descanso repite este vuelo.

- El árbol de olivo donde se posa, es visitado simultáneamente por Tacuaritas (*Troglodytes aedon*) con nido. Gorrones, con nido. Chiritos (*Polioptila dumicola*). Azulejos (*Thraupis sayaca*). En la parte inferior del árbol, Chingolos (*Junco capensis*). Ninguna de las especies citadas manifestó comportamiento agresivo hacia el picaflor ni viceversa.

- El ave observada aparentaba ser adulta, posiblemente macho.

- Desde la última fecha citada hasta el momento de escribir esta comunicación, 10 de octubre, el ave no retornó.



figura 2

#### NOTA DE REDACCION

Esta especie fue registrada por primera vez para la Argentina (*Pronunciamiento, Entre Ríos*) por Narosky (1979, *Un nuevo picaflor para la Argentina*. Hornero XII (1), pag. 53).

Faustino Torrano  
Concordia

## LA PRESENCIA ACTUAL DEL AGUILUCHO LANGOSTERO EN LA ARGENTINA

Existe muy poca información publicada sobre la situación actual del Aguilucho Langostero (*Buteo swainsoni*) en la Argentina. Al mismo tiempo existe creciente preocupación por la situación de esta especie que arriba año a año a nuestro país, procedente de sus áreas de nidificación en el hemisferio norte. También se sabía de mucha información dispersa entre distintos observadores.

Por este motivo la Sección Argentina del CIPA solicitó a observadores calificados la información que poseyeran sobre la especie. Así se obtuvieron los datos que se presentan,

provenientes de 17 personas, que si bien distan de dar un panorama completo, brindan una aproximación a la distribución, épocas de presencia y tamaños de las bandas en la Argentina actualmente.

Se abarcan casi 20 años de observaciones, si bien hay un notable incremento para los últimos años ante el mayor número de observadores. Las citas se presentan ordenadas por día y mes de observación, sin consideración del año en el ordenamiento y a partir del registro más temprano. Este es del 12 de agosto en la localidad de Ballesteros en