




TACHURI CANELA EN CHAPADMALAL

Alberto Martelli



Tachurí canela
(*Polystictus pectoralis*)
Ilustración: Eduardo Haene

Durante las dos primeras semanas de enero de este año pude observar en un terreno baldío a 300 metros del mar, en Chapadmalal (pdo. de Gral. Pueyrredón, pcia. de Buenos Aires), un ejemplar macho de tachurí canela (*Polystictus pectoralis*). Confiado y pasivo, pa-

rado en un *Eryngium* sp, emitía un canto de tres sílabas (larga-corta-corta) y un trino final grave durante el cual agitaba las alas. La reproducción de su voz en "play back" no modificaba su comportamiento. Frecuentemente elevaba copete negruzco dejando al descubierto notable corona blanca oculta. El hallazgo fue documentado fotográficamente. El límite austral de la distribución de esta especie sería el norte de la provincia de Bs. As. (Olrog 1984, Narosky y Yzurieta 1987, De la Peña 1988) por lo que esta observación constituye un registro extralimitar.

Bibliografía

- OLROG G. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Adm. de Parques Nacionales. B. Aires.
NAROSKY T, YZURIETA D. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornít. del Plata. B. Aires.
DE LA PEÑA M. 1988. Guía de aves argentinas. Tomo V. Passeriformes. Santa Fe.



VENCEJO DE COLLAR EN SAN LUIS

Eduardo De Lucca

El vencejo de collar (*Streptoprocne zonaris*) nidifica en la Argentina entre 1000 y 2000 m de altura en los cerros desde Jujuy hasta Mendoza; fuera de la época de reproducción ocurre en todo el norte sobre sabanas y campos abiertos hasta Entre Ríos y Córdoba (Olrog 1979). T. Narosky y D. Yzurieta (1987) señalan al vencejo de collar para las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Mendoza, San Juan, Córdoba y Misiones sin incluir a San Luis en la distribución de esta especie.

A principios de diciembre de 1986 me encontraba en el Embalse La Florida (dpto. Pringles), provincia de San Luis, realizando observaciones de rapaces cuando me llamó la atención la presencia de una bandada de aproximadamente 50 ejemplares que ruidosamente se desplazaban sobre las aguas del

mencionado emabalse. El tamaño de este vencejo, sumado a su característico color blanco y el fuerte chirrido que emiten, facilitó la identificación.

Con anterioridad a estas observaciones, Pedro Blendinger y Miguel Nellar me habían comentado haber visto a esta especie en algunas localidades del norte de la provincia. Serían éstos los primeros registros del vencejo de collar para San Luis.

Bibliografía

- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornít. del Plata. B. Aires.
OLROG, C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27. Tucumán.