

águila negra (*Buteogallus urubitinga*) volando sobre el río Paraná de las Palmas y los ambientes arbolados circundantes (seibales, sauzales, etc.) al este de la localidad de Lima, partido de Zárate, prov. de Buenos Aires.

En vuelo, es notable la cola blanca con banda subterminal negra. El aleteo lento y poderoso, mostrando alas anchas y cuerpo completamente negros, junto a su gran tamaño, la diferencia de otras especies similares de la región.

Son escasas las menciones bibliográficas de esta especie en la provincia de Buenos Aires. Ha sido citada para las siguientes localidades: "Buenos Aires" (Laffresnaye y D'Orbigny 1837); "islas en la boca del río Paraná, cerca de Las Conchas" (actualmente ciudad de Tigre) (Burmeister 1868); Plátanos (Dabbene 1910); Berisso (Narosky 1984); Berazategui (Di Giacomo y Aguilar 1984) y Costanera Sur, Capital Federal (Raúl Chiesa, com. pers.).

El delta bonaerense y la región del Plata serían el límite austral de dispersión de esta especie (Narosky 1978, de la Peña 1985, Narosky y Yzurieta 1987).

Agradecemos al Dr. Jorge Navas y a los Sres. Tito Narosky y Santiago Krapovickas por su desinteresado asesoramiento y colaboración.

Bibliografía

- BURMEISTER, H. 1868. Contribution to the Ornithology of the Argentine Republic and adjacent lands. Part 1, Proc. Zool. Soc. Lond.: 633-636.
- DABBENE, R. 1910. Ornitología argentina. An. Mus. Nac. Hist. Nat. Bs. As. Serie 3, tomo 11: 246. Bs. As.
- DE LA PEÑA, M.R. 1985. Guía de las aves argentinas. Tomo II (Falconiformes). Santa Fe.
- DI GIACOMO, A.G. y H.A. AGUILAR 1984. Águila Negra en Buenos Aires. Nuestras Aves 5: 11. Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.
- LAFFRESNAYE, A. et A. D'ORBIGNY 1837. Magasin de Zoologie Journal 7: 4.
- NAROSKY, T. 1978. Aves argentinas. Guía para el reconocimiento de la avifauna bonaerense. Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.
- NAROSKY, T. 1984. Registros nuevos e infrecuentes de aves argentinas. El Hornero 12 (2): 122-126. Bs. As.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata. Bs. As.

*Aráoz 2050 - 6º B
(1425) Buenos Aires



ABUNDANCIA Y DENSIDAD RELATIVA DE RAPACES (ACCIPITRIDAE Y FALCONIDAE) EN CORRIENTES

Julio Rafael Contreras*

Desde el mes de julio de 1986 hasta agosto de 1988 se llevaron a cabo numerosos viajes de prospección ornitológica en toda el área de la provincia de Corrientes. Se lograron así 30.600 registros, de los cuales 3.526 correspondieron a rapaces de las familias Accipitridae y Falconidae.

A las 35 especies de rapaces enunciadas para Corrientes en un trabajo previo (Contreras, 1981), se agregaron otras hasta totalizar 40. De ellas, 37 han sido registradas durante las tareas de censo.

En esta nota se tienen en cuenta exclusivamente la abundancia absoluta y relativa de cada una de las especies registradas. Es indudable que los resultados presentan alguna distorsión debido a la heterogeneidad de los métodos de censo, a la observabilidad diferencial de las diversas especies, y a no haberse dado igual representatividad en el muestreo a los

distintos tipos de ambiente prospectado.

Aún así, son comparables con los datos obtenidos por el autor en otras regiones y con aquellos ya obtenidos en la provincia de Corrientes, pudiéndose hacer inferencias acerca de abundancia, el estatus de conservación y las tendencias poblacionales de las especies.

El análisis biogeográfico de los datos se realiza aparte, integrando el *Atlas Ornitogeográfico de la Provincia de Corrientes*, actualmente en su etapa final de ejecución.

| Especie | Observaciones | %del total |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| <i>Rostrhamus sociabilis</i> | 1402 | 38.95 |
| <i>Polyborus chimango</i> | 537 | 14.93 |
| <i>Polyborus plancus</i> | 461 | 12.82 |
| <i>Heterospizias meridionalis</i> | 388 | 10.78 |
| <i>Buteo magnirostris</i> | 291 | 8.09 |
| <i>Falco sparverius</i> | 168 | 4.67 |
| <i>Polyborus chimachima</i> | 88 | 2.45 |
| <i>Busarellus nigricollis</i> | 73 | 2.03 |

| Especie | Observaciones | %del total |
|---------------------------|---------------|------------|
| Circus buffoni | 28 | 0.78 |
| Geranoaetus melanoleucus | 27 | 0.75 |
| Parabuteo unicinctus | 25 | 0.69 |
| Elanus leucurus | 18 | 0.50 |
| Falco femoralis | 15 | 0.42 |
| Buteogallus urubitinga | 10 | 0.28 |
| Chondrohyerax uncinatus | 8 | 0.22 |
| Buteo albicaudatus | 6 | 0.17 |
| Buteo leucorrhous | 6 | 0.17 |
| Accipiter bicolor | 5 | 0.14 |
| Buteo polyosoma | 5 | 0.14 |
| Geranospiza caerulescens | 5 | 0.14 |
| Harpyhaliaetus coronatus | 3 | 0.08 |
| Spizaetus tyrannus | 3 | 0.08 |
| Gampsonyx swainsoni | 3 | 0.08 |
| Micrastur ruficollis | 2 | 0.06 |
| Accipiter striatus | 2 | 0.06 |
| Falco deiroleucus | 2 | 0.06 |
| Harpagus diodon | 2 | 0.06 |
| Micrastur semitorquatus | 2 | 0.06 |
| Herpetotheres cachinans | 2 | 0.06 |
| Circus cinereus | 2 | 0.06 |
| Elanoides forficatus | 1 | 0.02 |
| Buteo nitidus | 1 | 0.02 |
| Ictinia plumbea | 1 | 0.02 |
| Leptodon cayanensis | 1 | 0.02 |
| Buteo swainsoni | 1 | 0.02 |
| Spizaeteryx circumcinctus | 1 | 0.02 |

Otras especies de rapaces previamente reconocidas para la provincia no fueron avistadas en ninguna ocasión mientras duró el período de observaciones que aquí se detalla. Fueron éstas: *Spizaetus ornatus*, *Falco rufigularis*, *Spizastur melanoleucus* y *Accipiter poliogaster*. Tal como se observara en el norte de Corrientes (Contreras, 1988), ocho especies concentran el 94,72% de los registros. Las especies dominantes numéricas son las mismas que en el norte provincial, pero con distinta ubicación en el orden de magnitud, pues *Polyborus chimango* y *Polyborus chimachima* son allá más

abundantes. Las restantes 28 especies representan apenas el 5,28% del total. Curiosamente, también en el este de Formosa, censos similares destacan la dominancia de otras ocho especies totalizando el 94,69% del total de registros (Contreras, inédito).

Bibliografía:

CONTRERAS, J.R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. *Historia Natural*, 2: 21-28.


CONTRERAS, J.R. 1988. Distribución y conservación de las rapaces (Aves: Accipitridae y Falconidae) en el norte de la Provincia de Corrientes. Argentina. p. 36. en *Ornitología: Argentina-paraguay, 1988*, Corrientes.

*CAPRIM, CONICET
Gobierno pcia. de Corrientes
C.C. 145, (3400) Corrientes

Estudio

Piehl

Country Houses



SU CASA
EN EL COUNTRY...

PROYECTOS EXCLUSIVOS
CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

Av. Callao 1062 • 4° Piso "A" • 1023 • Buenos Aires

ATENCIÓN: Lunes, miércoles y viernes • 15 a 18 horas

• Solicitar entrevista: 9 a 12 horas al tel.: 901-8657

