

REGISTROS NOVEDOSOS

PRIMER REGISTRO DE ARAÑERO ESTRIADO (*Setophaga striata*) EN LA PROVINCIA DE SANTA FE, ARGENTINA FIRST RECORD OF BLACKPOLL WARBLER (*Setophaga striata*) IN SANTA FE, ARGENTINA

MARCOS J. ENRIQUE^{1*} & PABLO H. CAPOVILLA^{1,2}

¹eBird Argentina, Santa Fe, Islas Malvinas 205, Pueblo Miguel Torres (2631), Santa Fe, Argentina.

²Museo de Ciencias Naturales del Departamento San Cristóbal, H. Irigoyen y Dr. Gerónimo Lassaga, San Cristóbal (3070), Santa Fe, Argentina.

*jesucjs88@gmail.com

RESUMEN: El Arañero Estriado (*Setophaga striata*) nidifica en Norteamérica, migrando hacia Sudamérica en el invierno boreal. Al presente, la especie cuenta con escasos registros en Argentina. En este trabajo presentamos el primer registro documentado de Arañero Estriado para la provincia de Santa Fe, y un nuevo registro en el país.

PALABRAS CLAVE: Arañero Estriado (*Setophaga striata*), Parulidae, migración, distribución.

ABSTRACT: The Blackpoll Warbler (*Setophaga striata*) breeds in North America, and migrates to South America in the boreal winter. At present, there are few records of the species in Argentina. Here we present the first documented record of Blackpoll Warbler for the province of Santa Fe, and a new record in Argentina.

KEYWORDS: Blackpoll Warbler (*Setophaga striata*), Parulidae, migration, distribution.

El Arañero Estriado (*Setophaga striata*) es un ave Passeriformes de la familia Parulidae que durante la primavera y verano boreal habita en Norteamérica (Alaska, Canadá y el noreste de Estados Unidos), y durante el invierno migra hacia Sudamérica, encontrándose en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia; al este a través de Venezuela, Trinidad y Tobago, las Guayanas y noreste de Brasil (Sick 1993; Paynter 1995; DeLuca 2020). Algunas observaciones sugieren que un pequeño número de individuos también puede pasar el invierno en las costas del sureste de Brasil, el noreste de Argentina, y posiblemente sureste de Paraguay (Paynter 1995; Greg Campbell pers. com.). El Arañero Estriado cuenta con registros esporádicos para unas pocas provincias como Misiones, Corrientes y Buenos Aires (ver detalle en de la Peña 2019). El 29 de mayo del 2020, a las 17.04 h, MJE observó, grabó y fotografió (Fig.1) un juvenil de Arañero Estriado en Pueblo Miguel Torres, provincia de Santa Fe, Argentina (33°31'S, 61°28'O; eBird: Enrique 2020). El individuo, que se encontraba vocalizando y alimentándose en lo alto de un Tilo (*Tilia platyphyllos*) en una zona urbana, tenía algunas plumas negras en su garganta que indicarian que era un macho. Durante los siguientes ocho días, lo observamos en el mismo sitio. Esta observación se realizó cuatro días después del último registro de la especie en el país (Misiones; Ruzak & Moya 2020), y representa el primer registro de Arañero Estriado para la provincia de Santa Fe (Fandiño & Giraudo 2010; de la Peña 2011).

REFERENCIAS

- DE LA PEÑA MR. (2011). Atlas ornitogeográfico de la provincia de Santa Fe, Argentina. Ediciones Biológica. Serie Naturaleza, Conservación y Sociedad, 500.
- DE LA PEÑA MR. (2019). Tomo 12: Emberizidae, Cardinalidae, Parulidae, Icteridae, Fringillidae, Passeridae. En: Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino, Santa Fe, Argentina.
- DELUCA W, HOLBERTON R, HUNT PD & ELIASON BC. (2020). Blackpoll Warbler

(*Setophaga striata*), versión 1.0. En Birds of the World (AF Poole, Editor). Laboratorio de Ornitología de Cornell, Ithaca, New York, USA.

ENRIQUE MJ. (2020). eBird Checklist: <https://ebird.org/checklist/S69815970>. eBird: An online database of bird distribution and abundance [web application]. eBird, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org>. (29/5/2020).

FANDIÑO B & GIRAUDO AR. (2010). Revisión del inventario de aves de la provincia de Santa Fe, Argentina.

PAYNTER RA. (1995). Nearctic passerine migrants in South America. Publication of the Nuttall Ornithological Club, 25: 1-126.

SICK H. (1993). Birds in Brazil: a natural history. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

RUZAK M & MOYA S. (2020). Arañero Estriado (*Setophaga striata*) en la provincia de Misiones, Argentina. Nuestras Aves, 65: 71.



Figura 1: Arañero Estriado (*Setophaga striata*) macho juvenil observado el 29 de mayo de 2020 en Pueblo Miguel Torres, provincia de Santa Fe, Argentina. Fotografía: Enrique MJ.