

# OBSERVACIONES DE CAMPO

*N. de la R.: recomendamos especialmente a los autores tener en cuenta los lineamientos para la presentación de trabajos publicados en el número 19 (agosto 1989), así como enviar tres copias a doble espacio tamaño carta. Por la gran afluencia de trabajos, pasan muchos meses antes de su publicación, por lo que solicitamos paciencia. Muchas gracias.*



## NIDIFICACION DE RAPACES ARGENTINOS (FALCONIFORMES Y STRIGIFORMES)\*

Sergio A. Salvador\*\*

Los datos concretos sobre reproducción de aves rapaces en nuestro país son escasos, o están tratados en forma muy general; encontrándose la información más detallada en Hartert y Venturi (1909), Pereyra (1937, 1938) y de la Peña (1987). Se ha creído de interés ampliar dicha información, con datos obtenidos por el autor en las colecciones del Instituto Miguel Lillo y en las fichas de su colección oológica. Los datos para cada especie se dan de la siguiente forma: a) colector, b) localidad de hallazgo, c) fecha, d) número de huevos o pichones y e) medidas de huevos.

### Especies:

#### *Cathartes aura* - Jote cabeza roja

M. Lillo, Villa Alberdi, Tucumán, Dic. 1907, 2 huevos: 78,8 x 49,8 y 76,9 x 49,8 mm.

#### *Coragyps atratus* - Jote negro

1) S. Shipton, Tucumán, 17 Ago. 1909, 2 huevos. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 29 Ago. 1924, 2 huevos. 3) M. Lillo, Leales, Tucumán, 6 Oct. 1925, 2 huevos. 4) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 13 Ago. 1934, 2 huevos: 72,5 x 50,6 y 73,3 x 47,6 mm. 5) S. Pierotti, San Pedro de Colalao, Tucumán, 21 Ago. 1958, 2 huevos: 72,2 x 50,3 y 71,8 x 50,6 mm.

#### *Heterospizias meridionalis* - Aguilucho colorado

1) S. Shipton, Concepción, Tucumán, 10 Dic. 1909, 1 huevo. 2) P. Girard, Atahona, Tucumán, 18 Nov. 1928, 1 huevo. 3) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 3 Set. 1929, 1 huevo: 58,8 x 49,2 mm. 4) P. Girard, Atahona,

Tucumán, 22 Oct. 1929, 1 huevo: 60,8 x 40,7 mm. 5) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 1 Nov. 1931, 1 huevo.

#### *Buteo magnirostris* - Taguató común

1) S. Shipton, Santa Cruz, Tucumán, 12 Oct. 1909, 2 huevos. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 13 Oct. 1928, 2 huevos. 3) P. Girard, Santa Lucía, Tucumán, 24 Oct. 1929, 1 huevo. 4) P. Girard, Manchalá, Tucumán 27 Set. 1933, 2 huevos. 5) F. Contino, Yuto, Jujuy, 28 Nov. 1964, 2 huevos. 6) F. Contino, Yuto, Jujuy, 7 Nov. 1965, 2 huevos: 49,1 x 37,8 y 48,3 x 37,9 mm.

#### *Buteo albicaudatus* - Aguilucho cabeza negra

1) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 10 Ago. 1932, 2 huevos. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 28 Ago. 1938, 2 huevos.

#### *Geranoaetus melanoleucus* - Aguila negra

1) S. Shipton, Concepción, Tucumán, 7 Ago. 1910, 1 huevo. 2) S. Pierotti, San Pedro de Colalao, Tucumán, 20 Jul. 1958, 1 huevo: 67,4 x 53,4 mm.

#### *Buteogallus urubitinga* - Aguila negra

1) S. Shipton, Itico, Tucumán, 17 Set. 1909, 1 huevo. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 1 Nov. 1927, 1 huevo. 3) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 7 Ene. 1928, 1 huevo. 4) P. Girard, Simoca, Tucumán, 15 Set. 1929, 1 huevo. 5) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 18 Ago. 1931, 1 huevo.



***Elanus leucurus* - Milano blanco**  
P. Girard, Manchalá, Tucumán, 24 Nov. 1930, 3 huevos.

***Polyborus plancus* - Carancho**  
1) S. Shipton, Concepción, Tucumán, 2 Oct. 1909, 1 huevo. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 15 Ago. 1928, 3 huevos: 59,6 x 45,1; 56,7 x 47,7 y 57,8 x 45,8 mm. 3) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 10 Ago. 1931, 3 huevos. 4) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 15 Ago. 1931, 3 huevos. 5) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 10 Oct. 1931, 2 nidos con 3 huevos. 6) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 4 Oct. 1933, 3 huevos.

***Falco sparverius* - Halconcito común**  
M. Lillo, Suncho Corral, Santiago del Estero, 15 Oct. 1908, 2 huevos.

***Otus choliba* - Alicuco común**  
M. Lillo, Leales, Tucumán, 22 Mar. 1922, 4 huevos.

***Bubo virginianus* - Ñacurutú**  
1) P. Girard, Simoca, Tucumán, 5 Jul. 1933, 2 huevos. 2) P. Girard, Manchalá, Tucumán, 27 Set. 1944, 1 pichón. 3) J. Esteban, Monte Lindo, Formosa, 29 Nov. 1944, 1 pichón.

***Pulsatrix perspicillata* - Urucureá grande**  
S. Pierotti, Río del Valle, Salta, 12 Dic. 1955, 1 Pichón.

***Glaucidium brasilianum* - Caburé chico**  
M. Lillo, Tucumán, 17 Nov. 1917, 1 huevo: 26,4 x 20,2 mm.

***Strix rufipes* - Lechuza bataraz**  
A. Kovacs, El Bolsón, Río Negro, 15 Ene. 1962, 1 pichón.

Agradezco a Juana B. de Herrera, Estela Alabarce y María M. Lucero por su colaboración y por permitir al autor trabajar con las colecciones del Instituto Miguel Lillo ■

## BIBLIOGRAFÍA

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Imprenta Lux, Santa Fe.  
HARTERT, E. y S. VENTURI. 1909. Notes sur les oiseaux de la République Argentine. Novit. Zool. 16: 159-267.

PEREYRA, J. A. 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la gobernación de La Pampa. Mem. Jard. Zool. La Plata 7: 197-326.

—. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. La Plata 9: 1-304.

\*Recibida marzo 1990.

\*\* Bv. Sarmiento 698-(5900) Villa María, Córdoba.



## NUEVA LOCALIDAD PARA *LIMNORNIS CURVIROSTRIS* Marcos Babarskas\*

La presencia de la pajonalera pico curvo, *Limnornis curvirostris*, ha sido señalada por diversos autores para localidades del este de nuestro país y en especial de la provincia de Buenos Aires. Al parecer, es factor común de todos los registros, al menos bonaerenses, que los mismos estén restringidos a la ribera o cercanías del Río de la Plata. Tal es el caso de: Sclater y Salvin (1868)-Conchitas-; Durnford (1877)-Belgrano-; Lynch Arribalzaga (1878)-Baradero-; Sclater (1890)-Río Luján-; Ihering e Ihering (1907)-Los Talas; Hartert y Venturi (1909)-Punta Lara y Barracas al Sur-; Hussey (1916)-La Plata-; Pereyra (1923)-San Isidro-; Pereyra (1934)-Escobar-; Pereyra (1937)-Gral. Lavalle-; Pereyra (1938)-Zona Delta-;

Esteban (1951) - Capital Federal, Quilmes y Río Santiago-; Carman, en Narosky *et al.* (1983)-Atalaya-; Earnshaw en Narosky *et al.* (1983)-Gral Lavalle y Magdalena-. También es ribereña la distribución hallada en listas o guías que incluyen la provincia de Buenos Aires.

En la revista El Hornero 6 (1), figura entre las aves ingresadas al Museo Argentino de Ciencias Naturales, un ejemplar presuntamente coleccionado por Daguerre en Rosas, partido de Las Flores, lejos de área ribereña. Los autores de trabajos generales no lo han considerado; además, según Narosky y Di Giacomo (en preparación), dicho ejemplar no ha sido hallado en el MACN.

La localidad de mi hallazgo es Chascomús,