

#### AGRADECIMIENTOS:

A Raúl Carman, Carlos Fernández y Christian Henschke, que acompañaron a los autores durante sus observaciones. A Esteban Bremer por el apoyo prestado en la Estación Biológica de Punta Rasa. A Ricardo Kruszewski por facilitar el kayak citado en la nota. A Santiago Krapovickas, por su aporte en la confección de la misma.

#### BIBLIOGRAFIA

ALTMAN, A. y SWIFT B. 1989. Checklist of the Birds of South America. 2a. edición. St. Mary's Press, Washington.

ESCALANTE, R. 1970. Aves Marinas

del Río de la Plata y Aguas Vecinas del Océano Atlántico. Barreiro y Ramos, Montevideo, 199 pp.

HARRISON, P. 1983. Seabirds, an identification guide. Croom Helm, Kent, 448 pp.

HELLMAYR, C.E. 1929. A contribution to the ornithology of northeastern Brazil. Field Mus. Nat. Hist., Zool. Ser. 12: 235-501.

MURPHY, R. C. 1936. Oceanic Birds of South America. Tomo II. Amer. Mus. Nat. Hist., Nueva York.

NAROSKY, S. 1971. Dos hallazgos interesantes para la avifauna argentina: *Puffinus diomedea* y *Chlidonias niger*. Hornero 11: 129-130.

OLROG, C. C. 1969. *Chlidonias niger* y

*Sterna albifrons*, dos láridos nuevos para la Argentina (Aves, Charadriiformes, Laridae). Neotropica 15: 7-8.

—. 1972. Adiciones a la avifauna argentina. Acta Zool. Lilloana 26: 257-264.

PETERS, J. L. 1934. Check-List of Birds of the World. Vol. II. Harvard University Press, Cambridge.

\* Recibida marzo 1991.

\*\* Hipólito Yrigoyen 4200, (1824) Lanús, Buenos Aires.

\*\*\* Las Heras 1035, (1638) Vicente López, Buenos Aires.



## Presencia de *Sporophila palustris* en Buenos Aires\*

Por Alejandro G. Di Giacomo\*\*,  
Marcos Babarskas\*\*\* y Fernando Filiberto\*\*\*\*

El capuchino pecho blanco (*Sporophila palustris*) es una especie escasa y con una distribución local, restringida según Olrog (1979) a Paraguay, sur de Brasil, Uruguay y la Argentina, donde habita en Entre Ríos; se la ha citado también para Corrientes (Narosky 1983) y Chaco (Salbene 1985).

Al recopilar información para el Manual de la Avifauna Bonaerense, T. Narosky y A. Di Giacomo (en prep.) obtuvieron datos sobre la presencia de esta especie en la reserva Costanera Sur, Capital Federal. Un macho fue visto por Elsa Stein, el 29 de enero de 1986; y otro (probablemente el mismo), por Hernán Fernández, desde el 12 al 14 de marzo del mismo año.

Incluimos en esta nota dos observaciones recientes de *S. palustris* en la localidad de Ing. Rómulo Otamendi (34° 13' S- 58° 54' W), partido de Campana, provincia de Buenos Aires.

La zona de hallazgo se caracteriza por la presencia de extensos bañados, con abundante vegetación palustre como juncuales (*Scirpus californicus*), espadañales (*Zizaniopsis bonariensis*), pajonales de cortadera (*Cortaderia selloana*) y de paja brava

(*Scirpus giganteus*).

M. Babarskas y F. Filiberto, el 10 de marzo de 1990, hallaron un macho en unas gramíneas altas con suelo inundado. Lo vieron bañarse en un charco del camino.

A. Di Giacomo, el 19 de noviembre de 1990, observó también un macho, con un comportamiento más bien territorial. Se posaba en el extremo de juncos o arbustos, donde permanecía largo rato emitiendo un agudo ti-i...ti-i. No se alejaba del lugar y en un determinado momento persiguió a una hembra de *Sporophila* supuestamente de su misma especie.

Estos serían los primeros registros conocidos para Buenos Aires. Pese a que es capturado para enjaular y podrían verse ejemplares escapados, creemos que este capuchino llegaría en época estival, en forma esporádica o en número muy reducido, al norte bonaerense. Al respecto, Pereyra (1938), al incluirlo en su trabajo sobre las aves ribereñas, dice: "...es fácil que pueda encontrarse dentro de la región en el norte del Delta, pareciendo ser una especie propia de esos lugares".

Los autores agradecen a Elsa Stein y a

Hernán Fernández, que gentilmente permitieron la inclusión de sus observaciones en esta nota, y a Tito Narosky la lectura crítica de la misma.

#### BIBLIOGRAFIA

NAROSKY, S. 1983. Registros nuevos o infrecuentes de aves argentinas. Hornero 12: 122-126.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.

PEREYRA, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la Provincia de Buenos Aires. Mem. Jard. Zool. La Plata 9: 1-304.

SAIBENE, C. 1985. Registros nuevos para el Chaco. Nuestras Aves 7: 6.

\* Recibida febrero de 1991.

\*\* Suipacha 1111 (1650). San Martín. Buenos Aires

\*\*\* Onsari 1330 (1875). Wilde. Buenos Aires.

\*\*\*\* Machado 2506 (1712). Castelar. Buenos Aires.