

REGISTROS DE ESPECIES, NUEVAS, RARAS O POCO CONOCIDAS PARA LA RESERVA DE USO MÚLTIPLE ISLA MARTÍN GARCÍA, BUENOS AIRES, ARGENTINA

NEW, RARE OR LITTLE-KNOWN RECORDS OF BIRDS FOR THE MARTIN GARCIA MULTIPLE USE RESERVE, BUENOS AIRES, ARGENTINA

Emilse Mérida^{1*}

¹Proyecto Selva de Pino Paraná, Vélez Sarsfield y San Jurjo S/ N, San Pedro (3352), Misiones, Argentina

*emilsemerida@hotmail.com

RESUMEN: Presento y detallo registros de siete especies de aves nuevas o poco conocidas para la Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. Estas son: Bandurria Mora, *Theristicus caerulescens*, Carpinterito Barrado, *Picumnus cirratus*, Carpintero Blanco, *Melanerpes candidus*, Carpintero Oliva Manchado, *Dryobates spilogaster*, Dormilona Cara Negra, *Muscisaxicola maclovianus*. Arañero Silbón, *Myiothlypis leocoblephara*, y Pepitero Verdoso, *Saltator similis*.

PALABRAS CLAVE: Avifauna, Martín García, Buenos Aires. Argentina

ABSTRACT: I present detailed records of seven bird species for Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. They are: Plumbeous Ibis, *Theristicus caerulescens*, White-barred Piculet, *Picumnus cirratus*, White Woodpecker, *Melanerpes candidus*, White-Spotted Woodpecker, *Dryobates spilogaster*, Dark-faced Ground-Tyrant, *Muscisaxicola maclovianus*, White-rimmed Warbler, *Myiothlypis leocoblephara*, Green-winged Saltator, *Saltator similis*.

KEYWORDS: Avifauna Martín García, Buenos Aires. Argentina

INTRODUCCIÓN

La Isla Martín García, está ubicada en el Río de la Plata, en la confluencia del Río Uruguay, frente al Delta del Paraná; dista 45 km de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina y 3,5 km de la costa uruguaya. Depende políticamente de la provincia de Buenos Aires, como Reserva Natural de Uso Múltiple. El Islote Timoteo Domínguez, en el sector noroeste de Martín García, corresponde a la República Oriental del Uruguay y se unió a la Isla por depósitos aluvionales.

Martín García difiere de las islas del Delta por su

formación rocosa e historia geológica que la hacen una isla continental (Nabel & Pereyra 2002). Contiene ambientes muy variados: dunas interiores o arenales, selvas ribereñas, talaes, lagunas de antiguas canteiras, riberas de playas de río con pajonales y juncales. La zona central, más alta, contiene el centro cívico y las principales edificaciones de la población permanente con zonas de pastizal actualmente en disminución (Lahitte & Hurrell 1994).

Considerando su escasa superficie, algo menos de 180 ha sin contar los terrenos aluvionales agregados, la diversidad de aves de la Isla es llamativa para la

provincia de Buenos Aires. Es considerada un Área Importante para la Conservación de las Aves Argentinas AICA BA 06 (De Francesco 2005), cuya referencia es la Lista de Aves de la Reserva Natural Isla Martín García, provincia de Buenos Aires de Moschione & San Cristóbal (1995) y una actualización (Moschione & Barrios 2000).

MÉTODOS

Entre febrero de 1993 y octubre de 2018 realicé 19 visitas de entre 2 y 8 días de duración a la Isla Martín García en distintas épocas del año. En total, sumé 63 días de observaciones. Cada día recorrí los ambientes representados en la Isla observando las aves con prismáticos, grabando vocalizaciones y, en algunos casos, fotografiando individuos. Realicé 440 horas aproximadas de observación y registré 192 especies de aves en la Isla. Comparé mis datos con los de Moschione & San Cristóbal (1995); Moschione & Barrios (2000), San Cristóbal (1997), y con las listas de registros de eBird (2022) para la Isla Martín García. Presento nueva información sobre 7 especies; 5 de ellas son raras o poco conocidas para la Isla, y detallo registros de 2 especies de aves nuevas (Moschione & San Cristóbal 1995; Moschione y Barrios 2000), que se complementan con otras observaciones interesantes para la Isla Martín García publicadas en Mérida y Bodrati (2020).

RESULTADOS

Bandurria Mora (*Theristicus caerulescens*)

La Bandurria Mora habita Bolivia, Paraguay, centro y noreste de Brasil, Uruguay y Argentina donde se distribuye en Jujuy, Salta, Tucumán, Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba y noreste de Buenos Aires (De la Peña 2020a) En la Provincia de Buenos Aires fue considerada ocasional, en disminución, en áreas palustres del noreste (Narosky & Di Giacomo 1993). El 20 de febrero de 2016, durante una creciente del Río Paraná que anegó en forma prolongada algunas islas cercanas y los bajos aluvionales de Martín García, observé un individuo de Bandurria Mora en el área del Paseo de los Héroes Comunes de Argentina y Uruguay (monumento de las dos banderas, 34°10'S, 58°15'O). Vocalizaba mientras volaba a baja altura con dirección al noroeste. Es el primer registro de la especie para la Isla Martín García (Moschione & Barrios 2000), y con-

firma que su presencia coincidiría con eventos de crecientes en el noreste de Buenos Aires (Bodrati 2001). En el Parque Costero del Sur parece también estar relacionada con periodos de inundaciones (Pagano & Mérida 2009; Pagano et al. 2017). Hay registros de un individuo en la Reserva Ecológica Costanera Sur en 2018 y 2020 en los meses de marzo, junio y diciembre (COA RECS).

Carpinterito Barrado (*Picumnus cirratus*)

El 1 de marzo de 2010 observé dos individuos un macho y una hembra en bosque del camino a Punta La Gata (34°10'S, 58°15'O). Este fue mi primer registro personal para la Isla. Posteriormente registré un macho en el mismo lugar el 24 de octubre de 2014, el 12 de enero de 2017 en Héroes Comunes y el 9 de mayo de 2018 en el Circuito Selva (34°10'S, 58°15'O). El Carpinterito Barrado tiene otros registros para la Isla desde 2015 y el último en febrero de 2021 (eBird 2022). Según mis observaciones es escaso y residente en los bosques y selvas de la Isla. La especie es frecuente y residente en talaes del extremo norte de la provincia (Bodrati et al. 2001a; Bodrati et al. 2005, 2006) y su distribución en la ribera del Plata se ha ampliado hacia el sur, registrándose en Reserva Ribera Norte (Gasparri et al. 2018) y fue registrado en la Reserva Ecológica Costanera Sur desde junio de 2014 (COA RECS).

Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*)

El 23 de octubre de 2014, en el centro de la Isla, cerca del faro (34°11'S, 58°15'O) observé y fotografíé a un individuo de Carpintero Blanco comiendo restos de frutas dejadas por turistas. Posteriormente encontré a la especie en diversos puntos de la isla: el 18 de febrero de 2016 un individuo, el 23 de febrero de 2016 cinco individuos, el 2 de enero de 2017 un individuo, el 8 de mayo de 2018 cinco individuos y el 6 de octubre de 2018 dos individuos. Los observé frecuentemente comiendo naranjas amargas (*Citrus aurantium*) especie exótica asilvestrada, común en la Isla. Según mis observaciones es residente y frecuente en todos los ambientes. Existen además otros registros del Carpintero Blanco en la Isla, el último en febrero del 2021 (eBird 2022). El Carpintero Blanco fue considerado hipotético en Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993). Posteriormente es redescubierta en Zárate y Campana (Landó & Haene 1996). Se expandió hacia el sur a lo largo de los talaes del noreste y de los bosques de ribera hasta las selvas de Punta

Lara en la década de 1990 (Bodrati 2001). Es residente en los talares del partido de Baradero (Mérída & Bodrati 2006) y en Vuelta de Obligado, partido de San Pedro (Bodrati et al. 2006). Actualmente está presente en el Parque Costero del Sur (Pagano & Mérída 2009) y se ha registrado en diciembre de 2014, más al sur, en bosques implantados de la localidad Marisol, Partido de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires (Celsi et al. 2014).

Carpintero Oliva Manchado (*Dryobates spilogaster*)

El Carpintero Oliva Manchado se distribuye en el sudeste de Brasil, este de Paraguay, Uruguay y en Argentina en Misiones, Corrientes y Entre Ríos (De la Peña 2020b). El 24 de octubre de 2014, observé un individuo macho en el comienzo del Circuito Selva de la Isla Martín García. Vocalizaba y se desplazaba a media altura en ramas de un Laurel Criollo (*Ocotea acutifolia*), rodeado de Ligustrina (*Ligustrum sinense*). Flavio Moschione observó el 28 y 29 de enero de 2000 a una pareja alimentando a dos volantones en bosques del Sendero de la Cantera (34°11'S, 58°15'O), registro que incluyó en su informe al Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas (Moschione & Barrios 2000). Estos dos registros del Carpintero Oliva Manchado serían los primeros para la provincia de Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993).

Dormilona Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*)

El 10 de mayo de 2018, fotografié a un individuo moviéndose en el parquizado con parches de agua en la cabecera Sur de la pista de aterrizaje, a escasos metros del Río de la Plata (34°11'S, 58°14'O). Es el primer registro de Dormilona Cara Negra para la Isla (Moschione & Barrios 2000). En la provincia de Buenos Aires es escasa y visitante invernal en áreas rurales, playas y terrenos abiertos (Narosky & Di Giacomo 1993).

Arañero Silbón (*Myiothlypis leocoblephara*)

El 23 de octubre de 2014 encontré un individuo cerca de la laguna de la cantera. Recorría, vocalizando a media altura, en la vegetación enmarañada de enredaderas que cubrían Ceibos (*Erythrina crista-galli*) y renovales de Chal-chal (*Allophylus edulis*), sobre suelo encharcado. Este es el primer registro de la especie para la Isla (Moschione & Barrios 2000). El 2 de enero de 2017 detecté un individuo en el mismo lugar. Además, hay un registro en abril

de 2018 (eBird: 2022). La especie está presente en el Delta del Paraná, en Río Carabelas (Mérída & Bodrati 2004) donde en algo más de una década observé un notable incremento poblacional. En el Arroyo Chaná (34°13'S, 58°29'O) el 18 de marzo de 2017, detecté a un adulto y un juvenil dependiente. Es posible que en los últimos 20 años exista un avance de la especie en el Delta bonaerense y este fenómeno produjera su llegada a la Isla Martín García.

Pepitero Verdoso (*Saltator similis*)

El 16 de enero de 2008 observé un individuo de Pepitero Verdoso en el arenal grande de la Isla (34°10'S, 58°15'O). Dos días después lo oí en el área intangible desde la pista de aterrizaje siendo éstos, cronológicamente, los primeros registros que obtuve para la Isla Martín García (Moschione & Barrios 2000). Posteriormente, el 25 de octubre de 2014 y el



Figura 1: Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) observado el 23 de octubre de 2014 en la Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Mérida E.



Figura 2: Dormilona Cara Negra (*Muscisaxicola maclovianus*). 10 de mayo de 2018. Pista de aterrizaje. Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García, Buenos Aires, Argentina. Fotografía: Mérida E.

22 de febrero de 2016, registré la especie en árboles cercanos a la pista, y el 31 de diciembre de 2016, el 2 de enero de 2017 y el 7 de octubre de 2018 los observe vocalizando en el talar del camino hacia la cabecera sur de la pista y en el camping (34°11'S, 58°14'O). Según mis observaciones es actualmente el Pepitero (*Saltator*) más frecuente en la Isla. Hay registros en eBird desde 2014, el último en agosto de 2019 (eBird 2022). El Pepitero Verdoso, fue considerado accidental para la provincia de Buenos Aires (Narosky & Di Giacomo 1993), pero posteriormente fue encontrado establecido regularmente en sectores de talaes del noreste bonaerense y presuntamente en expansión (Bodrati et al. 2001b; Bodrati et al. 2006; Mérida & Bodrati 2006; Bodrati & Sierra 2008). Su distribución avanzó hacia el sur y ya está presente en el Parque Costero del Sur (Pagano et al. 2017).

AGRADECIMIENTOS

En homenaje a Luis G. Pagano que me honró con su firme y generosa amistad. Agradezco a Flavio Moschione por comentar y aclararme su registro del Carpintero Oliva Manchado (*Dryobates spilogaster*) en su informe. A Alejandro Bodrati por su asesoramiento y permanente estímulo para escribir esta y otras notas. A Silvia Vitale, Carlos Ferrari y Diego Monteleone por sus comentarios. A Raúl Ortega, Ezequiel Núñez Bustos y Mariela Barbalace, que me acompañaron en las recorridas por la Isla. A los revisores por sus comentarios y sugerencias.

REFERENCIAS

- BODRATI A. (2001). Notas sobre aves infrecuentes o poco conocidas para la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 13-17
- BODRATI A, BODRATI G & FERNANDEZ H. (2001A). Notas sobre la avifauna del norte de la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 17-21
- BODRATI A, FERRARI C, BORDON E, NOVOA D & HUERGO RR. (2001B). El Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 41: 29
- BODRATI A, MÉRIDA E & SIERRA E. (2005). Vuelta de Obligado. En A. S. Di Giacomo (ed) Áreas importantes para la conservación de las aves en Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas/Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires
- BODRATI A, MÉRIDA E, BODRATI G & SIERRA E. (2006). Avifauna del talar de Vuelta de Obligado y de sus ambientes contiguos. San Pedro, provincia de Buenos Aires, Argentina. En: MÉRIDA E. Y J. ATHOR (eds) Talaes bonaerenses y su conservación. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara". Buenos Aires
- BODRATI A & SIERRA E. (2008). Nuevos aportes sobre la colonización austral del Pepitero Verdoso (*Saltator similis*) en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, Argentina. *Nuestras Aves*, 53: 29-30
- CELSI CE, MILAT J A & KILDEGAARD. (2014). Hallazgo de un ejemplar de Carpintero Blanco (*Melanerpes candidus*) en libertad, en la costa bonaerense. *Historia Natural*, 4: 89-94
- DE FRANCESCO V. (2005). Reserva Natural de Uso Múltiple Isla Martín García en: DI GIACOMO AS (ed) Áreas Importantes para la conservación de las Aves en la Argentina. Sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad: 42-43. Temas de Naturaleza y Conservación 5. Aves Argentinas / Asociación Ornitológica del Plata. Buenos Aires
- DE LA PEÑA MR. (2020A). Tomo 3: Ciconiidae, Fregatidae, Sulidae, Phalacrocoracidae, Anhingidae, Pelecanidae, Ardeidae, Threskiornithidae en: Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, (Nueva Serie). Santa Fe, Argentina
- DE LA PEÑA MR. (2020B). Tomo 7: Trogonidae, Alcedinidae, Momotidae, Galbulidae, Bucconidae, Ramphastidae, Picidae, Cariamidae, Falconidae, Psittacidae, Thamnophilidae, Melanopareiidae, Conopophacidae, Grallariidae, Rhinocryptidae, Formicariidae en: Aves Argentinas: descripción, comportamiento, reproducción y distribución (actualización). *Comunicaciones del Museo Provincial de Ciencias Naturales "Florentino Ameghino"*, (Nueva Serie). Santa Fe, Argentina
- EBIRD. (2022). An online database of birds distribution and abundance [web application]. eBird, Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, New York. Available: <http://www.ebird.org> (08/09/2022)
- GASPARRI B, DEL RÍO D, EARNSHAW A, HENSCHKE C, BRYANT G, CRISTALDO L, FACCIOLI A, GENTILES J M, GALIANO GUIRAO I, VITALE M, RODRÍGUEZ TOURÓN G & SUÁREZ G. (2018). Lista comentada de las aves del Parque Natural Municipal Ribera Norte, San Isidro, provincia de Buenos Aires, Argentina. *Nótulas Faunísticas*, 234:1-43
- LAHITTE HB & HURRELL JA. (1994). Los árboles de la Isla Martín García. Árboles y arbustos arborecentes (nativos y naturalizados) de la reserva Natural y Cultural Isla Martín García. Comisión de Inves-

- tigaciones Científicas (CIC) Provincia de Buenos Aires
- LANDÓ R & HAENE E. (1996). Carpintero Blanco (*Me-lanerpes candidus*) en la Provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 35: 34-35
- MÉRIDA E & BODRATI A. (2004). Nuevos registros de Arañero Silbón (*Basileuterus leucoblepharus*) en el Delta, provincia de Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 48: 12-13
- MÉRIDA E & BODRATI A. (2020). Primer registro documentado y nuevas localidades del Capuchino Corona Gris (*Sporophila cinnamomea*) en la Provincia de Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires. *Nuestras Aves*, 65:61-62
- MOSCHIONE F & SAN CRISTÓBAL J. (1995). Aves de la Reserva Natural Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Ministerio de Asuntos Agrarios
- MOSCHIONE F & BARRIOS I. (2000). Las aves de la Reserva Natural Isla Martín García, provincia de Buenos Aires, Sistema Provincial de Áreas Protegidas
- NABEL PE & PEREYRA FX. (2002). El paisaje natural, bajo las calles de Buenos Aires. Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Buenos Aires
- NAROSKY T & DI GIACOMO AG. (1993). Las aves de la provincia de Buenos Aires: distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Ed. Vázquez Mazzini & Literature of Latin America, Buenos Aires
- PAGANO LG & MÉRIDA E. (2009). Aves del Parque Costero del Sur. Pp.200-244 en: ATHOR J. (ed) Parque Costero del Sur: Magdalena y Punta Indio. Fundación de Historia Natural "Félix de Azara", Buenos Aires
- PAGANO LG, ORNSTEIN U, DI SALLO FG & OSCAR D E. (2017). Adiciones y comentarios sobre las aves del Parque Costero del Sur, Buenos Aires, Argentina. *Nuestras Aves*, 62:17-23
- SAN CRISTÓBAL J. (1997). Catálogo de las Aves de la Isla Martín García (Buenos Aires. Argentina). En Lahitte HB & Hurrell J. (1997). Programa Estructura y Dinámica y Ecología del No Equilibrio. Comisión de Investigaciones Científicas. Provincia de Buenos Aires