

# El Macuquito (*Lochmias nematura*) en Isla Martín García, Buenos Aires

Flavio N. Moschione

Lisboa 863 - 1923, Berisso, Buenos Aires

El 18 nov 1991, observé un Macuquito *Lochmias nematura* en proximidades de "la playita", frente al Canal del Infierno, en isla Martín García. El individuo caminaba nerviosamente y revisaba en el suelo húmedo y barroso de las cárcavas costeras parcialmente cubierto por césped ribereño, a orilla de matorrales y selva ribereños donde finalmente se ocultaría. La especie en la Argentina presenta dos subespecies (Olrog 1979): *L.n. obscurata* se distribuye en las provincias de Jujuy y Salta; *L.n. nematura* habita Misiones, encontrándose también citada para el norte de Corrientes (Vaurie 1980, Contreras 1987) y este de Entre Ríos (Freiberg 1943), si bien para estas dos provincias no se mencionan registros concretos. En Uruguay es un residente bastante común en las orillas de pequeños arroyos y ríos con montes (Goire y Gepp 1978, Cuello 1985). Este hecho, y dada la escasa distancia que separa la isla de la costa uruguaya (unos 3 km) explicaría su presencia en el lugar, como es el caso también de otras especies de aves y vegetales superiores recientemente citados para la provincia de Buenos Aires en Martín García (Moschione y San Cristóbal 1991, Moschione 1991).

## BIBLIOGRAFIA

- CONTRERAS, J.R. 1987. Lista preliminar de la avifauna correntina. II. Passeriformes. Hist. Nat. 7:61-70.  
CUELLO, J.P. 1985. Lista de Referencia y Bibliografía de las Aves Uruguayas. Ser. Divulg. N°1, Mus. Damaso Larrañaga, Montevideo.  
FREIBERG, M.A. 1943. Enumeración Sistemática de las Aves de Entre Ríos. Mem. Mus. E. Ríos, Zool. 21: 1-110.  
GORE, M. y A. GEPP. 1978. Las Aves del Uruguay. Mosca Hnos. Montevideo.  
OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.  
MOSCHIONE, F. 1991. Hallazgo del Camará Morado *Lantana montevidensis* (Verbenaceae) en Isla Martín García, Buenos Aires. Garganchillo 11: 10-12.  
MOSCHIONE, F. y J. SAN CRISTOBAL. 1991. El Piojito Silbador *Camptostoma obsoletum* en Isla Martín García, Buenos Aires. Garganchillo 11: 8.  
VAURIE, C. 1980. Taxonomy and Geographical Distribution of the Furnariidae (Aves, Passeriformes). Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 166: 1-357.  
Recibida marzo de 1992.

# Observaciones sobre *Carduelis uropygialis* en Neuquén

Jorge O. Veiga

Riglos 1295 - 1424, Capital Federal.

En el noroeste de la provincia de Neuquén, se encuentra la localidad de Copahue, Dpto. de Norquín (37° 49' S-71° 07' W), a 2000 msnm, próximo al límite con Chile. Desde 1980 y hasta 1993 se realizaron observaciones anuales entre diciembre y febrero, del Cabecitanegra Andino (*Carduelis uropygialis*). Casi siempre visto en grupos o pequeñas bandadas de hasta 12 individuos, frecuentando márgenes rocosas de arroyos de deshielo y alimentándose de semillas de una compuesta nativa del género *Haplopappus*. En una oportunidad, el 4 ene 1993, un macho proveía alimento a un subadulto que lo seguía en sus desplazamientos con un continuo batir de alas. Esto indicaría que la especie inicia la nidificación cuando todavía se registran nevadas.

También se observaron en el Valle de Trolope, ubicado a 13 km al norte de Copahue pero a 1500 msnm, siendo la vegetación predominante el ñire (*Nothofagus antarctica*). En ambas localidades y en reiteradas oportunidades se lo encontró junto al Cabecitanegra Austral (*Carduelis barbata*).

B. López Lanús (com. pers.) lo observó el 14 feb 1989 en las laderas del volcán Lanín, Dpto. Huiliches; y J. C. Chebez y S. Heinonen (com. pers.) en la laguna Varvarco Campos, Dpto. Minas, el 10 feb 1993 avistaron un macho alimentando a un subadulto con semillas de *Baccharis* sp., con lo cual la distribución geográfica se ampliaría por la alta cordillera neuquina alcanzando el bosque subantártico.

Deautier (1928) menciona la presencia de *C. uropygialis* para la región noroeste de Argentina sin especificar

localidades o provincias. Pereyra (1945) no la incluye para la provincia. Por su parte Goodall *et al.* (1946) anotan que se extiende en Chile desde Atacama hasta el Bío-Bío, en la laguna de la Laja (60 km al noroeste de Copahue), afirmando que esta especie está sujeta a "continuos desplazamientos locales producto, tal vez, de la abundancia o escasez de semillas y a las condiciones meteorológicas". Roig (1965) la cita para Mendoza durante el verano en la alta cordillera y comenta que probablemente emigre de Chile. Fjeldsa y Krabbe (1990) la mencionan hasta Mendoza.

Se agradece a Marcos Babarskas y Fernando Filiberto por las correcciones y sugerencias brindadas para esta nota.

## BIBLIOGRAFIA

- DEAUTIER, E.A. 1928. Los cabecitanegras de la República Argentina. Hornero 4: 184-187.  
FJELDSA, J. y N. KRABBE. 1990. Birds of the High Andes. Zool. Mus., University of Copenhagen and Apollo Books.  
GOODALL, J.D., A.W. JOHNSON y R.A. PHILIPPI. 1946. Las aves de Chile. Vol. 2. Platt, Buenos Aires.  
PEREYRA, J.A. 1945. Las aves del territorio de Neuquén. An. Mus. Patagonia 1: 61-100.  
ROIG, V.G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. Bol. Est. Geog. 12: 175-222.

Recibida junio de 1992.