

Algunas observaciones en Villa Gesell, Buenos Aires

Héctor E. López Arregui 3119 - 1417, Capital Federal

Predación de *Circus buffoni* sobre *Zenaida*

Entre las presas de *C. buffoni* se mencionan roedores, aves y reptiles. Respecto a su técnica para cazar aves, se dice que obligan a elevarse a las aves que están entre el pasto, para capturarlas con sus garras luego de una corta persecución.

El 21 nov 1986, en el sector norte de la localidad de Villa Gesell, ya descripto por Montaldo (1979), se observó la predación de *C. buffoni* sobre Torcaza (*Zenaida auriculata*). Es frecuente ver a este rapaz sobrevolar la zona boscosa, a una altura de entre 5 y 20 m sobre la copa de los árboles. En dicha fecha se observó a un macho, fase clara, lanzarse sobre un grupo de torcazas posadas en la copa de un pino y capturar una con sus garras. Enseguida se posó en la copa de otro pino cercano y estuvo allí durante unos 20 minutos devorando a su presa. Luego, con la paloma entre sus garras, se alejó en dirección a los médanos situados al norte del pueblo.

En otra oportunidad, el 15 jul 1990 se observó una escena similar, donde un macho, fase clara, atacó a un grupo de torcazas posadas en las ramas de un pino, esta vez sin éxito.

En un estudio realizado por Picozzi (1978) en *Circus cyaneus*, sobre 700 presas halladas en los nidos, se encontraron: 340 jóvenes de *Anthus pratensis*, 259 pichones de *Lagopus lagopus*, 100 roedores y un ejemplar de *Columba palumbus*. El autor opina que *C. cyaneus* es un cazador oportunista. En otro trabajo sobre la misma especie, Hecht (1951) encontró en los nidos restos de patos adultos.

Presencia de *Pachyramphus polychopterus*

El 16 ene 1991, en un bosque de la zona urbana con predominio de pinos, sauce álamo (*Salix alba*), acacias (*Acacia longifolia*) y álamo plateado (*Populus alba*), se halló un macho de Anambé Común (*Pachyramphus polychopterus*).

Localizado gracias a su débil pero típica voz, fue observado regularmente hasta el día 23 de dicho mes. Permanecía en sauces y acacias cazando insectos, en especial una oruga identificada como *Halisdota schausi* (Fam. Arctidae, Orden Lepidópteros), especie que ha sido hallada en diversas plantas arbóreas, tanto nativas como exóticas (Rizzo 1981).

Esta oruga es muy abundante durante enero y es comida por muchas aves, como *Tyrannus melancholicus*, *Parula pitiayumi* y *Thraupis bonariensis*.

Durante la temporada de 1992, se volvió a ver en el mismo lugar un macho de Anambé Común desde el 8 al 17 de enero.

Según Olrog (1979), *P. polychopterus* llega hasta el norte de Buenos Aires, mientras que los mapas de distribución de Narosky e Yzurieta (1987) y Canevari *et al.* (1991) indican como límite austral, aproximadamente, la latitud de Punta Indio. Por lo tanto, estos registros extralimitales ampliarían su distribución, por la costa atlántica, unos 200 km hacia el sur. Se agradece especialmente a Eduardo De Lucca, Alejandro Di Giácomo y Tito Narosky por su colaboración y asesoramiento.

Recibida enero de 1992

BIBLIOGRAFIA

- CANEVARI, M.; P. CANEVARI, G.R. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R.J. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo I y II. Fundación Acindar.
- HECHT, W.R. 1951. Nesting of the Marsh Hawk at Delta, Manitoba. Wilson Bull 63: 167-175.
- MONTALDO, N.H. 1979. Presencia de *Chloris chloris* en la Argentina. Hornero 12: 57-58.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.
- OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- PICOZZI, N. 1978. Dispersion, breeding and prey of the Hen Harrier *Circus cyaneus* in Glen Dye, Kincardineshire. Ibis 120: 498-509.
- RIZZO, H.F. 1981. La gata peluda o gátula (*Halisdota schausi*). Integración, investigación y extensión rural. INTA, Buenos Aires. Nº 24: 77.