

Nuestras Aves 36: 6. 1997.

## NIDIFICACION DEL TUQUITO GRIS (*Empidonomus aurantioatrocristatus*) EN LA PROVINCIA DE RIO NEGRO, ARGENTINA

Cristian Pérez y Pablo Petracci

Patricios 712, (8000) Bahía Blanca, Prov. Buenos Aires, Argentina

El día 20 ene 1995, a 7 km de Chimpay (39° 10' S - 66° 10' W), depto. Avellaneda, Río Negro, hallamos un nido de Tuquito Gris con dos huevos. La zona forma parte de la Provincia Fitogeográfica del Monte (Cabrera, 1971), con estepa arbustiva xerófila como tipo predominante de vegetación, destacándose las especies de los géneros *Larrea* y *Prosopis*.

El nido con forma de taza, se encontraba sobre un chañar (*Geoffroea decorticans*), a unos 3,50 m del suelo. Estaba construido con ramas secas entremezcladas con frutos de compuestas (aquenios con papus completos), e internamente con ramitas y tapizado con plumas e hilo. Medía 12,3 cm de diámetro, 9,3 cm de altura y 7 cm de profundidad. Los huevos eran ovalados de color blanco cremoso con manchitas marrón oscuro concentradas en el polo mayor.

Belenguer y Di Martino (1993) dan como límite sur del área de nidificación de la especie en la provincia de Buenos Aires al Salitral de la Vidriera, a unos 40 km de Bahía Blanca. Nuestro registro permite extender dicha área al menos hasta la provincia de Río Negro. Dada la continuidad del Monte hacia el sur, por el extremo este de las provincias de Río Negro y Chubut, suponemos un área reproductiva aún más austral.

### BIBLIOGRAFIA CITADA

- BELENGUER, C. y S. DI MARTINO. 1993. Nidificación del Tuquito Gris (*Empidonomus aurantioatrocristatus*) en el sur de Buenos Aires. Nuestras Aves 28: 26.  
CABRERA, A. 1971. Fitogeografía de la República Argentina. Bol. Soc. Arg. Bot. 14 (1 y 2): 1-42.

Recibida: diciembre de 1995.

Nuestras Aves 36: 6. 1997.

## PRESENCIA DEL AGUATERO (*Nycticryphes semicollaris*) EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Pablo Reggio y Claudia de la Orden

Administración de Parques Nacionales. Avda. Santa Fe 690 (1059) Buenos Aires, Argentina.

El Aguatero (*Nycticryphes semicollaris*) tiene una distribución en la Argentina que abarca desde el norte hasta la provincia de Chubut hallándosele, además de en la nombrada, en Río Negro, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Córdoba, La Rioja y Mendoza (Steullet y Deautier, 1939) y Neuquén (Navas, 1994).

Según Johnson (1965) nunca se le encuentra en las montañas, habitando ambientes palustres en las tierras bajas (De Schauensee, 1970; Narosky e Yzurieta, 1987). Si bien Olrog (1984) y Canevari *et al.* (1991) mapean esta especie para San Juan, el único antecedente para la provincia es la mención, sin detalles, de Fontana (1908) en su listado sistemático de las aves de Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.

El 24 ene 1995 los autores observaron 2 ejemplares de esta especie en una vega, la Ciénaga de las Cabeceras, a unos 2750 metros de altura. Tal observación se realizó a unos 250 metros del paraje conocido como "Rancho del Cura" de la Reserva Natural Estricta El Leoncito ubicada en el suroeste sanjuanino; en el departamento Calingasta.

Ambos ejemplares permanecieron ocultos entre la vegetación hasta que los observadores se aproximaron a unos 50 metros de distancia, momento en el que volaron pudiéndose apreciar nitidamente el largo pico con su ápice curvo y las notorias pecas blancas que caracterizan a los adultos de la especie. Tras un vuelo corto, realizado a baja altura, volvieron a posarse perdiéndose entre la vegetación de la vega.

Debemos agregar que la especie había sido registrada, en el departamento Jáchal de la provincia que nos ocupa, por William Partridge quien, según las libretas de campo depositadas en la Asociación Ornitológica del Plata, específicamente la número 12, observó tres ejemplares en los bañados del río Jáchal a unos 30 km al sur de la localidad de San José de Jáchal, en noviembre de 1963.

Nuestra observación y la de Partridge serían los primeros registros concretos del Aguatero para la provincia de San Juan.

### AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a Eduardo Haene por las sugerencias bibliográficas y sus consejos para la realización de esta nota.

### BIBLIOGRAFIA CITADA

- CANEVARI, M.; P. CANEVARI; G. R. CARRIZO; G. HARRIS; J. RODRIGUEZ MATA y R.J. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Fund. Acindar. Buenos Aires, 2 tomos.  
DE SCHAUENSEE, R. M. 1970. A guide to the Birds of South America. The Academy of Natural Sciences of Philadelphia. Pennsylvania, 498 pp.  
FONTANA, L.J. 1908. Enumeración sistemática de las Aves de la Región Andina (Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca). Imp. Penitenc. de la Nación. Buenos Aires, 16 pp.  
JOHNSON, A. W. 1965. The Birds of Chile and adjacent regions of Argentina, Bolivia and Peru. Platt Establecimientos Gráficos. Buenos Aires.  
NAROSKY, T y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires, 345 pp.  
NAVAS, J. R. 1994. AVES NUEVAS O POCO COMUNES DE LA PATAGONIA. NEOTROPICA 40 (103-104): 93-94.  
OLROG, C.C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Adm. de Parques Nacionales. Buenos Aires, 352 pp.  
STEULET, A. B. y E. A. DEAUTIER. 1939. Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra Cincuent. Museo de la Plata 1: 493-732.

Recibida: marzo de 1996.

**Nota a los autores: para enviar artículos a Observaciones de Campo se recomienda seguir los lineamientos detallados en El Hornero, tomar como modelo el presente número y adjuntar disco con el trabajo en procesadores de texto de uso corriente (Word, Wordperfect o similares).**