

tribución que incluyen tanto esta especie como *Asthenes modesta* para las serranías bonaerenses, pero éstos no son considerados en esta nota debido a la posibilidad de que se hayan basado en las citas aquí mencionadas.

En nuestro descenso, a unos 900 msnm avistamos a un Halconcito Común (*Falco sparverius*) perdiguendo a un *A. montana*, el que tras detenerse sobre rocas, se ocultó en una grieta.

E. De Lucca (Narosky y Di Giacomo en prep.) observó un ejemplar muy confiado, que se posó en uno de sus pies, en el cerro de la Ventana el 6 jul 1990. Un registro, en cierto modo similar, fue realizado por Juan Zubizarreta (com.pers.) en el mismo cerro el 13 jun 1991.

De esta forma, al igual que con *Asthenes modesta*, serían tres los registros invernales (dos para junio y uno para julio), los que junto a las restantes citas, suponen la probable residencia de *A. montana* en las serranías de Ventania.

***Sicalls lebruni* - Jilguero Austral.**

El único registro bibliográfico para la provincia de Buenos Aires corresponde a Narosky et al (1984), en el

cerro Curamalán en noviembre. E. De Lucca (Narosky y Di Giacomo en prep.) lo halló en verano en el cerro de la Ventana.

El Jilguero Austral no fue avistado en nuestra ascensión. En cambio, unos 15 individuos se alimentaban en un campo arado próximo a la base del cerro junto con unas 50 Dormilonas Cara Negra (*Muscisaxicola macloviana*) El color rojizo de las patas del jilguero, según Narosky et al (1984), no se observó en los ejemplares invernales. Al parecer, esta especie descendería de las serranías en invierno a fin de guarecerse de las bajas temperaturas, y con objeto de alimentarse en los campos cercanos.

Agradecemos al Sr. Kleine por permitirnos el acceso al mencionado cerro, a Eduardo De Lucca y Juan Zubizarreta por la información brindada, y a Tito Narosky por sus generosos consejos para la realización de esta nota ●

BIBLIOGRAFIA

BARROWS, W. B. 1883. Birds of the Lower Uruguay. Bull. Nuttall Orn. Club 8:129-143.

CONTRERAS, J. R. 1979. Una nueva subespecie de Fumariidae, *Tripophaga modesta navasi* (Aves, Passeriformes). Hist.

Nat. 1:13-16. 1980. Fumariidae Argentinos. I. Nuevos datos sobre *Tripophaga modesta navasi* y algunas consideraciones sobre *Tripophaga modesta* en la Argentina. Hist. Nat. 1:49-68.

CORY, C. B. y C. E. HELLMAYR. 1925. Catalogue of birds of the Americas and the adjacent islands. Part 4. Field. Mus. Nat. Hist. Zool. Ser. 13.

KLIMAITS, J. F. y F. N. MOSCHIONE. 1987. Aves de la reserva integral de selva marginal de Punta Lara y sus alrededores. Min. Econ. de la pcia. de B. Aires.

MARELLI, C. A. 1933. Aves observadas en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hornero 5:193-199.

NAROSKY, T. Y A. G. DI GIACOMO. En prep. Avifauna bonaerense.

NAROSKY, S., A. G. DI GIACOMO y B. LOPEZ LANUS. 1990. Notas sobre aves del sur de Buenos Aires. Hornero 13:173-178.

NAROSKY, S., S. SALVADOR y C. SAIBENE. 1984. Especies nuevas o poco citadas para la provincia de Buenos Aires, Argentina: *Asthenes modesta*, *Agriornis montana* y *Sicalis lebruni*. Hornero 12:209-211.

NAVAS, J. R. y N. A. BO. 1987. Notas sobre Fumariidae argentinos (Aves, Passeriformes). Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zool. 14:55-86.

* Recibida enero de 1992.

** Asociación Ornitológica del Plata 25 de Mayo 749, 2º Piso Dpto. 6 Capital Federal.

Presencia del Milano Tijereta (*Elanoides forficatus*) en la provincia de Córdoba*

Por Guillermo D. Sferco* y Jorge L. Baldo**

Durante los días 20 al 22 de noviembre de 1991 se realizó un viaje a la desembocadura del río Segundo (Xanaes) en la laguna Mar Chiquita, a 5 km de la localidad de Miramar, departamento San Justo, provincia de Córdoba.

En ese lugar el río forma un delta con numerosos riachos, bañados y lagunas, donde crece abundante vegetación palustre (Nores e Yzurieta, 1980). Se encuentran también en la zona algunos manchones dispersos de monte perteneciente a la Región del Espinal, con predominio de algarrobos, quebracho blanco, mistol y chañares (Luti et al 1979).

El 21 nov. 1992 fue observado un ejemplar adulto de *Elanoides forficatus* sobrevolando el río a 40-50 metros de altura y aproximadamente a 1 km de su desembocadura, durante varios minutos, mientras volaba próximo a dos ejemplares de *Coragyps atratus*. No se observó ninguna interacción con los jotes, pero posteriormente apareció un Carancho (*Polyborus plancus*), que luego de algunas pasadas intimidatorias terminó por alejar al milano del lugar.

Olrog (1979) cita la especie para las provincias de Salta, Jujuy y Misiones, destacando su aparición ocasional hasta el E de Buenos Aires (San

Clemente del Tuyú). Contreras (1981) lo señala para la provincia de Corrientes y posteriormente (1987) para la provincia de Formosa.

Nuestro registro constituye la primera cita para Córdoba, ya que la especie no se incluye en la lista para esa provincia de Nores et al (1983)●

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos al Dr. M. Nores por el asesoramiento y corrección de la nota y a los biólogos J. Gustavo Haro y María de los A. Bistoni por hacer posible el viaje.

BIBLIOGRAFIA

CONTRERAS, J.R. 1981. Lista preliminar de la avifauna correntina. I. No Passeriformes. Hist. Nat. 2: 21-28.

- 1987. Lista preliminar de la avifauna de la provincia de Formosa, República Argentina. Hist. Nat. 7: 33-52.

LUTI, R., M. SOLIS, F. GALERA, N. FERREYRA, M. BERZAL, M. NORES, M. HERRERA y J. BARRERA. 1979. Geografía Física de la Provincia de Córdoba. VI, Vege-

tación. J. Vázquez, R. Miatello, M. Roqué. Ed. Boldt. Argentina. pp. 297-367.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1980. Aves de ambientes acuáticos de Córdoba y centro de Argentina. Sec. de Estado de Agric. y Ganad. Córdoba.

NORES, M.; D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las Aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cs. Cba. 56: 1-114.

OLROG, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna Argentina. Opera Lilloana. 27: 1-324.

* Recibida enero de 1992

** Cátedra de Zoología II (Vertebrados). Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad Nacional de Córdoba. Avda. Vélez Sársfield 299, (5000) Córdoba.



Cardenilla en la laguna de Los Padres, Buenos Aires*

Por Juan Núñez Chas y Miguel Sorensen**

En la bibliografía reciente (Narosky y Yzurieta 1987, Ridgely y Tudor 1989) se da como límite austral de distribución de la Cardenilla (*Paroaria capitata*) el norte de la provincia de Buenos Aires. Nores (1986) comunica el registro, aparentemente extralimital, de un individuo en Viedma, provincia de Río Negro.

El 24 abr 90, en la Laguna de los Padres, pdo. de Gral. Pueyrredon, a unos 20 km de la ciudad de Mar del Plata, observamos siete individuos de esta especie, tanto adultos como juveniles. En el mismo sitio la observaron M. Fugassa (com. pers.) unos meses antes, y R. Ymbernon el 17 ene 87, criando pichones en la copa

de un sauce criollo (*Salix humboldtiana*). El mismo observador también halló la especie en la estancia La Peregrina, muy cerca de la laguna La Brava, pdo. de Balcarce.

Por último, en la colección del Museo Municipal de Ciencias Naturales Lorenzo Scaglia de Mar del Plata, se encuentra una piel de esta especie (nº PC 176), obtenida el 25 abr 88 en dicha ciudad por J. V. Schactel.

La información de esta nota permitiría confirmar la ampliación de la distribución de la Cardenilla en Buenos Aires.

Agradecemos a R. Castillo (del museo L. Scaglia), a M. Fugassa y a R. Ymbernon sus datos, así como al

Grupo Ornitológico del Sudeste Bonaerense (LARUS) por su colaboración ●

BIBLIOGRAFIA

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata, Buenos Aires.

NORES, M. 1986. Nuevos registros para aves de Argentina. Homero 12: 304-307.

RIDGELY, R. S. y G. TUDOR, 1989. The Birds of South America: I The Oscines Passerines. Univ. of Texas Press, Austin.

* Recibida junio de 1991.

** España 2052 3º B, 7600 Mar del Plata.



Hallazgo extralimital del Burrito Pico Rojo

Neocrex erythrops olivascens *

Por Aníbal R. Camperi **

El Burrito Pico Rojo (Fam. Rallidae) tiene una distribución conocida en la Argentina que abarca las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán y Chaco.

La primera cita para Tucumán corresponde a Lillo (1902), quien la menciona para San Miguel de Tucumán; a ésta se suman las de Wetmore (1926) para Tapia, y de Navas (1991) para Tañá Viejo y Concepción, quien además menciona, por primera vez, una localidad salteña para esta raza: Orán.

Olog (1958) la registra por primera vez para Jujuy, citándola para Yuto y San Salvador de Jujuy. Salvador y Narosky (1987) dan a conocer un registro de observación realizado cerca de Villa Angela, Chaco.

En el Museo Argentino de Ciencias Naturales (MACN) acaba de ingresar un ejemplar de esta subespecie, sin sexo determinado, encontrado muerto por el señor Raúl Chiesa en península de Valdés, Chubut, en noviembre de 1989. Como es poco pro-

bable que se tratara de un ejemplar escapado de cautiverio, ya que el plumaje se halla en perfectas condiciones, el presente registro puede ser considerado extralimital. Al tratarse de una especie poco común y difícil de observar, es posible que pase inadvertida muchas veces, por lo que su área de distribución puede ser mayor que la conocida.

En el MACN existen las siguientes pieles correspondientes a esta raza: JUJUY, Yuto, 1 masculino, 7 feb 1963,