

Bibliografía

- Belton, W. 1984. Birds of Rio Grande do Sul, Brazil. Part I. Rheidae through Furnariidae. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 178:371-631.
- Canevari, M., P. Canevari, G. R. Carrizo, G. Harris, J. Rodríguez Mata y R. J. Straneck. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomo II. Fund. Acindar. Buenos Aires.
- Hayes, F. E., P. A. Sharf, P. A. y H. Loftin. 1991. A Birder's field checklist of the birds of Paraguay. Russ Nat. Hist. Books. Florida, USA.
- Kempff Mercado, N. 1985. Aves de Bolivia. Ed. Gisbert. La Paz.
- Montaldo, N. H. 1995. El Picaflor Garganta Blanca (*Leucochloris albicollis*) en Córdoba. Nuestras Aves 31: 22.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata. Buenos Aires.
- Olrog, C.C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
- Remsen, J. V., Jr. y M. A. Traylor, Jr. 1989. An annotated list of the birds of Bolivia. Buteo Books. Vermilion, South Dakota, USA.
- Ruschi, A. 1980. Beija-flores do estado do Espírito Santo. Ed. Rías. Sao Paulo.
- Sick, H. 1985. Ornitología Brasileira. Uma Introducao. Vol. 1. Edit. Univ. de Brasilia. Brasilia.
- Recibida: setiembre de 1993
- *Cátedra de Botánica; Facultad de Agronomía (UBA); Av. San Martín 4453 1417; Buenos Aires
- **INTA Cerrillos; CC 228; 4403 Cerrillos; Salta.

NOTAS SOBRE LA AVIFAUNA DE SIERRA DE LAS QUIJADAS

Guillermo Gil*, Eduardo Haene* y Juan C. Chebez*

Se dan a conocer observaciones de nueve especies de la avifauna del área de la Sierra de las Quijadas, al noroeste de la Provincia de San Luis, correspondiente a la zona declarada PN en 1991 (aún sin instrumentar). Su comunicación se considera de interés por no contarse con datos precisos de su presencia en la provincia de San Luis (Zotta 1944, Casares 1944, Partridge 1953, Olrog 1979, Ochoa de Masramón 1983, Nores et al. 1983), excepto la reciente revisión realizada por Nellar (1993), en la cual se puntualizan registros para esta región de algunas de las especies tratadas. Las iniciales del observador figuran en cada caso entre paréntesis, correspondiéndose con los autores de la presente nota; las observaciones de octubre de 1991 fueron realizadas junto a Miguel Nellar y las de enero de 1995 junto a Daniel Gómez y Alejandra Carminati.

Anas bahamensis

Pato Gargantilla

Fue observado un individuo (GG y EH) el 3 sep 1990, en una fracción de la laguna Guanacache al N de la Laguna El Porvenir (depto. Belgrano); y 2 ejemplares (EH) el 30 ene 1995, en una laguna temporaria cerca de Hualtarán (depto. Belgrano).

La distribución conocida abarca desde el N hasta Buenos Aires, La Pampa y Mendoza (Olrog 1959, Meyer de Schauensee 1982), y San Luis (Nellar 1993). Roig (1965) la menciona para La Paz (Mendoza), localidad cercana a la de nuestra observación.

Buteo magnirostris

Tagatú Común

Se observó un individuo (GG y EH) el 3 sep 1990, en el límite NE del PN Sierra de las Quijadas, sobre la ruta nacional 147, cerca del paraje La Chañarienta, depto. Ayacucho; en un ambiente de bosque de quebracho blanco (*Aspidosperma quebracho-blanco*) y algarrobos (*Prosopis*). Otro ejemplar fue visto el 8 sep 1990, en El Durazno, depto. Pringles.

La distribución conocida para *Buteo magnirostris saturatus* era desde el N, al O de los ríos Paraguay y Paraná hasta Santa Fé, Córdoba y La Rioja (Olrog 1979; Nores et al. 1983) y el c-NE de San Luis (Nellar 1993); nuestro registro de La Chañarienta extiende su distribución conocida hasta el NE de San Luis. Cabe acotar que la especie fue registrada en la Estancia La Primera (N. Rey y EH), al O de Villa Huidobro (Provincia de Córdoba), muy cerca del límite con la provincia de San Luis (a la altura de Buena Esperanza).

Harpyhaliaetus coronatus

Aguila Coronada

En tres oportunidades se observó un ejemplar en las inmediaciones y dentro del PN Sierra de las Quijadas, depto. Belgrano (GG y EH): a) el 1 sep 1990 en los montes cercanos al río Desaguadero, a la altura de la Estancia El Silencio, en la margen mendocina del río; b) el 3 sep 1990 planeando sobre la laguna Guanacache al N de la Laguna El Porvenir (depto. Belgrano); c) el 6 sep 1990, también pla-

neando, sobre el Potrero de la Aguada. M. Nellar (com. pers.) observó esta especie en 1990 sobre la ruta nacional 147, 40 km al N de la ciudad de San Luis.

La información previa para San Luis es la cita de Ochoa de Masramón (1983) para el Nordeste de la provincia y el mapeo para todo el O sanluisense de Nellar (1993).

Aeronautes andecolus

Vencejo Blanco

Se observaron en varias oportunidades bandadas de este vencejo entre el 1 y el 3 sep 1990 (GG y EH) al SO de la Sierra de las Quijadas, y entre el 3 y el 7 sep 1990, el 16 ago 1992, 11 oct 1992, el 13 jun 1993 y el 18 ene 1995 (EH) en el Potrero de la Aguada, ambas localidades en el PN Sierra de las Quijadas (depto. Belgrano).

Conocido para la zona andina desde Jujuy a Río Negro, y para el área serrana de Córdoba (Dabbene 1917, Nores et al. 1983), salvo las recientes menciones para las Sierras de las Quijadas y las Centrales de San Luis no se conocían citas para la provincia, aunque en los lugares especificados es una especie relativamente común.

Agriornis murina

Gaucho Chico

Entre el 1 y el 3 sep. 1990 fue registrado un ejemplar (GG y EH), cerca de una pequeña "represa", en los Llanos de la porción S del PN Sierra de las Quijadas.

Si bien esta especie migra, luego del verano, desde su área de cría en Patagonia hasta Paraguay, Bolivia y el N argentino (Olrog 1979), sólo se conoce para San Luis la mención de Ochoa de Masramón (1983) y la de Nellar (1993), que lo mapea para toda la provincia.

Muscisaxicola capistrata

Dormilona Canela

Se observó un ejemplar el 2 sep 1990 (GG y EH) en los Llanos del S del PN Sierra de las Quijadas. M. Nellar (com. pers.) halló un ejemplar muerto el 25 ago 1990 en Sierra de las Quijadas.

Se trata de un tiránido fundamentalmente andino, cuya área de cría es el N de Tierra del Fuego y S de Santa Cruz, migrando al N en invierno por la Cordillera de los Andes hasta las provincias de Mendoza, Catamarca, Tucumán, Salta, Jujuy y Bolivia y el S de Perú (Olrog 1959, 1979, Pergolani de Costa 1975, Roig 1965). Existen registros extra-andinos para Córdoba (Pergolani de Costa 1975, Nores et al. 1983), Santa Cruz (Chebez et al. 1988) y San Luis donde sólo es mencionada por Nellar (1993).

Muscisaxicola maculirostris

Dormilona Chica

Fue observada entre el 1 y el 3 sep 1990 (GG y EH), en los

mismos ambientes que *Agriornis murina*.

La especie, de amplia distribución andina en Argentina (Olrog 1979), es considerada de presencia ocasional en Córdoba y San Luis por Nores et al. (1983) y escasa para San Luis por Nellar (1993).

Phrygilus unicolor

Yal Plomizo

Un macho adulto fue observado el 6 sep 1990 (GG) en un cauce temporario (seco) del Potrero de la Aguada (depto. Belgrano). Varios individuos el 31 oct 1991 (JCC) en pastizales de altura, cerca de Intihuasi (depto. Coronel Pringles), Sierras Centrales de San Luis.

La especie cuenta con dos subespecies, *P. u. unicolor* y *P. u. tucumanus*, distribuidas por la Cordillera andina (Olrog 1979), y una tercera extracordillera, *P. u. cyaneus*, hasta ahora reconocida como endémica de las Sierras de Córdoba (Nores et al. 1983). La especie no contaba con citas para San Luis, y posiblemente pueda pertenecer a la misma subespecie de Córdoba, como sucede con otras endémicas de las Sierras de ambas provincias, por ejemplo *Phrygilus plebejus naroskyi* (Nores et al. 1983).

Phrygilus gayi

Comesebo Andino

Fue registrada en repetidas ocasiones entre el 3 y el 7 sep. 1990 (GG y EH) y el 18 y 19 ene 1995 (EH) en la zona del Potrero de la Aguada, Sierra de las Quijadas (depto. Belgrano), donde es una especie relativamente habitual.

Se trata de una especie andino-patagónica, distribuida en la Argentina por la cordillera y la estepa patagónica (Olrog 1979, Narosky & Yzurieta 1987). Registrada en Intihuasi (San Luis) Sierras Centrales (depto. Capital) por Salvador (1990), y es mencionada para la provincia por de la Peña (1989) y Nellar (1993).

Sicalis olivascens

Jilguero Oliváceo

En varias oportunidades se observaron individuos de ambos sexos en el Potrero de la Aguada, entre el 3 y el 7 sep 1990 (GG y EH) y el 18 y 19 ene 1995. El Museo Privado G. E. Hudson, San Luis, de M. Nellar posee dos ejemplares machos adultos (N° 333 y 334) de Sierra de las Quijadas colectados el 8 ago 1987.

La especie era conocida para ambientes de altura (2.000 a 3.000 m snm) desde Jujuy a Mendoza (Olrog 1979). Mencionada para San Luis, sólo para la zona de Quijadas, por Nellar (1993). Los registros sanluisenses resultan de interés por su ubicación extracordillerana y la altura de los hallazgos (600 m snm). Contreras (1980) registró su presencia en la Reserva Provincial Ñacuñán (Mendoza), un área también baja y extracordillerana.

Bibliografía

- Casares, J. 1944. Aves de Estanzuela, San Luis. *Hornero* 8: 379 - 463.
- Chebez, J. C., C. Bertonatti, A. Johnson, S. Heinonen Fortabat & G. Gil. 1988. Notas sobre la distribución de algunas aves santacruceñas. *Aprona, Bol. Cient.*: 14 - 27.
- Contreras, J. R. 1980. Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Nacuñán. *Cuaderno Técnico (IADIZA)* 1-79: 34-47.
- Dabbene, R. 1917. Los vencejos de la República Argentina. *Hornero* 1: 3-8.
- de la Peña, M. 1989. Guía de aves argentinas. Tomo 6. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Meyer de Schauensee R. 1982. A guide to the birds of South America, 498 págs.
- Narosky, T. & D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- Nellar, M. M. 1993. Aves de la Provincia de San Luis. Lista y Distribución. *Mus. Priv. Cienc. Nat. e Invest. Ornitol.* "Guillermo E. Hudson", 98 págs. San Luis.
- Nores, M.; D. Yzurieta & R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)* 56 (1-2): III - VII + 1 - 102.
- Ochoa de Masramón, D. 1983. Lista de aves del Nordeste de San Luis, *Hornero*, N° Extraordinario, Actas del I Congreso Iberoamericano de Ornitología, 1979: 77 - 87.
- Olrog, C. C. 1959. Las aves argentinas, una guía de campo. *Inst. M. Lillo*, 343 págs. Tucumán.
- 1963. Lista y distribución de las aves de Argentina. *Opera Lill.* 9: 1 - 377.
- 1979. Nueva Lista de la avifauna argentina. *Opera Lill.* 27: 1 - 324.
- Partridge, W. 1953. Observaciones sobre aves de Córdoba y San Luis. *Hornero* 10: 23 - 73.
- Pergolani de Costa, M. J. I. 1975. Los Muscisaxicola argentinos. *Hornero* 2: 242 - 254.
- Roig, V. G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. *Bol. Estudios Geográficos* 12 (49). Mendoza.
- Salvador, S. A. 1990. Datos de peso de aves argentinas. 2. *Hornero* 13: 169-171.
- Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Tirada aparte, *Mus. Arg. Cienc. Nat.*, Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1993

Administración de Parques Nacionales - AOP, 25 de mayo
749 2° 6, (1002) Buenos Aires

UNA NUEVA VISITA AL ESTE DE FORMOSA

Tito Narosky * y Alberto Martelli **

Entre los días 22 y 26 oct 1991, por invitación del matrimonio Hertelendy, visitamos su estancia Clarín, la estancia Aguará de Jacqueline Hertelendy de Zervino, y el riacho Malvinas (ex Inglés) en el nordeste de la provincia de Formosa y a unos 50 km al sur de la localidad de Clorinda, capital del depto. homónimo. Ambos predios suman 25000 hectáreas y se extienden de nordeste a sudeste, teniendo por límite sur el riacho Malvinas y al este el río Paraguay. Los dos campos están constituidos por variados hábitats: campo abierto con palmares; selva en galería sobre los riachos; bañados extensos con pastos de agua y algunos juncuales, totorales y cortadales; pajonales de inundación periódica; "retenciones" con vegetación palustre, y tierras altas con palmares y espartillares.

Entre los días 10 y 14 set 1987, T. Narosky y M. Lozzia habían visitado El Bagual, en el depto. Laishí, en la misma provincia (Narosky y Lozzia 1988). Surge así la posibilidad de comparar ambas listas de observaciones, cuyos resultados generales quedan expuestos en esta nota.

Durante nuestra estadía en Clarín y áreas adyacentes hemos anotado 165 especies (134 en El Bagual), de las cuales 79 fueron no passeriformes y 86 passeriformes. Se ha determinado que 102 especies no citadas en esta nota coinciden en

ambas visitas, que 33 observadas en El Bagual no lo fueron esta vez, y que por el contrario, se anotaron 63 (26 no passeriformes y 37 passeriformes) que no se observaron en El Bagual. Esto da un total, en ambas excursiones, de 197 especies para el este de Formosa. Una de las razones de las diferencias podría ser la mayor amplitud de hábitats abarcados en esta oportunidad, incluyendo áreas de vegetación palustre, creadas por la presencia de "retenciones", con varios años de antigüedad, además del recorrido de un riacho con selva marginal. Otra podría ser la mayor cercanía del río Paraguay y su influencia sobre la humedad y la vegetación, y una tercera, los esperables efectos de la casualidad, dado lo exiguo de la muestra tomada en comparación. Serían deseables nuevos estudios tanto en Laishí como en Clorinda, así como en el cercano Parque Nacional Pilcomayo, para extraer algún tipo de conclusión, respecto a la mayor o menor diversidad de especies de aves, en la zona oriental de Formosa.

Lista de especies observadas en las estancias (Ea.) Clarín y Aguará, y no anotadas en El Bagual:

Nothura maculosa: aunque escasa, fue vista en la Ea. Clarín. *Anhinga anhinga*: unos 40 en un recorrido por el riacho Malvinas. *Butorides striatus*: muy abundante, varias decenas en un recorrido por el riacho Malvinas. *Nycticorax*