

## Bibliografía

- Casares, J. 1944. Aves de Estanzuela, San Luis. *Hornero* 8: 379 - 463.
- Chebez, J. C., C. Bertonatti, A. Johnson, S. Heinonen Fortabat & G. Gil. 1988. Notas sobre la distribución de algunas aves santacruceñas. *Aprona, Bol. Cient.*: 14 - 27.
- Contreras, J. R. 1980. Lista faunística preliminar de los vertebrados de la Reserva Ecológica de Nacuñán. *Cuaderno Técnico (IADIZA)* 1-79: 34-47.
- Dabbene, R. 1917. Los vencejos de la República Argentina. *Hornero* 1: 3-8.
- de la Peña, M. 1989. Guía de aves argentinas. Tomo 6. L.O.L.A. Buenos Aires.
- Meyer de Schauensee R. 1982. A guide to the birds of South America, 498 págs.
- Narosky, T. & D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. *Asoc. Ornitológica del Plata*, Buenos Aires.
- Nellar, M. M. 1993. Aves de la Provincia de San Luis. Lista y Distribución. *Mus. Priv. Cienc. Nat. e Invest. Ornit. "Guillermo E. Hudson"*, 98 págs. San Luis.
- Nores, M.; D. Yzurieta & R. Miatello. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Bol. Acad. Nac. Cienc. (Córdoba)* 56 (1-2): III - VII + 1 - 102.
- Ochoa de Masramón, D. 1983. Lista de aves del Nordeste de San Luis, *Hornero*, N° Extraordinario, *Actas del I Congreso Iberoamericano de Ornitología*, 1979: 77 - 87.
- Olrog, C. C. 1959. Las aves argentinas, una guía de campo. *Inst. M. Lillo*, 343 págs. Tucumán.
- 1963. Lista y distribución de las aves de Argentina. *Opera Lill.* 9: 1 - 377.
- 1979. Nueva Lista de la avifauna argentina. *Opera Lill.* 27: 1 - 324.
- Partridge, W. 1953. Observaciones sobre aves de Córdoba y San Luis. *Hornero* 10: 23 - 73.
- Pergolani de Costa, M. J. I. 1975. Los Muscisaxicola argentinos. *Hornero* 2: 242 - 254.
- Roig, V. G. 1965. Elenco sistemático de los mamíferos y aves de la provincia de Mendoza y notas sobre su distribución geográfica. *Bol. Estudios Geográficos* 12 (49). Mendoza.
- Salvador, S. A. 1990. Datos de peso de aves argentinas. 2. *Hornero* 13: 169-171.
- Zotta, A. 1944. Lista sistemática de las aves argentinas. Tirada aparte, *Mus. Arg. Cienc. Nat.*, Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1993

Administración de Parques Nacionales - AOP, 25 de mayo  
749 2° 6, (1002) Buenos Aires

## UNA NUEVA VISITA AL ESTE DE FORMOSA

Tito Narosky \* y Alberto Martelli \*\*

Entre los días 22 y 26 oct 1991, por invitación del matrimonio Hertelendy, visitamos su estancia Clarín, la estancia Aguará de Jacqueline Hertelendy de Zervino, y el riacho Malvinas (ex Inglés) en el nordeste de la provincia de Formosa y a unos 50 km al sur de la localidad de Clorinda, capital del depto. homónimo. Ambos predios suman 25000 hectáreas y se extienden de nordeste a sudeste, teniendo por límite sur el riacho Malvinas y al este el río Paraguay. Los dos campos están constituidos por variados hábitats: campo abierto con palmares; selva en galería sobre los riachos; bañados extensos con pastos de agua y algunos juncuales, totorales y cortadales; pajonales de inundación periódica; "retenciones" con vegetación palustre, y tierras altas con palmares y espartillares.

Entre los días 10 y 14 set 1987, T. Narosky y M. Lozzia habían visitado El Bagual, en el depto. Laishí, en la misma provincia (Narosky y Lozzia 1988). Surge así la posibilidad de comparar ambas listas de observaciones, cuyos resultados generales quedan expuestos en esta nota.

Durante nuestra estadía en Clarín y áreas adyacentes hemos anotado 165 especies (134 en El Bagual), de las cuales 79 fueron no passeriformes y 86 passeriformes. Se ha determinado que 102 especies no citadas en esta nota coinciden en

ambas visitas, que 33 observadas en El Bagual no lo fueron esta vez, y que por el contrario, se anotaron 63 (26 no passeriformes y 37 passeriformes) que no se observaron en El Bagual. Esto da un total, en ambas excursiones, de 197 especies para el este de Formosa. Una de las razones de las diferencias podría ser la mayor amplitud de hábitats abarcados en esta oportunidad, incluyendo áreas de vegetación palustre, creadas por la presencia de "retenciones", con varios años de antigüedad, además del recorrido de un riacho con selva marginal. Otra podría ser la mayor cercanía del río Paraguay y su influencia sobre la humedad y la vegetación, y una tercera, los esperables efectos de la casualidad, dado lo exiguo de la muestra tomada en comparación. Serían deseables nuevos estudios tanto en Laishí como en Clorinda, así como en el cercano Parque Nacional Pilcomayo, para extraer algún tipo de conclusión, respecto a la mayor o menor diversidad de especies de aves, en la zona oriental de Formosa.

Lista de especies observadas en las estancias (Ea.) Clarín y Aguará, y no anotadas en El Bagual:

*Nothura maculosa*: aunque escasa, fue vista en la Ea. Clarín. *Anhinga anhinga*: unos 40 en un recorrido por el riacho Malvinas. *Butorides striatus*: muy abundante, varias decenas en un recorrido por el riacho Malvinas. *Nycticorax*



*nycticorax*: abundante en la Ea. Clarín. *Phimosus infuscatus*: un grupo en área anegada en la Ea. Clarín. *Chauna torquata*: común en la Ea. Clarín. *Dendrocygna autumnalis* y *D. viduata*: en la Ea. Aguará, en una "retención", un par de bandadas mixtas. *Cairina moschata*: vimos dos en la Ea. Aguará y tres "patos bragados" en la recorrida en lancha por el riacho Malvinas. *Cathartes aura*: aunque más bien escaso en relación a *C. burrovianus*, se vieron algunos en la Ea. Clarín. *Ictinia plumbea*: algunos ejemplares en lo alto de árboles secos de la selva. *Circus buffoni*: común tanto en fase clara como oscura. *Buteogallus urubitinga*: cinco ejemplares en ambientes palustres de la Ea. Clarín. *Heterospizias meridionalis*: si bien esta especie ya había sido citada en la nota anterior, cerca de la ruta nacional 11, se halló un nido. El mismo contenía un pichón de 10 a 15 días. Era una pobre construcción de palitos, de entre 3 y 8 mm, aunque la mayoría de 4 mm, largos, de tono general gris pardusco. En la parte central e inferior los materiales son más suaves y densos. En lo superior una culebra muerta y debajo un panal de avispas en construcción. El arbusto que lo sostiene, ralo, de 2,8 m en sus ramas más altas, estando el nido a 2,3 m del suelo. Diámetro externo 60 cm, altura 25 cm y profundidad 5 cm. *Geranoaetus melanoleucus*: una pareja nidificando en lo alto de un poste de cemento para conducción eléctrica, cerca de la ruta. *Falco sparverius*: sólo una pareja en el casco de la Ea. Clarín. *Gallinago paraguayae*: reiteradamente oída en vuelo nupcial y muchas veces vista en la Ea. Clarín. *Sterna superciliaris*: un ejemplar en el riacho Malvinas. *Columba cayannensis*: sólo un ejemplar en el recorrido en lancha por el riacho Malvinas. Muy bien observada. *Columbina talpacoti*: una pareja en el parque de la Ea. Clarín. *Crotophaga major*: unos 25 ejemplares durante una recorrida en lancha por el riacho Malvinas y unos pocos en la selva en galería de la Ea. Aguará. *Podager nacunda*: sólo observamos un ejemplar en vuelo. *Caprimulgus parvulus*: todas las noches se oía su voz desde el casco de la Ea. Clarín. *Anthracothonax nigricollis*: un sólo ejemplar visto en el casco de la Ea. Clarín, rondando las flores del parque. *Chloroceryle amazona*: 12 ejemplares fueron anotados durante el recorrido por el riacho Malvinas. *Chloroceryle americana*: apenas más común que el anterior en el mismo recorrido. *Picumnus cirratus*: un ejemplar picando rápido y rítmicamente la parte inferior de una rama fina. *Campylorhamphus trochilrostris*: un ejemplar en un monte de la Ea. Aguará. *Certhiaxis cinnamomea*: visto en un bañado. *Phacellodomus ruber*: común en diversas áreas y aún en el casco de la Ea. Clarín. *Anumbius annumbi*: común en el área. *Elaenia spectabilis*: escaso; "fio" similar al de *E. albiceps*. *Fluvicola pica*: común en áreas palustres. *Fluvicola leucocephala*: dos ejemplares en la "retención" de la Ea. Aguará. *Alectrurus risora*: una decena de ejemplares, probablemente todos jóvenes, en la "retención" a lo largo del camino de entrada a la Ea. Aguará. *Satrapa icterophrys*: observado en varias ocasiones. *Casiornis rufa*: visto cuatro veces en ambas estancias. *Myiarchus swainsoni*: más escaso y difícil de separar de *M. tyrannulus*, carece de rufo, voz "mau". *Megarhynchus*

*pitangua*: un ejemplar en lo alto de un árbol bordeando el riacho Malvinas. *Myiodynastes maculatus*: un ejemplar, confiado; *Tyrannus melancholicus*: abundante en el área. *Tyrannus savana*: común. *Pachyrhamphus viridis*: escaso. *Pachyrhamphus polychropterus*: visto. *Pachyrhamphus validus*: construyendo nido en un árbol alto. *Tityra inquisitor*: visto fugazmente en lo alto de la selva del riacho Malvinas. *Tachycineta leucorrhoa*: pocos ejemplares. *Progne chalybea*: escasa, en el casco de la Ea. Clarín. *Alopocheilidon fucata*: un ejemplar. *Hirundo rustica*: escasa. *Donacobius atricapillus*: observado en cuatro ocasiones en pajonales acuáticos del riacho Malvinas. *Anthus sp.*: una cachirla no identificada. *Euphonia chlorotica*: un macho en la Ea. Aguará. *Paroaria capitata*: en distintos lugares y en las costas del riacho Malvinas. *Sporophila caerulescens*: común en la Ea. Clarín. *Sporophila ruficollis*: observado varias veces; hallamos un nido con dos huevos. *Volatinia jacarina*: escaso en la Ea. Aguará. *Zonotrichia capensis*: abundante, nido con tres huevos en una maceta del casco de Ea. Clarín. *Molothrus rufoaxillaris*: visto un joven. *Psarocolius decumanus*: se observaron dos colonias con 7 u 8 nidos en actividad cada una, sobre el riacho Malvinas; además 3 ó 4 individuos en un monte junto al mismo arroyo en la Ea. Aguará. *Gnorimopsar chopi*: varios en la Ea. Aguará. *Pseudoleistes guirahuro*: escaso. se vieron algunos en la "retención" de la Ea. Aguará. *Passer domesticus*: común.

Lista de especies mencionadas para El Bagual por Narosky y Lozzia (1988), y no observadas en Clarín y Aguará:

*Crypturellus undulatus*, *Egretta thula*, *Harpiprion caerulescens*, *Geranoospiza caerulescens*, *Buteo polyosoma*, *Herpetotheres cachinnans*, *Falco rufigularis*, *Aratinga acuticaudata*, *Aratinga leucophthalmus*, *Amazona aestiva*, *Tapera naevia*, *Glaucidium brasilianum*, *Celeus lugubris*, *Campephilus leucopogon*, *Sittasomus griseicapillus*, *Dendrocolaptes platyrostris*, *Synallaxis albescens*, *Cranioleuca pyrrhophia*, *Phacellodomus sibilatrix*, *Coryphistera alaudina*, *Serpophaga subcristata*, *Tolmomyias sulphurescens*, *Hymenops perspicillata*, *Myiarchus ferox*, *Turdus leucomelas*, *Mimus triurus*, *Basileuterus leucoblepharus*, *Thraupis bonariensis*, *Piranga flava*, *Tachyphonus rufus*, *Saltator similis*, *Arremon flavirostris*, *Poospiza cinerea*.

## Agradecimientos

A Laura y Eduardo Hertelendy, cuya generosa hospitalidad e interés conservacionista hicieron más agradable nuestro trabajo.

## Bibliografía

Narosky, T. y L. M. Lozzia. 1988. Aves de la Reserva "El Bagual". *Nuestras Aves* 15: 7-9.

Recibida: junio de 1993

\*Av. H. Yrigoyen 4200; 1824 Lanús, Buenos Aires

\*\*Av. Callao 1834; 1024 Buenos Aires