

El ave, que se pudo observar sólo en vuelo, fue identificada por su coloración negruzca con barrado blanco sobre las alas. En todas las ocasiones voló una sola vez para luego desaparecer, ocultándose entre las matas de *Spartina*.

Esta especie, incluida como Amenazada por Collar *et al.* (1992), cuenta con pocos registros en Buenos Aires, la mayoría de ellos para el E de la provincia, donde además se lo considera Vulnerable (Narosky y Di Giacomo 1993). Esta sería la cita más austral de su distribución.

BIBLIOGRAFIA

Collar, N. J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L. G. Naranjo, T. A. Parker III y D. C. Wege. 1992. Threatened Birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, ICBP.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Bs. As.

Recibida: abril de 1994

¹ Río Negro 763; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

² Quillén 75; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

³ Patricios 712; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

HALLAZGO DEL CARPINTERITO COMÚN EN EL DELTA DEL PARANA, BUENOS AIRES

Anne Blanchard ¹

El Carpinterito Común *Picumnus cirratus* tiene una amplia distribución en América del Sur (Meyer de Schauensee 1970, Short 1975), llegando la raza *pilcomayensis* hasta La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, habitando sabanas, montes y matorrales (Olog 1979). Giraudo *et al.* (1993) lo registran nidificando en Córdoba. Fernández (1991) y Chebez y Haene (1991), citan la especie para la localidad de Ramallo, Buenos Aires. Posteriormente Narosky y Di Giacomo (1993) recopilan la información de Ramallo y agregan la localidad de Vuelta de Obligado.

El 22 ago 1993 pude observar un ej. de Carpinterito Común en el delta bonaerense, más precisamente en el arroyo Pajarito, Sección Primera, pdo. Tigre. La observación fue realizada desde una embarcación pudiéndole tomar dos fotografías.

Este nuevo registro para Buenos Aires, bastante más al S que los conocidos, confirma el ingreso de la especie siguiendo la prolongación de bosques ribereños, apareciendo en este caso en ambientes alterados

BIBLIOGRAFIA

Chebez, J. C. y E. H. Haene. 1991. Un refugio natural de los bosques nativos de tala y los bajos ribereños vecinos de Ramallo, provincia de Buenos Aires (República Argentina). Ad. Parques Nacionales. Inf. Inéd.
Fernández, H. G. 1991. Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 24: 26.
Giraudo, A. R., D. Brunello y G. Broggini. 1993. Nidificación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves 28: 24-25.
Meyer de Schauensee, R. 1970. A Guide to Birds of South América. Acad. Nat. Scien. Philadelphia.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Bs. As.
Olog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.
Short, L. 1975. A Zoogeographic Analysis of the South American Chaco Avifauna. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 154: 163-352.
Recibida: noviembre de 1993

¹ Echeverría 3256, 5º B; 1428 Capital Federal.

NOTA SOBRE LA NIDIFICACION Y LA ALIMENTACION DEL GAVILAN MIXTO *Parabuteo unicinctus* EN BUENOS AIRES

Horacio A. Aguilar¹ y Eduardo A. Kowalinski²

Desde 1982 se vienen haciendo observaciones periódicas del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*), en la localidad de G. E. Hudson, pdo. Berazategui.

Es una especie residente en la zona y más bien escasa, presente en determinados sectores con parches de bosques xeromórficos compuestos principalmente por tala (*Celtis tala*), coronillo (*Scutia buxifolia*), etc., y con arboledas implantadas de eucalipto (*Eucalyptus* sp), arce (*Acer negundo*) y paraíso (*Melia azederachi*).

A menudo se ven ejemplares solitarios o en parejas, y también adultos con uno o dos juveniles. Suele planear describiendo grandes círculos, y posarse en las ramas más exteriores de árboles altos. El 4 mar 1989 observamos 5 individuos, que junto a dos Caranchos (*Polyborus plancus*) volaban en círculos.

Nidificación

Hemos encontrado en la zona 5 nidos activos, cuyos datos básicos son los siguientes.

fecha	arbol sostén	altura	contenido
23 ago 1987	tala	4 m	2 huevos
7 set 1991	tala	5 m	1 huevo
22 set 1991	eucalipto	7 m	3 pichones
28 set 1991	tala	5 m	1 huevo
5 set 1992	tala	4 m	3 huevos

Los nidos fueron ubicados sobre ramas horizontales más bien gruesas, por lo general bifurcadas, y cerca del tronco principal, a una altura promedio de 5 m. Eran plataformas voluminosas, sólidas, de aspecto desprolijo y poco profundas. Construidos con ramas a menudo secas, con o sin espinas, de largo y grosor variable. En el interior sobre ramas más finas coloca material vegetal diverso, por lo general de la misma planta sostén, agregando entonces hojas secas, gajitos con frutos y algunas pajitas.

Las medidas fueron: 35 a 60 cm de diámetro externo (media= 45,6); 17 cm de diámetro interno; 17 a 20 cm de altura (media= 19); y 8 a 10 cm de profundidad (media= 8,8).

Se destaca que todos los nidos se hallaban en cercanías de pequeños arroyos o áreas bajas inundadas.

Los huevos encontrados eran blancos con fondo levemente azulado o verdoso, de forma ovoidal ancha, y de cáscara algo porosa y opaca. En la nidada de 3 huevos, éstos estaban manchados de sangre. Las medidas fueron : 52,1 - 55,5 x 40,9 - 42,1 mm (media= 54,3 x 41,6; N= 7).

Por otra parte el 14 ene 1990 observamos un gavilán adulto entregando alimento a un juvenil.

Los datos sobre la nidificación de *Parabuteo unicinctus* en nuestro país son muy escasos, destacándose los aportes hechos por d'Orbigny (1835/1844), Dabbene (1918), Pereyra (1937 y 1950), y de la Peña (1987).

Diversos autores mencionan su reproducción en Buenos Aires, pero sin brindar detalles (Withington 1888, Pereyra 1938, Klimaitis y Moschione 1987, Anónimo 1987, Aprile y Novas 1988). Al parecer es Dabbene (1918) quien aporta información concreta, al describir un nido con pichones hallado por Rodríguez en Avellaneda. Según G. Damonte (com. pers.) la especie nidificaría también en Ezeiza.