

El ave, que se pudo observar sólo en vuelo, fue identificada por su coloración negruzca con barrado blanco sobre las alas. En todas las ocasiones voló una sola vez para luego desaparecer, ocultándose entre las matas de *Spartina*.

Esta especie, incluida como Amenazada por Collar *et al.* (1992), cuenta con pocos registros en Buenos Aires, la mayoría de ellos para el E de la provincia, donde además se lo considera Vulnerable (Narosky y Di Giacomo 1993). Esta sería la cita más austral de su distribución.

BIBLIOGRAFIA

Collar, N. J., L.P. Gonzaga, N. Krabbe, A. Madroño Nieto, L. G. Naranjo, T. A. Parker III y D. C. Wege. 1992. Threatened Birds of the Americas: The ICBP/IUCN Red Data Book. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, ICBP.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Bs. As.

Recibida: abril de 1994

¹ Río Negro 763; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

² Quillén 75; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

³ Patricios 712; 8000 Bahía Blanca, Buenos Aires

HALLAZGO DEL CARPINTERITO COMÚN EN EL DELTA DEL PARANA, BUENOS AIRES

Anne Blanchard ¹

El Carpinterito Común *Picumnus cirratus* tiene una amplia distribución en América del Sur (Meyer de Schauensee 1970, Short 1975), llegando la raza *pilcomayensis* hasta La Rioja, Santiago del Estero, Santa Fe y Entre Ríos, habitando sabanas, montes y matorrales (Olog 1979). Giraudo *et al.* (1993) lo registran nidificando en Córdoba. Fernández (1991) y Chebez y Haene (1991), citan la especie para la localidad de Ramallo, Buenos Aires. Posteriormente Narosky y Di Giacomo (1993) recopilan la información de Ramallo y agregan la localidad de Vuelta de Obligado.

El 22 ago 1993 pude observar un ej. de Carpinterito Común en el delta bonaerense, más precisamente en el arroyo Pajarito, Sección Primera, pdo. Tigre. La observación fue realizada desde una embarcación pudiéndole tomar dos fotografías.

Este nuevo registro para Buenos Aires, bastante más al S que los conocidos, confirma el ingreso de la especie siguiendo la prolongación de bosques ribereños, apareciendo en este caso en ambientes alterados

BIBLIOGRAFIA

Chebez, J. C. y E. H. Haene. 1991. Un refugio natural de los bosques nativos de tala y los bajos ribereños vecinos de Ramallo, provincia de Buenos Aires (República Argentina). Ad. Parques Nacionales. Inf. Inéd.
Fernández, H. G. 1991. Nuevas aves para la provincia de Buenos Aires. Nuestras Aves 24: 26.
Giraudo, A. R., D. Brunello y G. Broggini. 1993. Nidificación del Carpinterito Común (*Picumnus cirratus*) en la provincia de Córdoba. Nuestras Aves 28: 24-25.
Meyer de Schauensee, R. 1970. A Guide to Birds of South América. Acad. Nat. Scien. Philadelphia.
Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y estatus. Asoc. Orn. del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Bs. As.
Olog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.
Short, L. 1975. A Zoogeographic Analysis of the South American Chaco Avifauna. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 154: 163-352.
Recibida: noviembre de 1993

¹ Echeverría 3256, 5º B; 1428 Capital Federal.

NOTA SOBRE LA NIDIFICACION Y LA ALIMENTACION DEL GAVILAN MIXTO *Parabuteo unicinctus* EN BUENOS AIRES

Horacio A. Aguilar¹ y Eduardo A. Kowalinski²

Desde 1982 se vienen haciendo observaciones periódicas del Gavilán Mixto (*Parabuteo unicinctus*), en la localidad de G. E. Hudson, pdo. Berazategui.

Es una especie residente en la zona y más bien escasa, presente en determinados sectores con parches de bosques xeromórficos compuestos principalmente por tala (*Celtis tala*), coronillo (*Scutia buxifolia*), etc., y con arboledas implantadas de eucalipto (*Eucalyptus* sp), arce (*Acer negundo*) y paraíso (*Melia azederachi*).

A menudo se ven ejemplares solitarios o en parejas, y también adultos con uno o dos juveniles. Suele planear describiendo grandes círculos, y posarse en las ramas más exteriores de árboles altos. El 4 mar 1989 observamos 5 individuos, que junto a dos Carancho (*Polyborus plancus*) volaban en círculos.

Nidificación

Hemos encontrado en la zona 5 nidos activos, cuyos datos básicos son los siguientes.

fecha	arbol sostén	altura	contenido
23 ago 1987	tala	4 m	2 huevos
7 set 1991	tala	5 m	1 huevo
22 set 1991	eucalipto	7 m	3 pichones
28 set 1991	tala	5 m	1 huevo
5 set 1992	tala	4 m	3 huevos

Los nidos fueron ubicados sobre ramas horizontales más bien gruesas, por lo general bifurcadas, y cerca del tronco principal, a una altura promedio de 5 m. Eran plataformas voluminosas, sólidas, de aspecto desprolijo y poco profundas. Construidos con ramas a menudo secas, con o sin espinas, de largo y grosor variable. En el interior sobre ramas más finas coloca material vegetal diverso, por lo general de la misma planta sostén, agregando entonces hojas secas, gajitos con frutos y algunas pajitas.

Las medidas fueron: 35 a 60 cm de diámetro externo (media= 45,6); 17 cm de diámetro interno; 17 a 20 cm de altura (media= 19); y 8 a 10 cm de profundidad (media= 8,8).

Se destaca que todos los nidos se hallaban en cercanías de pequeños arroyos o áreas bajas inundadas.

Los huevos encontrados eran blancos con fondo levemente azulado o verdoso, de forma ovoidal ancha, y de cáscara algo porosa y opaca. En la nidada de 3 huevos, éstos estaban manchados de sangre. Las medidas fueron : 52,1 - 55,5 x 40,9 - 42,1 mm (media= 54,3 x 41,6; N= 7).

Por otra parte el 14 ene 1990 observamos un gavilán adulto entregando alimento a un juvenil.

Los datos sobre la nidificación de *Parabuteo unicinctus* en nuestro país son muy escasos, destacándose los aportes hechos por d'Orbigny (1835/1844), Dabbene (1918), Pereyra (1937 y 1950), y de la Peña (1987).

Diversos autores mencionan su reproducción en Buenos Aires, pero sin brindar detalles (Withington 1888, Pereyra 1938, Klimaitis y Moschione 1987, Anónimo 1987, Aprile y Novas 1988). Al parecer es Dabbene (1918) quien aporta información concreta, al describir un nido con pichones hallado por Rodríguez en Avellaneda. Según G. Damonte (com. pers.) la especie nidificaría también en Ezeiza.

Alimentación

Hemos observado en varias ocasiones los hábitos alimenticios de este gavián.

Los días 26 jun y 21 jul 1990 debajo de un nido, al parecer utilizado durante la temporada anterior, pero aún frecuentado por las aves, se encontraron restos frescos de una Torcaza (*Zenaidura macroura*) y de cuises (*Cavia aperea*).

El 19 ago 1990 observamos como un Gavián Mixto que volaba sobre un lirio (*Iris pseudacorus*), se arrojó en picada, para reaparecer con un cuis entre las garras. Se posó en un seibo (*Erythrina cristagalli*), y comenzó a picotear la presa. Luego de unos minutos se alejó con el roedor hacia un monte de eucaliptos, donde se perdió de vista.

El 9 set 1990 hallamos un ejemplar asentado en el suelo, en campo abierto. Ante nuestra aproximación levantó vuelo con una presa entre las garras, que luego de unos instantes dejó caer. La misma resultó ser un cuis a medio comer.

Nuestras observaciones coinciden con la información aportada por Pereyra (1950), Anónimo (1987) y de la Peña (1987), sobre la captura de palomas y cuises por parte del Gavián Mixto.

Agradecemos a H. Stocky por su colaboración en las tareas de campo, y a A. G. Di Giacomo por la lectura crítica del manuscrito.

BIBLIOGRAFIA

- Anónimo. 1987. Proyectos: Estudio del Gavián Mixto. Aprona, Bol. Cient. 1: 22-23.
- Aprile, G. y P. Novas. 1988. Observaciones sobre *Parabuteo unicinctus*: I. Territorialidad en relación intra y extra específicas. Aprona, Bol. Cient. 9: 23-31.
- Dabbene R. 1918. Nido y pichones de un gavián *Parabuteo unicinctus* (Temminck). Hornero 1: 100-101.
- de la Peña, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Edición del autor, Santa Fe.
- d'Orbigny, A. 1835/1844. Voyage dans l'Amérique Meridionale. Vol. 4 Part. 3: Oiseaux.
- Klimaitis, J. E. y F. N. Moschione. 1987. Aves de la Reserva Integral de Selva Marginal de Punta Lara y sus alrededores. Min. de Economía de la Prov. de Bs. As.
- Pereyra, J. A. 1937. Contribución al estudio y observaciones ornitológicas de la zona norte de la Gobernación de La Pampa. Mem. Jardín Zool. La Plata 7: 197-326.
- Pereyra, J. A. 1938. Aves de la zona ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. Mem. Jardín Zool. La Plata 9: 1-304.
- Pereyra, J. A. 1950. Avifauna Argentina (Contribución a la ornitología). Hornero 9: 178-241.
- Withington, F. 1888. On the Birds of Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentine Republic. With Notes by P. L. Slater. Ibis 1888: 461-473.

Recibida: mayo de 1994

¹ Barzana 1583; 1431 Capital Federal

² Padre Bruzzone 1142; 1882 Ezpeleta, Buenos Aires

DOS OBSERVACIONES DE CAPTURA DE VERTEBRADOS POR PASSERIFORMES

Eduardo H. Haene¹

En marzo de 1993 en el Puesto Abadie-cué, Parque Nacional Río Pilcomayo (provincia de Formosa) observé a dos individuos del Trepador Grande (*Xiphocolaptes major*) en una isleta de monte. Estando posados en un tronco horizontal, antes de emprender vuelo, uno de ellos tomó con su pico un anfibio (un hílido de tamaño mediano), aparentemente muerto, depositado sobre el mismo tronco donde estaba posado. Se asentó a unos 50 m, dejando nuevamente el anfibio sobre el árbol donde se hallaba. Al poco tiempo, lo tomó con el pico cuando pasó volando junto

a él el otro Trepador Castaño, perdiéndose ambos de vista dentro del bosque.

Sólo se conocían tres casos de captura de vertebrados por parte de esta especie: un reptil y un hílido de unos 7 cm, (Hayes y Escobar Argaña 1990), y el anfibio *Eleutherodactylus* (Carrizo 1991).

En feb 1993 en un jardín de Garín (provincia de Buenos Aires), registré un Zorzal Colorado (*Turdus rufiventris*) que picoteaba en el suelo a un ejemplar vivo de *Amphisbaena darwini*, saurio ápodo de vida subterránea, que medía 18 cm de largo. Luego de tomarlo con el pico, lo llevó en vuelo bajo unos 4 m, para depositarlo en el suelo y continuar atacándolo. Al advertir mi presencia, el ave se fue, abandonando su presa,

Si bien el Zorzal Colorado posee una variada dieta, que incluye básicamente frutos e invertebrados (Leiberman 1985), no existen referencias de su preferencia por vertebrados. Por su parte, *A. darwini* ha sido hallado en el contenido estomacal del Taguatú Común (*Buteo magnirostris*) (Zotta 1934)

Se agradecen las sugerencias de A. Bosso y M. Babarskas.

BIBLIOGRAFIA

- Carrizo, G. 1991. Un caso de predación de *Xiphocolaptes major* (Passeriformes, Dendrocolaptidae) sobre un anfibio. Bol. Asoc. Herpet. Arg. 6: 7.
- Hayes, F. E. y J. Escobar Argaña. 1990. Vertebrates in the diet of woodcreepers (Aves: Dendrocolaptidae). Hornero 13: 162-164.
- Leiberman, J. 1985. El Zorzal Colorado. Fauna Argentina 86, 32 pp. Centro Editor de América Latina.
- Zotta, A. 1934. Sobre el contenido estomacal de aves argentinas. Hornero 5: 376-383.

Recibida: noviembre de 1994

¹ AOP, 25 de Mayo 749, 2º 6; 1002 Buenos Aires

NUEVOS REGISTROS DE AVES PARA FORMOSA

Manuel Nores¹, Darío Yzurieta², Sergio A. Salvador³ y Lucio A. Salvador³

Entre los años 1987 y 1990 se realizaron 4 viajes a la provincia de Formosa. Como resultado de los mismos se encontraron 6 especies que no estaban citadas para la provincia y dos de las que sólo se conocía un lugar donde habitaban.

Buteo brachyurus - Aguilucho Cola Corta

Un ejemplar fue registrado en un ambiente chaqueño a 15 km de Las Lomitas, depto. Patiño, el 12 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Misiones (Olrog 1979), y del E de Formosa, Chaco y Corrientes (Contreras 1990).

Cypseloides rothschildi - Vencejo Montañés

Una bandada de unos 15 ejemplares fue observada a 8 km al SE de Las Lomitas, depto. Patiño, el 27 set 1987. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero (Olrog 1979), Catamarca (Nores y Yzurieta 1982), La Rioja (Nores y Salvador 1985) y Córdoba (Miatello et al. 1991).

Cinclodes comechingonus - Remolinera Serrana

Un ejemplar en Posta Km 45 (Bañado La Estrella), depto. Patiño, en dos oportunidades: el 11 jun 1989 y el 17 jul 1990. La especie nidifica en las sierras de Córdoba y de San Luis (Nores y Yzurieta 1981) y parte de la población migra al N en invierno, habiendo sido encontrada en Tucumán y Santiago del Estero (Olrog 1972) y NE de Córdoba (P. Michelutti in litt.).