

Phacellodomus rufifrons - Espinero Frente Rojiza

Fueron observados 4 ejemplares en Laguna Yema, depto. Bermejo, el 17 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca (Olrog 1979).

Todirostrum plumbeiceps - Mosqueta Cabeza Canela

Fueron encontrados ejemplares de la raza *viridiceps* en dos localidades: Laguna Yema, depto. Bermejo, el 17 jun 1987 y en Bruchard, depto. Patiño, el 30 set 1987 (ver también Nores 1992). Conocida de Salta, Jujuy y Misiones (Olrog 1979) y Corrientes (Darrieu 1987).

Colonia colonus - Yetapá Negro

Un ejemplar fue observado en el Riacho Pilagá sobre la ruta nacional 11, depto. Formosa, el 13 jul 1990. Conocida de Misiones (Olrog 1979) y de Corrientes (Contreras 1987).

Tiaris obscura - Espiguero Pardo

Un grupo de 8-10 ejemplares fue observado en el depto. Bermejo (sin precisar localidad) el 12 jun 1989. Conocida de Salta, Jujuy y Tucumán (Olrog 1979) y Santiago del Estero (Nores et al. 1991).

Icterus icterus - Mático

Un ejemplar fue observado a 10 km al S de Fortín Soledad, depto. Patiño, el 27 set 1987; otro a 13 km al E de Pozo del Tigre, depto. Patiño, el 29 set 1987, y otro en Posta Km 45 (Bañado La Estrella), depto. Patiño, el 11 jun 1989. Conocida para la provincia sólo de la zona de Tres Pozos (Hoy 1968, Nores e Yzurieta 1986).

Trabajo realizado con fondos provenientes de National Geographic Society (Grant No. 3253), Humedales para las Américas y CONICOR.

BIBLIOGRAFIA

- Contreras, J. R. 1987. Algunas localidades interesantes para aves argentinas. Not. Faunísticas 6: 1-2.
- Contreras, J. R. 1990. Nuevos datos acerca de la distribución y estatus de conservación de *Buteo brachyurus brachyurus* (Vieillot 1816) en la República Argentina (Accipitridae). Resúmenes del III Encuentro Argentino-Paraguayo de Ornitología. Corrientes.
- Darrieu, C. 1987. Estudios sobre la avifauna de Corrientes. IV. Nuevos registros de aves (Passeriformes: Tyrannidae) y consideraciones sobre su distribución geográfica. Neotrópica 33: 29-35.
- Hoy, G. 1968. *Icterus jamachi paraguayae* (Brodkorb). Un icterido (Aves) nuevo para la fauna argentina. Neotrópica 14: 118.
- Miatello, R., V. Cobos y C. Rosacher. 1991. Algunas especies de aves nuevas o poco conocidas para la provincia de Córdoba, República Argentina. Hist. Nat. 8: 1-5.
- Nores, M. 1992. Bird speciation in subtropical South America in relation to forest expansion and retraction. Auk 109: 345-357.
- y D. Yzurieta. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Hist. Nat. 2: 33-42.
- y -. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte 2. Hist. Nat. 2: 101-104.
- y -. 1986. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte 7. Hist. Nat. 6: 49-52.
- y S. Salvador. 1985. Nuevos registros de aves para La Rioja, Argentina. Hist. Nat. 5: 207-208.
- , D. Yzurieta y S. A. Salvador. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Cba. 59: 157-196.
- Olrog, C. C. 1972. Sobre *Cinclodes comenichingomus* Zotta y Gavio (Aves: Furnariidae). Neotrópica 18: 54-56.
- 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Op. Lilloana 27: 1-324.

Recibida: enero de 1995

¹ CONICET. Centro de Zoología Aplicada. C.C. 122; 5000 Córdoba.

² Costa Canal 420; 5147 Argüello, Córdoba.

³ Bv. Sarmiento 698; 5900 Villa María, Córdoba.

NIDIFICACION DEL BAILARIN AZUL *Chiroxiphia caudata* EN ARGENTINA

Eduardo R. De Lucca ¹

El Balarín Azul (*Chiroxiphia caudata*) habita los estratos medio e inferior de selvas húmedas y capueras en el NE de Argentina, distribuyéndose también en Brasil y Paraguay (Narosky e Yzurieta 1987). La biología reproductiva de la especie es escasamente conocida y en lo que respecta a su nidificación los pocos datos existentes fueron compilados por Fraga y Narosky (1985). Estos autores mencionan que al parecer nidifica en Misiones y N de Corrientes y hacen referencia a los nidos abandonados hallados por Gaii en Misiones, los que según este último autor pertenecían a la especie (Gaii 1952).

El 10 ene 1993, miembros del Grupo de Trabajo Rapaces Argentinas en compañía de Ernesto Krauczuk, mientras recorriamos el lecho del arroyo El Niño, depto. Eldorado, Misiones, en dirección a un nido de Harpía (*Harpia harpyja*) hallamos en la bifurcación de una rama de guabirá (*Campomanesia xanthocarpa*) un nido de Balarín Azul suspendido a 1,44 m sobre el agua y distante 1,15 m de uno de los paredones del cauce (orientación S, 12 m de altura). El nido que al momento del hallazgo contenía dos pichones de plumón verde, era una pequeña taza de textura laxa constituido por palitos cubiertos de musgos. Sus medidas eran: diámetro externo 7 x 10 cm; diámetro interno 6 cm; profundidad 4,5 cm. El nido fue visitado los días 11 y 12, observándose la hembra en las inmediaciones.

Al parecer, este es el primer registro con información concreta que confirma la nidificación de la especie en Argentina.

Se agradece a la Dra. M. Ióppolo por su colaboración en la confección de esta nota y a los miembros del GTRA, que participaron de esta campaña.

BIBLIOGRAFIA

- Fraga, R. y S. Narosky. 1985. Nidificación de las aves argentinas (Formicariidae a Cinclidae). Asoc. Ornit. del Plata, Bs. As.
- Gaii, A. 1952. Diccionario ilustrado de las aves argentinas. Parte I. Mundo Agrario, Ed. Haynes, Bs. As.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata, Bs. As.

Recibida: enero de 1995

¹ Rosales 3180; 1636, La Lucila, Buenos Aires.

Editor del suplemento Observaciones de Campo:

Alejandro Di Giacomo

Revisores: Juan Carlos Chebez, Alejandro Di Giacomo y Eduardo Haene