

géneros *Salix*, *Populus* y *Eucalyptus*, y por pequeños sectores de bosques nativos (sauzales y seibales).

Se agradece la colaboración de F. Galíndez y V. Vignaroli.

#### BIBLIOGRAFIA CITADA

- Hudson, W. H. 1870. Third letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proc. Zool. Soc. London 1870: 158-160.  
 Lynch Arribálzaga, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. El Naturalista Argentino 1: 3-18, 52-58, 75-83, 101-105, 242-248, 330-336.  
 Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 35, 1996

## LA PALOMITA OJO DESNUDO (*METRIOPELIA MORENOI*) EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Eduardo Haene

Administración de Parques Nacionales. Av. Santa Fe 690, (1059) Buenos Aires, Argentina

La Palomita Ojo Desnudo (*Metriopelia morenoi*) tiene una distribución restringida al nordeste argentino, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja (Olrog 1979). La mención para la última de las provincias, parece proceder de la captura de dos ejemplares entre la capital de La Rioja y Chilecito, efectuada por Koslowsky (1895), donde figura como *Gymnopenia erythorax* (en general, sinónimo antiguo de *Metriopelia ceciliae*). La Palomita Ojo Desnudo sería descrita para la ciencia en 1902, siendo Giacomelli (1923) quien asigna los individuos comunicados por Koslowsky a esta especie, al igual que Steullet y Deautier (1939) quienes además comunican la existencia de un ejemplar hembra procedente de Chilecito (La Rioja) sin fecha de captura. Estos registros riojanos, antiguos y pocos precisos, serían la cita más austral conocida de esta especie exclusiva de la Argentina.

Observaciones recientes realizadas en el sudoeste de la provincia de San Juan, permiten extender más de 400 km hacia el sur la distribución conocida. El 13 oct 1995 se observaron dos ejemplares a la mañana, en la entrada a la Quebrada del Arroyo del Medio, 3380 m s.n.m., y otros 6 individuos al mediodía dentro de la misma quebrada, a unos 3520 m s.n.m.. El sitio se encuentra sobre los faldeos occidentales de la Sierra de Tontal (Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza), en el este-centro de la Reserva Natural Estricta El Leoncito, depto. Calingasta, San Juan. El área de observaciones corresponde al piso altitudinal ocupado en esta región por un distrito austral de la Provincia Fitogeográfica de la Puna, con predominio de arbustales de *Lycium*, *Junelia*, *Adesmia*, *Senecio*, *Fabiana densa*, *Baccharis grisebachii*, *Mulinum ecbecharayi*, etc., con coirones (*Stipa*, *Poa*) y vegas con abundancia de yaretas (*Azorella*) y gramíneas. En el lugar son frecuentes la Palomita Cordillerana (*Metriopelia melanoptera*) y la Palomita Dorada (*M. aymara*).

Cabe apuntar que la especie había sido registrada por William Partridge el 6 dic 1963, en el Puesto Guardia Vieja (Cordillera de los Andes), 2880 m s.n.m., sobre la ruta nacional 150, camino al Paso del Agua Negra, al oeste de Las Flores, depto. Iglesia, San Juan, según consta en sus libretas de campo depositadas en la biblioteca de la Asociación Ornitológica del Plata.

Las observaciones de octubre fueron realizadas junto a Alvaro Montañez, Sofia Heinonen Fortabat y Carlos Apochian. Agradezco el estímulo y la colaboración de mis compañeros de viaje, a los ya mencionados deben agregarse Alejandra Carminati, Julieta Bono y Adriana Rízeto.

#### BIBLIOGRAFIA CITADA

- Giacomelli, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. Hornero 3: 66-84.  
 Koslowsky, J. 1895. Faunas locales argentinas II. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito (Provincia de La Rioja - República Argentina) coleccionadas durante los meses de marzo a mayo de 1895. Rev. Mus. La Plata 6: 277-287.  
 Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.  
 Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1939. Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra Cincuent. Mus. La Plata 1: 493-732.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 35-36, 1996

## NUEVOS REGISTROS DEL CHORLITO CENICIENTO (*PLUVIANELLUS SOCIALIS*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Enrique H. Chiurla

Av. Paso 3398, (7600) Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Durante la época de reproducción el Chorlito Ceniciento presenta una distribución restringida al extremo sur de la Argentina y Chile, incluyendo el Estrecho de Magallanes, norte de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, donde nidifica en las riberas de lagos y lagunas poco profundos (Hayman et al. 1986, Narosky y Yzurieta 1987).

En el período post-reproductivo la mayor parte de la población es sedentaria, aunque algunos individuos migran hacia el norte por la costa atlántica (Narosky y Yzurieta 1987). Según un trabajo reciente (Narosky et al. 1993) estos desplazamientos alcanzan a la pro-