

géneros *Salix*, *Populus* y *Eucalyptus*, y por pequeños sectores de bosques nativos (sauzales y seibales).

Se agradece la colaboración de F. Galíndez y V. Vignaroli.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Hudson, W. H. 1870. Third letter on the ornithology of Buenos Ayres. Proc. Zool. Soc. London 1870: 158-160.
 Lynch Arribálzaga, E. 1878. Rápida ojeada sobre la fauna del Baradero. El Naturalista Argentino 1: 3-18, 52-58, 75-83, 101-105, 242-248, 330-336.
 Narosky, T. y A. G. Di Giacomo. 1993. Las Aves de la Provincia de Buenos Aires: Distribución y Estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 35, 1996

LA PALOMITA OJO DESNUDO (*METRIOPELIA MORENOI*) EN LA PROVINCIA DE SAN JUAN, ARGENTINA

Eduardo Haene

Administración de Parques Nacionales. Av. Santa Fe 690, (1059) Buenos Aires, Argentina

La Palomita Ojo Desnudo (*Metriopelia morenoi*) tiene una distribución restringida al nordeste argentino, en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca y La Rioja (Olrog 1979). La mención para la última de las provincias, parece proceder de la captura de dos ejemplares entre la capital de La Rioja y Chilecito, efectuada por Koslowsky (1895), donde figura como *Gymnopenia erythtorax* (en general, sinónimo antiguo de *Metriopelia ceciliae*). La Palomita Ojo Desnudo sería descripta para la ciencia en 1902, siendo Giacomelli (1923) quien asigna los individuos comunicados por Koslowsky a esta especie, al igual que Steullet y Deautier (1939) quienes además comunican la existencia de un ejemplar hembra procedente de Chilecito (La Rioja) sin fecha de captura. Estos registros riojanos, antiguos y pocos precisos, serían la cita más austral conocida de esta especie exclusiva de la Argentina.

Observaciones recientes realizadas en el sudoeste de la provincia de San Juan, permiten extender más de 400 km hacia el sur la distribución conocida. El 13 oct 1995 se observaron dos ejemplares a la mañana, en la entrada a la Quebrada del Arroyo del Medio, 3380 m s.n.m., y otros 6 individuos al mediodía dentro de la misma quebrada, a unos 3520 m s.n.m.. El sitio se encuentra sobre los faldeos occidentales de la Sierra de Tontal (Precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza), en el este-centro de la Reserva Natural Estricta El Leoncito, depto. Calingasta, San Juan. El área de observaciones corresponde al piso altitudinal ocupado en esta región por un distrito austral de la Provincia Fitogeográfica de la Puna, con predominio de arbustales de *Lycium*, *Junelia*, *Adesmia*, *Senecio*, *Fabiana densa*, *Baccharis grisebachii*, *Mulinum echegarayi*, etc., con coirones (*Stipa*, *Poa*) y vegas con abundancia de yaretas (*Azorella*) y gramíneas. En el lugar son frecuentes la Palomita Cordillerana (*Metriopelia melanoptera*) y la Palomita Dorada (*M. aymara*).

Cabe apuntar que la especie había sido registrada por William Partridge el 6 dic 1963, en el Puesto Guardia Vieja (Cordillera de los Andes), 2880 m s.n.m., sobre la ruta nacional 150, camino al Paso del Agua Negra, al oeste de Las Flores, depto. Iglesia, San Juan, según consta en sus libretas de campo depositadas en la biblioteca de la Asociación Ornitológica del Plata.

Las observaciones de octubre fueron realizadas junto a Alvaro Montañez, Sofia Heinonen Fortabat y Carlos Apochian. Agradezco el estímulo y la colaboración de mis compañeros de viaje, a los ya mencionados deben agregarse Alejandra Carminati, Julieta Bono y Adriana Rízeto.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Giacomelli, E. 1923. Catálogo sistemático de las aves útiles y nocivas de la provincia de La Rioja. Hornero 3: 66-84.
 Koslowsky, J. 1895. Faunas locales argentinas II. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito (Provincia de La Rioja - República Argentina) coleccionadas durante los meses de marzo a mayo de 1895. Rev. Mus. La Plata 6: 277-287.
 Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana 27: 1-324.
 Steullet, A. B. y E. A. Deautier. 1939. Catálogo Sistemático de las Aves de la República Argentina. Obra Cincuent. Mus. La Plata 1: 493-732.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 35-36, 1996

NUEVOS REGISTROS DEL CHORLITO CENICIENTO (*PLUVIANELLUS SOCIALIS*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Enrique H. Chiurla

Av. Paso 3398, (7600) Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina

Durante la época de reproducción el Chorlito Ceniciento presenta una distribución restringida al extremo sur de la Argentina y Chile, incluyendo el Estrecho de Magallanes, norte de Tierra del Fuego y sur de Santa Cruz, donde nidifica en las riberas de lagos y lagunas poco profundos (Hayman et al. 1986, Narosky y Yzurieta 1987).

En el período post-reproductivo la mayor parte de la población es sedentaria, aunque algunos individuos migran hacia el norte por la costa atlántica (Narosky y Yzurieta 1987). Según un trabajo reciente (Narosky et al. 1993) estos desplazamientos alcanzan a la pro-

vincia de Buenos Aires, conociéndose cinco observaciones: cuatro de ellas en el extremo sur (partidos de Villarino, Bahía Blanca y Patagones) y la restante en el partido de Mar Chiquita, donde Mariano Martínez (com. pers.) observó un ejemplar juvenil en la albufera de Mar Chiquita. Las fechas de dichos registros corresponden a los meses de mayo, junio y julio. El objetivo de esta nota es dar a conocer tres nuevas observaciones, incluyendo las más septentrionales de individuos adultos.

El 17 jul 1994, en ocasión del octavo recuento de aves acuáticas de Sudamérica, organizado por Humedales para las Américas, IWRV y el Canadian Wildlife Service, se observó en la laguna Las Nutrias (partido de Mar Chiquita), un ejemplar juvenil. Este individuo caminaba en el borde de la misma y giraba sobre sí mismo y escarbando el fango. Sus patas eran de color amarillo. Estaba acompañada por nueve Chorlitos Doble Collar (*Charadrius falklandicus*).

El citado espejo de agua, de poca profundidad, tiene un denso juncal y está rodeado de pastizales naturales (*Distichlis sp.* y *Juncus sp.*). Está situado a 300 m del mar y cercano a médanos. El 7 ago 1994, se observaron en la misma laguna dos ejemplares adultos con notables patas rojas, alimentándose de la misma forma que el caso anterior. Estaban acompañados por diez Chorlitos Doble Collar y ejemplares de Sobrepuesto (*Lessonia rufa*) y Remolinera Común (*Cinclodes fuscus*). Permitieron acercarse a menos de diez metros y ser fotografiados. Prácticamente un mes después, el 4 set, se registraron dos individuos adultos, en el mismo sitio; en esta oportunidad estaban acompañados por más de cincuenta Playeritos Unicolores (*Calidris bairdii*).

Estos registros son los más septentrionales de adultos de *Pluvianellus socialis*, confirman observaciones anteriores sobre su comportamiento y permiten ampliar la época en que se lo puede hallar en la provincia de Buenos Aires, la cual sería de mayo a setiembre.

Agradezco al Lic. Mariano M. Martínez por sus correcciones y comentarios, y a Fernando M. Rodríguez por su colaboración.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Hayman, P. J., Marchant y T. P. Prater. 1986. Shorebirds: an identification guide to the waders of the world. Croom Helm, London.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata., Buenos Aires.
Narosky, T., A. G. Di Giacomo y M. Babarskas. 1993. Presencia invernal del Chorlito Ceniciento (*Pluvianellus socialis*) en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hornero 13: 309-310.

Recibida: octubre de 1995

Nuestras Aves 35: 36, 1996

AVISTAJE DEL PINGÜINO DE VINCHA (*PYGOSCELIS PAPUA*) EN LA PENINSULA VALDES, PROVINCIA DE CHUBUT

Hernán Pastore

Fundación Vida Silvestre Argentina. Defensa 245, 6o piso, (1065) Buenos Aires, Argentina

El 29 nov 1993 se observó un ejemplar de Pingüino de Vincha (*Pygoscelis papua*) en la reserva faunística de Punta Pirámide en la Península Valdés (depto. Viedma, Chubut). El ejemplar adulto descansaba en la costa, sobre una plataforma a 1,5 m de la superficie del mar. Se hallaba solo, aparentemente sano y con no menos de 15 días de arribo a la costa de la reserva (guardafauna Patricio Ledesma, com. pers.). Desde una distancia de 150 m pudo ser observado durante 5 minutos, hasta que se zambulló en el mar donde permaneció nadando en la superficie para luego alejarse. El guardafauna Alejandro Balado (com. pers.) pudo documentar fotográficamente el avistaje.

En la Argentina la especie se distribuye desde el archipiélago antártico hasta los 40° 18' S - 41° 10' W (aproximadamente altura de Trelew, Chubut) y "posiblemente más al norte" durante el invierno, según Olrog (1963 y 1968), aunque no se precisan localidades de referencia. Narosky e Yzurieta (1987) la mapean hasta el norte de Santa Cruz. Durante la época de nidificación se distribuiría en la zona del archipiélago antártico, Islas Georgias, Sandwich, Orcadas y Shetland del Sur, Malvinas y de los Estados, además del sur del océano Índico, llegando accidentalmente hasta Tasmania (Dabbene 1920, Olrog 1963 y 1968, Clark 1986).

Este último autor menciona que individuos solitarios salen a la playa en la Bahía San Sebastián, Tierra del Fuego, y que grupos reducidos frecuentan el estrecho de Le Maire.

El presente avistaje pone de manifiesto el arribo de individuos a áreas extraliminales de Chubut, tal vez de forma subobservada y, por consiguiente, con una frecuencia mayor de la supuesta y registrada. Esto se ve fortalecido también por las observaciones de los guardafaunas mencionados, quienes registraron en el lugar la presencia de otros esfenécidos, como *Aptenodytes patagonica* y *Eudyptes chrysocome*, en condiciones similares.

BIBLIOGRAFIA CITADA

- Dabbene, R. 1920. Los pingüinos de las costas e islas de los mares argentinos. Hornero 2: 1 - 9.
Olrog, C. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Opera Lilloana 9: 1-377.
———. 1968. Las aves sudamericanas. Una guía de campo. Tomo Primero (Pingüinos - Pájaros Carpinteros). Univ. Nac. Tucumán, IML, Tucumán.
Clark, R. 1986. Aves de Tierra de Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. L.O.L.A., Buenos Aires.
Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las Aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata., Buenos Aires.

Recibida: octubre de 1995

EDITOR OBSERVACIONES DE CAMPO: Alejandro G. Di Giacomo. **REVISORES:** Daniel Blanco, Juan Carlos Chebez y Tito Narosky. **COLABORACION:** Horacio A. Aguilar. **CORRECCION:** Marcos Babarskas.