

cuenta esto para confirmar mi hallazgo.

El gaviotín chico común es ocasional para la provincia de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993), sin datos de nidificación. Los registros más australes corresponden al Cabo San Antonio y cercanías, donde es frecuente observarla (Blanco *et al.*, 1988; y observaciones propias). Se trataría del primer registro de nidificación para la provincia, como así también el más austral para la especie.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

BLANCO, D. E., G. D. PUGNALI y H. RODRÍGUEZ GOÑI. 1988 Punta Rasa:

su importancia en la conservación de las aves migratorias. Informe inédito.

DE LA PEÑA, M. R. 1987. Nidos y huevos de aves Argentinas. Edición del Autor. Santa Fe.

MOSCHIONE, F. y J. KLIMAITIS. 1984. Observaciones sobre nidificación asociada de *Charadrius collaris*, *Sterna supercilialis* y *Rynchops nigra* en el Río Uruguay, Entre Ríos Argentina. El Hornero, 12 (3): 197-202.

NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.

Recibida: julio de 1997.

Comunicaciones

Revista Nuestras Aves, 38: 12.

PRIMER REGISTRO DEL CANASTERO PÁLIDO (*Asthenes modesta*) EN EL PARQUE NACIONAL NAHUEL HUAPI, PROVINCIA DE NEUQUÉN, ARGENTINA

Daniel E. Feinstein

Casilla de Correo 984, (8.400) San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro. Correo electrónico: feinstei@bariloche.com.ar

El 25 de febrero de 1997 a primeras horas de la tarde, vimos un ejemplar de *Asthenes modesta* caminando con saltitos entre piedras, sobre la margen izquierda del río Limay, 3 km aguas abajo del paraje Villa Llanquín, Parque Nacional Nahuel Huapi, provincia del Neuquén.

Pudimos observar claramente el estriado debajo de la mancha gular, una delgada franja superciliar, y también las timoneras rufas y negras. Emitía agudos, breves y continuos "pit" (en coincidencia con lo descrito en la bibliografía). Se posó sobre un *Verbascum thapsus* y, al notarse observado, desapareció detrás de unos arbustos.

El canastero pálido se distribuye en la Argentina desde la Puna, en el noroeste del país, hasta el sur de la Patagonia (Olrog, 1979). Sin embargo, la especie no estaba citada para el Parque y Reserva Nacional Nahuel Huapi (Christie *et*

al., 1988; Chehébar y Ramilo, 1989).

Agradezco a Eduardo Ramilo por el aporte de datos; a Mariano Gelain por su estímulo para la redacción de este informe; y a mi esposa Judith por su apoyo, paciencia y manejo.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

CHEHÉBAR, C. y E. RAMILO. 1989. Fauna del Parque Nacional Nahuel Huapi. 38 páginas.

CHRISTIE, M. I., E. RAMILO y M. BETTINELLI. 1988. Las aves de los parques nacionales norpatagónicos y zonas adyacentes. Administración de Parques Nacionales, San Carlos de Bariloche.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

Recibida: mayo 1997.

Revista Nuestras Aves, 38: 12-14.

NOTAS BREVES SOBRE AVES DE LA ARGENTINA Y PAÍSES VECINOS

por Marcos Babarskas y Juan Carlos Chebez
(compilación y comentarios)

En reiteradas oportunidades socios y amigos de la Asociación Ornitológica del Plata han enviado cartas comentando registros interesantes de aves para el cono sur de América, sin responder a la forma clásica de artículos y comunicaciones. A través de esta nueva sección de Nuestras Aves damos a conocer esa información inédita recibida. En general

los datos corresponden a novedades ornitogeográficas, pero también recibimos registros de nidos, datos de comportamiento, y otros aspectos de la vida de las aves.

Nuestra tarea como compiladores será la de seleccionar y comentar lo novedoso de ese material citando desde ya la fuente y confrontándolo con la bibliografía necesaria.

Macá Tobiano (*Podiceps gallardoi*)

El 17 de diciembre de 1993 se encontraron cuatro ejemplares en una pequeña laguna endorreica y muy eutroficada, cercana al río Verde y al Puesto Verano (52°27' S 71°21'W), XII Región, Chile. Se pudieron observar con todo detalle, incluso un ejemplar fue fotografiado a unos 15 m. Estaban acompañados por cerca de 75 ejemplares de macá plateado (*Podiceps occipitalis*).

La proximidad de estas aves al Seno Otway (Chile), podría apoyar la idea de que algunos ejemplares pasan el invierno en la costa del sur chileno, aunque dada la fecha tardía del registro, podría tratarse de un intento de nidificación en la zona (José Manuel Arcos Pros, Enric Badosa Malagelada y Daniel Ventura Pérez, *in litt.*).

Este sería el segundo registro del macá tobiano para Chile, dado que cuenta con una observación de febrero de 1997 que ya fue publicada (Pierre y Davies, 1998), las cuales constituirían las más australes para la especie. Es interesante señalar que Venegas y Jory (1979) ya sospechaban su presencia en la provincia de Magallanes, incluyéndola tentativamente en una guía regional.

Cormorán Real (*Phalacrocorax albiventer*)

En mayo de 1997 en la laguna Puán, partido de Puán, provincia de Buenos Aires, fue registrado un ejemplar muy manso que se alimentaba de pejerreyes (José Lugones, *in litt.*).

El cormorán real es considerado como un ocasional visitante invernal en playas de mar de la provincia de Buenos Aires según Narosky y Di Giacomo (1993), agregando que "Al parecer también alcanzaba aguas interiores (Daguerre, 1922; Pereyra, 1923)". A esto cabe sumar las menciones de Doello Jurado (1917) para el río de la Plata y las de Martínez Achenbach (1957) para Santa Fe.

El registro para la laguna Puán, distante unos 140 km en línea recta al mar argentino, incorpora una nueva cita de las pocas existentes para Buenos Aires, además de confirmar que eventualmente esta especie incursiona en aguas interiores.

Cuervillo de Cañada (*Plegadis chihi*)

Registrado en diciembre de 1993 en las cercanías de Trelew, departamento Rawson, provincia de Chubut (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

Si bien la especie es indicada por Narosky e Yzurieta (1987) para el nordeste de la provincia de Chubut, son escasos los registros del cuervillo de cañada para esa provincia. Olrog (1979) la menciona como "accidentalmente hasta Tierra del Fuego" y Olrog (1984) incluye toda la Patagonia en una amplia zona de migración. Sería el tercer registro para Chubut (Daciuk, 1977; Nores et al., 1983).

Yabirú (*Jabiru mycteria*)

El 3 de enero de 1996 ocho ejemplares fueron observados en el dique Campo Alegre, 38 km al norte de Salta capital, departamento La Caldera, provincia de Salta (Matías Colina Manresa, *in litt.*).

Resulta interesante este registro por indicar su límite occidental en la provincia de Salta, donde ya había sido registrada (Contino, 1980). Es probable que su presencia en el área esté en relación con la existencia del dique mencionado.

Cauquén Colorado (*Chloephaga rubidiceps*)

El 16 de diciembre de 1993 tres ejemplares del cauquén colorado junto a dos cauquenes comunes (*Chloephaga picta*) y 25 cauquenes reales (*Chloephaga poliocephala*) fueron observados cerca de la desembocadura del río San Juan, unos 50 km al sur de Punta Arenas, XII Región, Chile (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

El registro de esta especie, catalogada como "casi amenazada" en el orden mundial (Collar et al., 1992) y "en peligro" en la Argentina (García Fernández et al., 1997) y Chile (Glade, 1993), confirma su presencia en el extremo sur de Chile. Por su parte Vuilleumier (1994) analiza el estatus de la especie considerándola como "en grave peligro de extinción".

Jote Cabeza Negra (*Coragyps atratus*)

El 10 de diciembre de 1993 dos ejemplares remontaban vuelo sobre el lago Roca, en el Parque Nacional Los Glaciares, departamento Lago Argentino, provincia de Santa Cruz (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

Este sería el registro más austral conocido para la especie de acuerdo a Olrog (1979) y Narosky e Yzurieta (1987). Las citas más precisas y cercanas proceden del noroeste de Chubut (Humphrey y Bridge, 1970; Daciuk, 1977).

Milano Blanco (*Elanus leucurus*)

Registrado en diciembre de 1993 en las cercanías de Trelew, departamento Rawson, provincia de Chubut (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

Si bien la especie es indicada por Narosky e Yzurieta (1987) para la mitad norte de la provincia de Chubut, son escasos los registros del milano blanco para esa provincia. El presente sería el tercero para Chubut (Daciuk, 1977; Nores e Yzurieta, 1981).

Gaviota Chica (*Larus pipixcan*)

Registrada en diciembre de 1993 en las cercanías de Punta Arenas, XII Región, Chile (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

Esta cita confirma su presencia en Magallanes basada en

unas pocas observaciones de enero de 1969 efectuadas en Punta Arenas y Fuerte Bulnes (Peterson y Watson 1971 en Venegas y Jory, 1979). De allí debe proceder la indicación para "(Punta Arenas)" de Olrog (1979).

Golondrina Tijerita (*Hirundo rustica*)

Registrada en diciembre de 1993 en Río Gallegos, departamento Güer Aike, provincia de Santa Cruz (J. M. Arcos Pros, E. Badosa Malagelada y D. Ventura Pérez, *in litt.*).

Sería el primer registro conocido para Santa Cruz aunque se conocen citas de Tierra del Fuego (Humphrey *et al.*, 1970; Jehl y Rumboll, 1976; Olrog, 1979; Gil *et al.*, 1993).

Colorín de Leclancher (*Passerina leclancheri*)

En octubre de 1995 unos siete u ocho ejemplares fueron observados en el Parque Peralta Ramos de la localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredón, provincia de Buenos Aires (Liliana Olveira, *in litt.*).

El colorín de Leclancher es una especie de la familia Emberizidae, originaria del sudoeste de México. La descripción de plumaje puede consultarse en Peterson y Chalif (1973).

Se trata de una nueva especie introducida en la Argentina, probablemente escapada de cautividad ya que es considerada "de jaula". Habría que confirmar si se reproduce en la zona para definir su estatus en el territorio argentino.

BIBLIOGRAFÍA CITADA

- COLLAR, N. J., L. P. GONZAGA, N. KRABBE, A. MADROÑO NIETO, L. G. NARANJO, T. A. PARKER III y D. C. WEGE. 1992. Threatened Birds of the Americas: The I.C.B.P./I.U.C.N. Red Data Book. Third edition, part 2. Smithsonian Inst. Press, I.C.B.P., 1.150 páginas.
- CONTINO, F. N. 1980. Aves del noroeste argentino. Univ. Nac. Salta, Sec. Estado Asuntos Agr., Dir. Gral. Rec. Nat. Renov. Salta, 136 páginas.
- DACIUK, J. 1977. Notas faunísticas y bioecológicas de Península Valdés y Patagonia. XXI. Lista sistemática y comentarios de una colección ornitológica subcordillerana (subregión araucana, prov. de Río Negro y Chubut, Argentina). Physis, Sec. C, 36: 201-213.
- DAGUERRE, J. B. 1922. Lista de aves coleccionadas y observadas en Rosas, F.C.S.. El Hornero, 2: 259-271.
- DOELLO JURADO, M. 1917. Sobre aves de Puerto Deseado (Patagonia). El

Hornero, 1: 8-16.

GARCIA FERNANDEZ, J. J., R. A. OJEDA, R. M. FRAGA, G. B. DIAZ y R. J. BAIGÚN (compil.). 1997. Libro rojo de mamíferos y aves amenazados de la Argentina. FUCEMA y Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 221 páginas.

GIL, G., A. BOSSO Y S. KRAPOVICKAS. 1993. Proyecto de una nueva área natural protegida en Tierra del Fuego (República Argentina). Fundamentos para su creación. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 43 páginas.

GLADE, A. A. 1993. Libro rojo de los vertebrados de Chile. Segunda Edición. CONAF, Chile.

HUMPHREY, P. S. y D. BRIDGE. 1970. Apuntes sobre distribución de aves en la Tierra del Fuego y la Patagonia argentina. Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat. "Bernardino Rivadavia", 10: 251-265.

HUMPHREY, P. S., D. BRIDGE, P. W. REYNOLDS y R. T. PETERSON. 1970. Birds of Isla Grande (Tierra del Fuego). Smithsonian Institution. Washington D.C., 411 páginas.

JEHL, J. R. y M. A. E. RUMBOLL. 1976. Notes on the avifauna of Isla Grande and Patagonia, Argentina. Trans. San Diego Soc. Nat. Hist., 18: 145-154.

MARTINEZ ACHENBACH, G. M. 1957. Lista de las aves de la provincia de Santa Fe. Anal. Mus. Prov. Cienc. Nat. "Florentino Ameghino", 1: 1-61.

NAROSKY, T. y A.G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asoc. Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Ed. y L.O.L.A., Buenos Aires, 128 páginas.

NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata, Buenos Aires, 345 páginas.

NORES, M. y D. YZURIETA. 1981. Nuevas localidades para aves argentinas. Historia Natural, 2: 33-42.

NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. Bol. Acad. Nac. Cienc. Córdoba, 56: 1-114.

OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. Opera Lilloana, 27: 1-324.

OLROG, C. C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 352 páginas.

PEREYRA, J. A. 1923. Las aves de la región ribereña nordeste de la provincia de Buenos Aires. El Hornero, 3: 159-174.

PETERSON, R. T. y E. L. CHALIF. 1973. A Field Guide to Mexican Birds. Houghton Mifflin Company Boston, 298 páginas.

PIERRE, P. ST. y M. DAVIES. 1998. Observaciones ornitológicas en el Monumento Natural Laguna de los Cisnes, Tierra del Fuego: nuevo registro de pimpollo tobiano (*Podiceps gallardoi*) en Chile. Boletín Chileno de Ornitología, 5: 28-29.

VENEGAS, C. y J. JORY. 1979. Guía de campo para las aves de Magallanes. Publicación Instituto Patagónico Punta Arenas, Monografía 11: 1-253.

VUILLEUMIER, F. 1994. Status of the Ruddy-headed Goose *Chloephaga rubridiceps* (Aves, Anatidae): a species in serious danger of extinction in Fuego-Patagonia. Revista Chilena Historia Natural, 67: 341-349.

NOTA A LOS AUTORES

Para enviar artículos a Observaciones de Campo se recomienda seguir los lineamientos detallados en El Hornero, tomar como modelo el presente número y adjuntar disco con el trabajo en procesador de texto de uso corriente (Word para Windows 95).

Es importante colocar las coordenadas de las localidades mencionadas.

En todos los casos, es decisivo fundamentar el valor de las observaciones realizadas confrontando con la bibliografía respectiva. Los temas de interés para la parte de artículos son localidades novedosas en la distribución de las aves, descripciones de nidos poco conocidos, observaciones sobre biología reproductiva y alimentación, entre otros. Para la parte de comunicaciones (notas de una carilla, aproximadamente), son nuevos registros para especies amenazadas y poco conocidas en áreas naturales protegidas (en particular los parques nacionales con inventarios ornitológicos publicados), y comentarios sobre problemas de conservación (propuestas de estatus de amenaza a niveles provinciales y nacionales, censos de aves atropelladas, muerte por intoxicaciones o cables electrificados, predación por animales domésticos o exóticos asilvestrados, entre otros).

Los trabajos recibidos para Observaciones de Campo son mencionados en A Vuelo de Pájaro.