

En razón de que, en forma reciente, Vuilleumier (1994) se refiere en un extenso artículo al "aparentemente" segundo nido conocido de la Monjita Chocolate (*Neoxolmis rufiventris*), ignorando un hallazgo de de la Peña (1985) publicado en esta revista, se ha considerado de interés reunir todos los datos conocidos de la nidificación de este tiránido, a sugerencia del Dr. Jorge R. Navas, del Museo de Ciencias Naturales de Buenos Aires, opinión compartida por del Dr. de la Peña (*in litt.*).

1) El primer nido conocido y descrito es el encontrado por Maclean (1969) el 3 dic 1967 en la Estancia Las Vegas, situada al sur de la provincia de Santa Cruz, a una distancia equidistante entre la costa atlántica y el límite con Chile en el oeste, en el valle del Río Coig o Coyle, depto. Güer Aike.

Los tres huevos colectados del nido en cuestión fueron enviados entonces a Alfred W. Johnson, de Santiago de Chile, e incorporados a la colección de éste, desconociendo donde se encuentran al presente.

2) El segundo nido fue dado a conocer en una breve comunicación por de la Peña (1985) hallado en Puerto Deseado, depto. Deseado, Santa Cruz, el 7 nov 1979. Los dos huevos que contenía este nido -además de un pichón- se encuentran en la colección de este investigador, catalogados por la Western Foundation of Vertebrate Zoology de Los Angeles (USA), bajo el número 152790 -egg Collection of Martín R. de la Peña. En una obra posterior (1987) el mismo autor repite los datos de este nido.

3) Por último, Vuilleumier (1994) describe el tercer nido conocido de esta especie, atribuyéndolo como el segundo -por desconocimiento de lo señalado en el punto 2- encontra-

do el 7 nov 1992, 2 km al Este de El Caín (en la base de la meseta de Somuncura), depto. 25 de Mayo, Río Negro. Contenía dos pichones.

Para concluir, es obvio que los hallazgos al presente de nidos de *N. rufiventris* son pobrísimos, advirtiéndose sin embargo que Kiff y Hough (1985) mencionan 5 nidadas más de esta especie, cuatro en la colección de la mencionada Western Foundation of Vertebrate Zoology y una más en el Santa Bárbara Museum of Natural History, de Santa Bárbara (USA).

Agradezco el aporte que para esta breve comunicación me brindaron el Dr. Gordon Maclean, de la University of Natal (South Africa), el Dr. Martín de la Peña, el Dr. Jorge Navas y Lloyd F. Kiff, de la Western Foundation of Vertebrate Zoology, Los Angeles (USA).

BIBLIOGRAFIA

de la Peña, M. 1985. Notas nidobiológicas sobre aves argentinas. *Nuestras Aves* 8:13.

—. 1987. Nidos y huevos de aves argentinas. Ed. del Autor. Santa Fe.

Kiff, L. y D. Hough. 1985. Inventory of bird egg collections of North America, 1985, American Ornithologists Union and Oklahoma Biological Survey. Norman Oklahoma.

Maclean, G. 1969. The nest and eggs of the Chocolate Tyrant *Neoxolmis rufiventris* (Vieillot). *Auk* 86:144-145.

Vuilleumier, F. 1994. Nesting, behavior, distribution, and speciation of Patagonian and Andean Ground Tyrants (*Myiothetes*, *Xolmis*, *Neoxolmis*, *Agriornis* and *Muscisaxicola*). *Ornitología Neotropical* 5:1-55.

Recibida: marzo de 1995

1 Museo de la Patagonia. Centro Cívico; 8400, San Carlos de Bariloche, Río Negro.

NOTAS SOBRE AVES DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA SAN GUILLERMO (PROVINCIA DE SAN JUAN, REPUBLICA ARGENTINA)

Eduardo Haene¹ y
Alvaro Montañez²

San Guillermo es un área natural de una superficie aproximada de 860.000 ha, ubicada en el extremo norte del depto. Iglesia, Provincia de San Juan. El lugar fue declarado Parque Provincial en 1972, y a partir de 1980 constituye también una Reserva de la Biosfera. Resguarda muestras de comunidades de alta montaña de las Provincias Biogeográficas Altoandina y Puneña, y en forma marginal, del Monte en los sectores bajos.

De su avifauna sólo se han comunicado algunas referencias generales al describir las asociaciones ambientales de San Guillermo (Cajal *et al.* 1981) y sobre el estado poblacional del Suri Cordillerano (*Pterocnemia pennata garleppi*) (Cajal 1988). El lugar fue prospectado por Claes C. Olrog hacia 1981, quien realizó colecciones y proyectaba un estudio del área (E. Sánchez com. pers.).

Entre el 3 y el 8 abr 1995 participamos de una campaña a la Reserva, organizada por la Fundación Ambientalista Sanjuanina con el apoyo de Gendarmería Nacional y la Administración de Parques Nacionales. En esa oportunidad pudi-

mos realizar observaciones sobre la avifauna de San Guillermo, que resulta de interés comunicar dado que extienden y/o confirman la distribución de cuatro especies hasta el norte de la Provincia de San Juan.

***Tinamotis pentlandii* - Quiula Puneña**

Tres ejemplares fueron observados el 6 abr 1995 en las cercanías del Arroyo Cajoncito, 3850 m s.n.m., y otros tres el 7 abr 1995 en la Agüita del Indio, 3550-3600 m s.n.m., unos 8 km al noreste del Refugio de Agua del Godo. Estos últimos fueron fotografiados.

Si bien es mencionada para San Guillermo por Cajal et al. (1981), la especie era reconocida para la Argentina desde el noroeste hasta el norte de Catamarca (Narosky e Yzurieta 1987, Fjeldsa y Krabbe 1990), y con dudas hasta San Juan (Olrog 1979). Sin mencionar la fuente, es citada para la Provincia de San Juan por Olrog y Pescetti (1991).

***Podiceps occipitalis* - Macá Plateado**

El 6 abr 1995 fueron avistados y fotografiados quince ejemplares en la Laguna del Macho Muerto del Llano Amarillo, 4300 m s.n.m., y otros seis en la Laguna del Portezuelo norte de las Carachas, 3900 m s.n.m.

La especie no contaba con registros previos para la provincia de San Juan. Dada la época (finales del período reproductivo) y las características ambientales de las lagunas donde fueron realizadas las observaciones, típicas de las provincias biogeográficas puneñas y altoandinas, es muy probable que se trate de la subespecie *Podiceps occipitalis juninensis*, que nidifica entre los 3.500 y 4.500 m de altura, en la Ar-

gentina desde Jujuy a Catamarca (Olrog 1979).

***Fulica cornuta* - Gallareta Cornuda**

El 6 abr 1995 fueron registrados al menos seis ejemplares en la Laguna del Macho Muerto del Llano Amarillo, y dos individuos en la Laguna del Portezuelo norte de las Carachas.

Considerada "insuficientemente conocida" a nivel internacional y "rara" a nivel nacional, la especie cuenta con registros en la Argentina para las Provincias de Jujuy, Tucumán y Catamarca (Chebez 1994). Según Pujalte (com. pers.) en Vides Almonacid (1988) podría asignarse a la Gallareta Cornuda la *Fulica* mencionada para San Guillermo en Cajal et al. (1981). Sin especificar la fuente, Olrog y Pescetti (1991) la señalan desde Jujuy hasta San Juan.

***Chbaradrius alticola* - Chorlito Puneño**

Un ejemplar fue observado y fotografiado el 6 abr 1995 en la Laguna del Portezuelo norte de las Carachas, 3900 m s.n.m.

La especie era conocida en la Argentina desde Jujuy hasta el Norte de Catamarca (Olrog 1979, Fjeldsa y Krabbe 1990).

Agradecemos la colaboración de Alejandro Flores y Eleodoro Sánchez (Fundación Ambientalista Sanjuana), y al Guardafauna Provincial Jacinto González; también a Marcos Babarskas, Juan Mazar y Germán Pugnali.

BIBLIOGRAFIA

- Cajal, J. 1988. The lesser rhea in the Argentina Puna Region: present situation. *Biological Conservation* 45: 81-91.
- Cajal, J. L.; A. A. Reca y J. C. Pujalte. 1981. La Reserva Provincial de San Guillermo y sus asociaciones ambientales. SECYT, Buenos Aires.
- Chebez, J. C. 1994. Los que se van. Especies argentinas en peligro. Edit. Albatros, 604 pp. Buenos Aires.
- Fjeldsa, J. y N. Krabbe. 1990. Birds of the High Andes. A manual to the birds of the temperate zone of the Andes and Patagonia, South America. Zool. Mus., Univ. Copenhagen, and Apollo Books, 876 pp. Svendburg, Denmark.
- Narosky, T. y D. Yzurieta. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornitológica del Plata, 345 pp. Buenos Aires.
- Olrog, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana* 27: 3 - 324.
- Olrog, C. C. y E. A. Pescetti. 1991. Las aves del Gran Cuyo. Mendoza, San Juan, San Luis y La Rioja. Guía de Campo. CRICYT y Gob. Prov. Mendoza, 160 pp. Mendoza.
- Vides-Almonacid, R. 1988. Notas sobre el estado de las poblaciones de la Gallareta Cornuda (*Fulica cornuta*) en la Provincia de Tucumán, Argentina. *Hornero* 13: 34-38.
- Recibida: abr 1995.
- 1 Adm. de Parques Nacionales. Av. Santa Fe 690. (1059) Buenos Aires.
- 2 Reserva Natural Estricta El Leoncito, Presidente Roca s/n. (5405) Barreal, Provincia de San Juan.
- Editor Observaciones de Campo: Alejandro G. Di Giacomo.
- Revisores: Juan Carlos Chebez, Eduardo Haene y Tito Narosky.
- Colaboración: Horacio A. Aguilar.
- Corrección: Marcos Babarskas.