

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- CONTRERAS, J. 1979. Avifauna puntana. I. Algunas especies nuevas o poco conocidas para la provincia de San Luis. *Historia Natural*, 1 (3): 9-12.
- ESTEBAN, J. 1953. Nuevas localidades para aves argentinas. *Acta zoológica lilloana*, 13: 349-362.
- HAENE, E., S. KRAPOVICKAS, F. MOSCHIONE y D. GÓMEZ. 1995. Observaciones y comentarios biogeográficos sobre la avifauna del este de la provincia de San Juan, Argentina. *Hornero*, 14 (1 y 2): 48-52.
- HAYES, F. E. 1995. Status, distribution and biogeography of the birds of Paraguay. American Birding Association, Monographs in Field Ornithology, Nº 1, 230 páginas.
- KOSLOWSKY, J. 1895. Enumeración sistemática de las aves de Chilecito, provincia de La Rioja. *Rev. Mus. La Plata*, 6: 277-287.
- MASRAMÓN, D. O. de. 1979. Contribución al estudio de las aves de San Luis. Tercera parte. *Hornero*, 12 (1): 59-68.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

- NAVAS, J. 1959. Lista preliminar de aves del Parque Nacional Comechingones. *Anales Parques Nacionales*, 8: 77-79.
- NORES, M. 1996. Avifauna de la provincia de Córdoba. En I. E. Di Tada y E. H. Bucher (editores), "Biodiversidad de la provincia de Córdoba": 255-337. Córdoba, 378 páginas.
- NORES, M. y D. YZURIETA. 1982. Nuevas localidades para aves argentinas. Parte II. *Historia Natural*, 2 (13): 101-104.
- NORES, M., D. YZURIETA y R. MIATELLO. 1983. Lista y distribución de las aves de Córdoba, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 56 (1-2): 1-114.
- NORES, M., D. YZURIETA y S. SALVADOR. 1991. Lista y distribución de las aves de Santiago del Estero, Argentina. *Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba*, 59: 157-196.
- OLROG, C. C. 1979. Nueva lista de la avifauna argentina. *Opera Lilloana*, 27: 1-324.
- OLROG, C. C. 1984. Las aves argentinas. Una nueva guía de campo. Administración de Parques Nacionales. Buenos Aires, 352 páginas.
- SHORT, L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. *Bull. Amer. Mus. Nat. Hist.*, 154: 167-352.

Recibida: julio 1997

Revista Nuestras Aves 40: 8.

## PINGÜINO DE BARBIJO (*Pygoscelis antarctica*) Y PINGÜINO REY (*Aptenodytes patagonicus*) EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, ARGENTINA

Silvina Bachmann

Laboratorio de Vertebrados, Departamento de Biología, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Mar del Plata.  
Funes 3.250 (7.600) Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina

En abril de 1993, mientras trabajaba en un centro de recuperación de aves marinas de Miramar, apareció en las playas, entre Miramar y Mar del Sur, un ejemplar adulto del pingüino de barbijo (*Pygoscelis antarctica*). Se encontraba muy débil y sin rastros de petróleo. Se lo trató de recuperar pero a los tres días murió, posiblemente debido a las altas temperaturas registradas en esos días.

Esta especie cría en la Antártida e Islas del Atlántico Sur y el resto del año es pelágica en océanos australes (Canevari *et. al.*, 1991), llegando en la Argentina hasta las Islas Malvinas (Clark, 1986). Sus movimientos invernales son poco conocidos, sólo existen registros de individuos aislados en Australia e Islas MC Quaire, Tasmania, Crozet y Gough (Serventy *et al.*, 1971, en Harrison, 1983; del Hoyo *et al.*, 1992).

En noviembre de 1992 recibí un ejemplar adulto de pingüino rey (*Aptenodytes patagonicus*) que había sido encontrado en las playas de Miramar. No tenía petróleo y se encontraba aparentemente en buen estado. Fue alimentado, se le dieron vitaminas y luego de dos días fue liberado.

La distribución invernal y pelágica de la especie llega hasta la latitud de la provincia de Buenos Aires (Narosky y Yzurieta, 1987), donde ha sido citada sólo en tres oportunidades para las costas: Bataglia y Salerno en 1986, Fia-

meni en 1992 y Fangauf (Narosky y Di Giacomo, 1993). Es probable que se trate de una especie que aparezca más frecuentemente en las costas bonaerenses de lo que se conoce hasta el momento.

Agradezco a Mariano Martínez por la lectura crítica del manuscrito.

## BIBLIOGRAFÍA CITADA

- CANEVARI, M., P. CANEVARI, G. CARRIZO, G. HARRIS, J. RODRIGUEZ MATA y R. STRANECK. 1991. Nueva guía de las aves argentinas. Tomos 1 y 2. Fundación Acindar.
- CLARK, R. 1986. Aves de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Guía de campo. LOLA. Buenos Aires, 294 páginas.
- DEL HOYO, J. A. ELLIOTT, y J. SARGATAL (eds.). 1992. Handbook of the birds of the world. Vol. 1, Lynx Editions. Barcelona, 696 páginas.
- HARRISON, P. 1983. Seabirds: an identification guide. Croom Helm. Ltd. A. H. & A. W. Redd. Bekenham. 448 páginas.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.

Recibida: junio 1997