

CAUQUEN COLORADO (*Chloephaga rubidiceps*) Y CABECITANEGRA AUSTRAL (*Carduelis barbata*) EN LA ESTANCIA CÓNDOR, PROVINCIA DE SANTA CRUZ, ARGENTINA

Sonia A. Cadierno y Carlos D. Amorós

Estancia Cóndor, Casilla de correo 180, (9.400) Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

En abril de 1997 fue registrado el cauquén colorado en la bahía Posesión (52° 10' S; 69° 05' O), frente al Estrecho de Magallanes, a unos 18 km de la costa y a 3 km de la frontera de la Argentina con Chile, en la Estancia Cóndor, departamento Güer Aike, en el extremo sur de la provincia de Santa Cruz. Verificamos la presencia de 12 ejemplares de esta especie, que estaban junto a un grupo de cauquén común (*Chloephaga picta*); estuvieron unos 10 a 15 días en la zona.

En septiembre de 1997 observamos, en el mismo lugar, a 14 individuos de cauquenes colorados, cerca de una pareja de cauquenes comunes y alejados de unos 300 individuos de esta última especie. Permanecieron aproximadamente unos 15 días; se alimentaban de hierbas y eran bastante mansos, nos pudimos acercar hasta unos 10 metros de ellos.

Las únicas referencias para la zona fueron realizadas por Rumboll (1975) y por B. Ortega (Oliva, 1993).

El cauquén colorado es migratorio, nidifica en Tierra del Fuego y llega hasta el sur de Buenos Aires en el invierno. Si bien la especie fue considerada muy común en Tierra del Fuego en la década del 50, su población continental ha decaído fuertemente. Esta situación ha motivado su inclusión en los listados rojos nacionales de especies en peligro. Hay otra población en las Islas Malvinas, en buen estado de conservación, por lo cual la especie no figura en peligro a nivel internacional.

El cabecitanegra austral fue registrado en la misma zona donde fueron avistados los cauquenes colorados. Se ven grupos numerosos de unos 30 a 40 ejemplares en el casco de la estancia, que posee en sus jardines plantas exóticas. Estos cabecitanegras se los observa principalmente en los sauces o mimbres (*Salix* sp.) y los álamos negros o criollos (*Populus nigra*). La vegetación de la región es la estepa patagónica con mata negra (*Verbena tridens*), colapiche (*Chu-*

quiraga erinacea), coirón amargo (*Stipa* sp.), topa-topa (*Calceolaria* sp.) y calafates (*Berberis* sp.), entre otras plantas silvestres.

El cabecitanegra austral está distribuido en la región en los bosques, arbustales y zonas rurales arboladas de la cordillera (Narosky e Yzurieta, 1987; Oliva, 1993). Nuestras observaciones amplían su geonemia hacia el este; posiblemente se trate de un avance reciente por los poblados y cascados forestados, como ya podía deducirse por otros registros en Santa Cruz (Chebez *et al.*, 1988), el resto de la Patagonia (Peters, 1923; Navas y Bó, 1990), Mendoza (Chebez *et al.*, 1993), La Pampa (Navas y Bó, 1986) y el extremo sur de Buenos Aires (Narosky y Di Giacomo, 1993).

BIBLIOGRAFIA CITADA

- CHEBEZ, J. C., C. BERTONATTI, A. JOHNSON, S. HEINONEN FORTABAT y G. GIL. 1988. Notas sobre la distribución de algunas aves santacruceñas. *APRONA*, 8: 14-27.
- CHEBEZ, J. C., S. HEINONEN FORTABAT, J. VEIGA, M. BABARSKAS y F. FILIBERTO. 1993. Novedades ornitogeográficas argentinas IV. *Nótulas Fau-nísticas*, 38: 1-11.
- NAROSKY, T. y A. G. DI GIACOMO. 1993. Las aves de la provincia de Buenos Aires. Distribución y estatus. Asociación Ornitológica del Plata, Vázquez Mazzini Editores y L.O.L.A. Buenos Aires, 127 páginas.
- NAROSKY, T. y D. YZURIETA. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asociación Ornitológica del Plata y Vázquez Mazzini Editores. Buenos Aires, 345 páginas.
- NAVAS, J. R. y N. A. BÓ. 1986. Notas sobre una colección de aves del Parque Nacional Lihué Calel, La Pampa, Argentina. *Hornero*, 12: 250-261.
- NAVAS, J. R. y N. A. BÓ. 1990. Apuntes sobre aves de la meseta de Somuncurá, provincia de Río Negro. *Neotrópica*, 36: 45-53.
- OLIVA, G. 1993. Aves Patagónicas. Universidad Federal de la Patagonia Austral, 85 páginas.
- PETERS, J. L. 1923. Notes on some summer birds of northern Patagonia. *Bull. Mus. Comp. Zool.*, 65: 277-337.
- RUMBOLL, M. A. 1975. Notas sobre anseriformes. El cauquén de cabeza colorada (*Chloephaga rubidiceps*). Una nota de alarma. *Hornero*, 11: 315-316.

Recibida: diciembre 1997